



28 v.



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.3.4.6





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.3.4.6





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.3.4.6



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ald.3.4.6

Ato. 3/4







IN HOC VOLV MINE HAEC
CONTINENTVR.

AVRELII CORNELII CELSI MEDICINAE
LIBRI. VIII. QVAM EMENDATISSIMI,
GRAECIS ETIAM OMNIBVS
DICTIONIBVS RESTI-
TVTIS.

QVINTI SERENI LIBER DE MEDICINA
ET IPSE CASTIGATISS.

ACCEDIT INDEX IN CELSV M, ET SERE-
NV M SANE QVAM COPIOSVS.



¶ Venetorum decreto, ne quis aliquo in loco Venet. editionis
hos libros imprimat, impressos ne alibi
vendat, cautum est.

2067
1.21 Long

AMPLISSIMO, ET MERITISSIMO HERCV-
LI GONZAGAE .SS. ROMANAE SEDIS
CARDINALI IOANNES BAPTI-
STA EGNATIVS VENETVS.

Vm multa, et ampla sunt ea, quae Principes viros, tuique
 c similes illustrare maxime solent: tum nihil maius aut
 honestius, quam cum bonarum artium studiosos homines
 exornant: et bonas literas omni studio, atque opera in lu-
 cem prodire contendunt. siue quod is semper literarum Genius fuit, ut
 augustissimus merito iudicetur: siue quod si doctorum hominum discipli-
 nam negligas: ueluti solem de caelo sustuleris, omnis hominum uita
 in tenebris sit futura. Fecit hoc ipsum patrum nostrorum memoria
 summa sua cum laude senior Alphonsus, qui cum propria uirtute re-
 gnum Neapolitanum armis sibi quaesisset, ad pacis studia conuersus,
 omnes eius aetatis viros, qui doctrinae aliquod specimen praeserferret,
 mirum in modum est complexus. Eandem propensionem literas fouen-
 di secutus non multo post Nicolaus Quintus Pont. Max. est. ut incredi-
 bile dictum sit quantum breui licet eius Pontificatu profecerint bonae lite-
 rae: ut si uerum fateri uelis, huic uni plus debeamus Pontifici, quam omnibus
 alijs, qui aut multis ante illum floruerint annis: aut qui ad huc diu uixe-
 re in Barionae sede Pontificibus. Ceterum obscurauit penes hanc cla-
 rissimorum Principum beneficentiam Laurentius Medices perpetuus
 Florentinae Reip. dictator. qui uitam, paternamque laudem amula-
 tus prouehendi ueteres disciplinas, et artes, magno studio, et im-
 pensam primum bibliothecam copiosissimam comparandam iussit: quae
 do sine multis hisce magistris, quod aiunt, aut paru, aut certe nihil profici-
 mus: tum doctissimos viros quotquot tera Italia id tempestatis alebat,
 ad sese euocandos curauit. quos et praemijs longe maximis inuitaret:
 et ad otium hoc literarium ita inflammaret, ut nihil omnino his
 deesse pateretur. Et quoniam Principum, ac Regum exempla pluri-
 mum in utraque partem ualent: non defuit eadem tempestate Prin-
 cepti bellicae gloria clarissimus Fridericus Urbinae, qui Laurentij splen-
 dore uicini, et amicissimi Principis cum exarsisset: eandem aemulatus
 laudem, non paruam librorum copiam, et praecipue qui ad sacra re-
 spectant, comparauit: et a sole, puluerisque martio saepe in spacia, atque
 ambulacra philosophorum diuerterit. Ut quicquid illi a bellicis arti-
 bus erat oculi, id totum familiaribus doctorum hominum sermonibus
 libenter impederet. Sed enim nec Gonzagae tuum operae semper
 huic uni dedere rei, quam bellicis rebus, quibus maxime florere. Nam

sub initia renaſcentium literarum, quæ ſexcentefimum iacuerant
 annum in terra Italia, Victorinum Feltrẽſem ſibi adſciuerẽ. cuius
 doctrinam regiũ aduſcentes uestri iam tum à primis annis imbibere-
 rent. Tu uero ut uideo cum alijs artibus maiorum tuorum adæquas
 laudem: tum hac una literarũ, & doctorũ hominum exornandi cura
 ſuperare contendis. qui ſummo ſtudio iam ab annis adoleſcentiæ do-
 ctiſſimum quenq; in familiam adſciuiſti tuam: magnisq; ſemper
 præmijs ornaſti. Nam ut omittam Furnium merito ab te ſemper ho-
 neſtatum: Romulum certe ſic complexus ab initio es, ut non prius
 deſtiteris, q̃ illum ſtudiorum tibi perpetuum adſciueris comitem. quæ
 laus eò maior eſt, q̃ & temporum hæc iniquitas etiam ocioſiſſimos
 homines ab literis auocat: & Romulus cum honeſtiſſime Bononiæ pro-
 fiteretur, maluit tamen te ſequi: & tecum, ut cum optimo Principe,
 conqueſcere. non dubitans quin ingraueſcens eius ætas ſub te Prin-
 cipe uiro effloreſcere etiam poſſit. ſed quid ego dicam quanto ſtudio
 Francſcum Aſulanum tibi addictiſſimum feceris? qui hæreditariam
 Aldi laudem ſecutus, nihil nõ egit ut bonæ literæ cum græcæ, tum la-
 tine in dies maiorem recipiant cultum. Et ille quidem cum noctes
 ac dies hanc curam animo coqueret: acceſſit mox authoritas, ampli-
 tudoq; tua: quæ currentem, quod aiunt, equum fortius ad curſum ex-
 citaret. Nam cum alia in tui unius gratiam ſuſcepit: tum Celſi Cor-
 nelij de medicina libros longe utiliſſimos, & elegantiſſimos inuulgan-
 dos recepit. quod eo libentius ſuſcepit, q̃ abs te imprimis codice ſanẽ
 caſtigatũ ſtatim acceperit. id oneris ut ſcilicet Celſus q̃ emendatiſſimus
 publicum acceperet: non quod ego unus omnium doctiſſimus, ſed q̃
 Francſco, & familiæ, & Aldi præſertim nomini maxime ſemper fa-
 ui: ſuſcepi non inuitus: idq; , uti ſpero, non atris auihus præſtiſſe me
 confido: ut docti etiam homines libenter hoſce Celſi libros legant: in-
 docti non aſpernentur. Quod opus tui unius auſpicijs in lucem cum
 prodeat, tuum patrociniũ merito ex poſcit. huic addidimus. Q. Se-
 reni poëma non inutile: in quo uates ille non infeliſſimus et morbos
 aliquot, & morborum remedia complexus eſt. hoc ipſum cum legi-
 uix poſſet, legent hodie ni fallor, docti hoies & pertibenter, & iucun-
 de. Ego uero quicquid opellæ in Celſo emendando impendi, id ipſum
 tibi nuncupo: qui uirtutis tuæ ampliſicator, oẽm meam indiſtriã uni
 tibi p̃petuo antea dicarã. Teſtatũ tamẽ apud te relinquens, q̃ ſi plus
 ocij datũ mihi eſſet, i magnis occupatiõibus proſitẽdi uerſanti, effuſa-
 ſem ut Cornelius nõ dicã nitidior, certe amabilior oĩbus prodiret. quã
 do breues notulas uocabulorũ, ſenſum etiam obſcuriorũ, græcarum
 etiã dictionum interpretamẽta inſtituerã. Quin et ex Galeno, Hip-

procrateq; multa adtexere decreuerā: ut nostrates medici cum Hippo-
cratem intelligerent penē à Cornelio in linguam latinam uersum, li-
bentius multo illum legerent. Cornelij Celsi Fabius, quod sciam, ex
ueteribus tantum meminit, laudās hominis industriam, q̄ cum Lenato
rhetoricen multo q̄ ante illum aliq̄ accuratius explicarit. sed & idem
Sceptios imitatus, non parum multa summo cum nitore, & cultu scri-
psit. artē quoq; militarē, & disciplinas ferē græcis omnes ample-
xus, eas latine loqui docuit. & ex his medicinam omnium nostratum
princeps ita absoluit: ut æmulari potius multi, q̄ assequi parem laudē
possint. Bene, ac feliciter Vale.

busq. 50
 De faucium morbis, ac curationi-
 bus, et primum de angina, de-
 inde de difficultate spirandi,
 ultimo de tussi. 50
 De difficultate spirandi. 51
 De tussi. 51
 De stomachi morbis, et cura-
 tionibus. 52
 De laterum doloribus. 53
 De viscerum morbis: et primo de
 pulmone, deinde de iocinere, tum
 de liene, postremo de renibus. 54
 De iocineris morbo, et cura-
 tione. 55
 De lienis morbo, et curatione. 55
 De renum morbis, et curatio-
 nibus. 55
 De intestinorum morbis, et
 primo de cholera. 56
 De cœliaci uentriculi morbo. 56
 De tenuioris intestini morbo. 57
 De morbo intestini plenioris. 57
 De torminibus. i. dysenteria. 57
 De leuitate intestinorum. 58
 De lumbricis aluum occupan-
 tibus. 58
 De tenasmo intestinorum morbo. 58
 De uentris fluxu, et curatione. 59
 De uulue morbo, et curatio-
 nibus. 59
 De nimia profusione seminis
 ex naturalibus. 60
 De coxarum morbis, et cura-
 tionibus. 60
 De genuum doloribus, et cura. 60
 De articularum doloribus in
 manibus, pedibusq. 61

LIBER QUINTVS.

De simplicibus facultatibus qua-
 runq. rerum, ex quibus me-
 dicamenta fiunt: et primo de his,
 quæ sanguinē supprimunt. 62
 Quæ uulnus glutinant. 62
 Quæ cōcoquant, et mouēt pus. 62
 Quæ aperiunt uulnera. 62
 Quæ purgant. 62
 Quæ rodunt. 62
 Quæ exedunt corpus. 63
 Quæ adurunt. 63
 Quæ crustas ulceribus inducūt.
 Quæ crustas ulceribus resoluūt.
 Quæ discutiant ea, quæ in ali-
 qua parte corporis coierunt. 63
 Quæ euocant, et educunt. 63
 Quæ exasperata leuent. 63
 Quæ carnem nutriunt, et
 ulcus implent. 63
 Quæ molliunt. 63
 Quæ autem purgant. 63
 De mixturis simplicium rerum,
 et de ratione ponderum, et
 quid malagma, et emplastrū,
 et pastillus inter se differāt. 63
 De malagmatis. 64
 Malagma ad materiam extra-
 hendam. 64
 Malagma ad iecur dolens. 64
 Malagma ad lienem. 64
 Malagma ad laterū dolores. 64
 Malagmata ad resoluenda quæ
 astricta sunt: et mollienda quæ
 dura sunt: et digerenda quæ
 coeunt. 65
 Aliud malagma ad eadem. 65
 Malagma moschi ad mollien-
 dum. 65

Malagma medi ad digerenda que coeunt. 65	matu, & strumam. 66
Malagma Panthemi ad ea= dem. 65	Malagma ad articulos. 67
Malagma ad strumas. 65	Malagma Aristonis aduersus po= dagras, et recentia phyma= ta, & omnis dolores. 67
Aliud malagma ad id ua= lens. 65	Theoni malagma ad pedum dolores. 67
Malagma ad strumam, & phymata. 65	Numenij malagma ad podagra= cæter. s; articulos indura= tos. 67
Malagma ad strumam, & tubera, & carinodas. 65	Dexij malagma si quando callus in articulis increuit. 67
Malagma protarchi ad paroti= das, & faum, & mala ul= cera. 65	De emplastris. 67
Malagma aduersus panum, & phymata. 65	Barbarum emplastrum nigrum, quod cruentis protinus nul= neribus iniicitur. 67
Malagma aduersus phyma= ta. 66	Coacon emplastrum nigrum ad idem ualens. 67
Malagma ad supprimendum omne quod abscedit. 66	Basilicon emplastrum nigrum ad idem. 67
Malagma ad sanguinem sup= primendū, & phymata. 66	Smaragdinum emplastrum ad idem. 67
Malagma ad carinodas, & phymata lenienda. 66	Emplastrum ruffum ad idē. 67
Malagma ad liuorem faciei contuse. 66	Paracolleticum emplastrum ad idem. 67
Malagmata stomachica ad aperiendum. 66	Cephalicum emplastrum Phi= lotæ capiti conueniens. 68
Niconis malagma ad resoluē= dum, aperiendumq; ac pur= gandum. 66	Emplastrum uiride ad idem ualens. 68
Malagma ad ossa, & nervos. 66	tesapapmanor emplastrum ad pus mouendum. 68
Malagma Euthylei ad articu= los, & ad omnem dolorē. 66	Enneapharmacum emplastrum ad pus mouendum, & ad purgandum ualens. 68
Malagma Sasogoræ ad dolo= res articulorum. 66	Attalum emplastrum ad nul= nera. 68
Chrysippi malagma ad idē ualens. 66	Iudæi emplastrum fracto ca= piti accomodatum. 68
Clesipontis malagma ad idem ualens, & ad parotidas, et phy= mata, & strumam. 66	Diadaphnidon emplastrum ad extrahendum. 68
	Aliud

QVAE TOTO OPERE CONTINENTVR.

Prooemium.	pagina.	I	De notis, quas aliquis in singulis morborum generibus habere possit.	15
Quemadmodū sanos agere conueniat.		5	Quae notae in quocumque morbi genere, uel spem, uel pericula ostendant.	17
Quae stomacho imbecilli seruanda sint.		6	De morborum curationibus.	20
Observationes quaedam prout res nouae accidunt: Et prout corporum genera, et sexus, et aetates, et tempora anni sunt.		6	De sanguinis detractiōe per uenas.	20
De his, qui aliqua parte corporis laborant: Et primum de his, quibus caput infirmum est.		9	De sanguinis detractiōe per cucurbitulas.	21
De his qui lippitudine, grauedine, destillatione, tonsillisque laborant.		9	De deiectione.	22
Ad solutam aluum remedia.		9	De uomitu.	22
Remedia ad coli dolorem.		9	De frictione.	22
Quae agenda sint stomacho laborantibus.		10	De gestatione.	23
Quid obseruandum sit dolore neruorum laborantibus.		10	De abstinentia.	24
Observatio in pestilentia.		10	De sudore.	24
			Qui cibi, potionesue, aut ualentis, aut mediae, aut imbecillae materiae sint.	25
			Quae natura, ac proprietas cuiusque rei sit, qua uescimur.	26
			Quae res boni succi sint.	26
			Quae res mali succi sint.	26
			Quae res lenes, quaeue acres sint.	26
			Quae res crassiores, quaeue tenuiorem pituitam faciunt.	26
			Quae res stomacho idoneae sunt.	26
			Quae res alienae stomacho sunt.	27
			Quae inflant, aut inflationem leuant.	27
			Quae res aut calefaciunt, aut refrigerant.	27
			Quae res intus facile uitiantur, uel minime corrumpuntur.	27

LIBER SECVNDVS.

Quae anni tempora, quae tempestatum genera, quae partes aetatis, qualia corpora uel tuta, uel morbis opportuna sunt: Et quod ualeitudinis genus in quocumque temperari possit.		11
De notis aduersae ualeitudinis futurae.		12
Quae bona in aegrotantibus signa sint.		13
Mala signa aegrotantium.		13
De signis longae ualeitudinis.		14
De indicij mortis.		14

Quæ res aluum mouent.	27	Curatio tertianæ febris.	37
Quæ res aluum astringant.	27	Curatio quartanæ febris.	37
Quæ res urinam mouent.	28	Curatio duarū quartanarū.	37
Quæ res somnum mouet, aut sensus excitant.	28	Curatio cotidianæ febris, quæ ex quartana facta sit.	38
Quæ res corpus aut erodāt, aut reprimant, aut refrigerent, aut calefaciant, aut durent, aut emolliant.	28	De tribus insaniæ generibus: & primo de eius curatione, quæ à græcis phrenitis dicitur.	38
		Cardiaci morbi curatio.	40

LIBER TERTIVS.

De morborum generibus.	29	De aqua inter cutem, hoc est hy- dropicæ morbo.	41
Quomodo morbi cognoscantur: & an increſcant, an conſiſtant, an minuantur: & qua ratione ab intio qui languere incipit, curari debeat.	29	De tabe, & eius ſpeciebus, & curationibus.	42
De febrium generibus.	30	De comitialis morbi curatio- nibus.	44
De curationum diuerſis ge- neribus.	30	De regij morbi curatione.	44
De febrium ſpeciebus, & ſingu- larum curationibus, & primo quando cibus febricitantibus dandus ſit.	32	De elephantia curatione.	45
Quādo potiones febricitanti- bus dari expediat.	33	De attonitis, & eorum cura- tione.	45
Quando peſtilentēs febres cu- rari debeant.	34	De reſolutione nervorū: quæ apo- pleſia, uel paralyſis dicitur.	45
Curatio ſemiterſianæ febris, quæ hemitritæos dicitur.	35		
Curatio lentarum febrium.	35	LIBER QVARTVS.	
Remedia in febribus ad capitis dolore, et præcordiorum inflā- mationem, et ariditatem, & ſcabritiem linguae.	35	De humani corporis interio- ribus ſedibus.	47
Remedia contra frigus, quod febrem præcedit.	36	De curationibus morborū, qui na- ſcuntur à capite: & primo de eius dolore: deinde de morbo, q̃ circa faciē naſcitur: tum de lin- guæ reſolutione: poſtremo de de- ſtillatione, ac grauedine.	48
Curatio horroꝝ in febribus.	36	De morbo, qui circa faciē naſci- tur: quem græci cynicum ſpaſ- mum uocant.	48
Curatio cotidianæ febris.	37	De reſolutione linguae.	49
		De deſtillatione, ac grauedine.	49
		De cernicis morbis, curationi-	

Quo melius implendū est.	79	De carbūculo, et eius curatiōe.	83
De ulceribus, curationibusq;		De carcinomate, et eius cura.	84
eorum.	79	De Theriomate, et eius cura.	84
Curatio ulceris.	79	De sacro igne, et eius cura.	89
Curatio erysipelarum.	80	De Chironeo ulcere, et eius cu.	85
Curatio Gangrenæ.	80	De ulceribus, quæ ex frigore in	
Quomodo cicatrix vulneri indu-		pedibus, et manibus oriuntur,	
cenda, purgandaq; sit.	81	et eorum curationibus.	85
De ulceribus, quæ p morsus in-		De struma, et eius curatiōe.	86
feruntur, eorūq; curatiōibus.	81	De furūculo, et eius curatiōe.	86
Curatio aduersus rabiosi canis		De phymate, et eius cura.	86
morsum.	81	De phygetilo, et eius curatiōe.	86
Curationes communes aduersus		De fistulis, et earum generibus,	
omnes morsus serpentū.	81	et curationibus.	87
Speciales curationes aduersus		De malicera.	88
ictus serpentū, et primo aduer-		De Acrochordone, et Thymio, et	
sus ictum Aspidis.	82	Myrmecio, et Clauo, curationi-	
Aduersus ictum scorpionis.	82	busq; eorum.	88
Aduersus aranei, et scorio-		De pustularum generibus, et	
nis ictum.	82	earum curationibus.	89
Aduersus Cerasus, et Dipsæ, et		De scabie, et eius curatione.	89
Hæmorrhoidis ictum.	82	De impetiginis speciebus, et	
Aduersus Chersydri ictum, et		curationibus.	90
cerastis.	82	De papulis, et earū curatiōe.	90
Aduersus Phalangij ictum.	82	De uirilignis speciebus, idest de	
Aduersus ictus italorū anguinū, q		Alpho, et Mela, et leuæ, et	
minus terribiles pegris sunt.	82	earum curatione.	90
Remedium generale aduersus			
omnia uenena.	83		
Specialia remedia aduersus quæ			
dam uenena, et primo ad-			
uersus cantharidas.	83		
Aduersus cicutam.	83		
Aduersus hyoscyamum.	83		
Aduersus cerussam.	83		
Aduersus sanguisugam si epota			
est: et lac quod intus coijt.	83		
Aduersus fungos inutiles.	83		
De adustis corporis locis, et quo-			
modo curari debeant.	83		

LIBER SEXTVS.

De capillis fluentibus.	91
De porrigne, et eius curatiōe.	91
De sycofi, et eius curatione.	91
De Areis, et earū curatiōibus.	91
De Varis, et Lenticulis, et Ephe-	
lide, et eorū curationibus.	91
De oculorum morbis, curationi-	
busq; eorum: et primo de his	
morbis, qui lenibus medicamen-	
tis curantur.	92

De diuersis oculorū collirijs.	93	curationibus.	96
Philonis collirium.	93	Hermionis collirium.	96
Dionysij collirium.	93	De acatrichibus oculorum, quæ ex	
Cleonis collirium.	93	ulceribus factæ sunt: & quomo	
Theodoti collirium, Archari-		do curari debeant: & de Ascle	
stum appellatum.	93	piæ, & Canopite, & Pyxino	
Cythion, uel tephriion colliriū.	93	collirijs.	96
Euelpidis collirium, trygodes		De alio genere inflammatio-	
nominatum.	93	nis oculorum,	96
Nilei collirium omnium opti-		Cæsarianum collirium.	97
mum.	94	Hieracis collirium.	97
De carbunculis oculorum, &		De Xerophthalmia.	97
eorum curatione.	94	Rhinion collirium.	97
De pustulis oculorum, & cu-		Ad oculos scabros colliria.	97
ratione earum.	94	Ad caligationem oculorum, quæ	
πικανθού's collirium ad pu-		propter lippitudinem oritur	
stulas oculorum.	95	remedia, & colliria.	97
De ulceribus oculorum, & eorū		διὰ ὑπόρου collirium.	97
curatione, & de διὰ βλαάρου		Ad caligationem oculorum, quæ	
collirio.	95	propter senectutem, aut aliā	
Curatio oculorum aliquo ca-		imbecillitatem fit.	98
su imminutorum.	95	De suffusione oculorum.	98
De pediculis palpebrarū.	95	De resolutione oculorum, quæ	
De oculorum grauioribus mor-		paralysis dicitur.	98
bis, qui ex inflammationibus oriū		De mydriasi oculorum.	98
tur: & ualidioribus medicamen-		De imbecillitate oculorum.	98
tis curantur, & de Andreae col-		Ad oculos qui extrinsecus offen-	
lirio, & de διὰ νεύματος.	95	duntur: cum sanguine suffu-	
Memigmenon Euelpidis colli-		si sunt.	98
rium.	95	De aurium morbis, & cura-	
De oculorum ulceribus supercre-		tionibus.	99
scitibus, sordidis, cauis, ueteri-		Aduersus aurium uermes.	100
bis, & de curationibus singu-		Ad compressa aurium fora-	
lorum.	96	mina.	100
συσταίον collirium.	96	Ad grauem auditum.	100
Phynon collirium Euelpidis.	96	Ad sonitum aurium intra se	
Sphæriion collirium Euelpi-		ipsas.	100
dis.	96	Ad ea, quæ in aurem inciderunt	
Liquidum Euelpidis colliriū.	96	extrahenda.	100
De canis oculorum ulceribus, &		De narium morbis, & curatio-	

Handwritten note: Handwritten

Aliud dicitur ad extrahendum, et pus mouendum. 68

Philocratis emplastrum ad extrahendum, et pus mouendum. 68

Emplastrum Hecatei ad extrahendum. 68

Emplastrum Hecatei ad extrahendum. 69

Alexandrinum emplastrum viride ad extrahendum. 69

De emplastris exedentibus. 69

Emplastrum quod exest corpus, et ossa resoluit: et super crescentem carnem coerct. 69

Emplastrum aduersus morsus, et alia recentiora vulnera. 69

Emplastrum rubrum ad idem ualens. 69

Aliud emplastrum ad idem ualens. 69

Emplastrum non grauibz uulneribus accommodata, et maxime senilibz. 69

Elephantinum emplastrum. 69

Lenia emplastrum. 69

Emplastrum lene. 69

Archagathi emplastrum lene. 69

Emplastrum eiusdem generis ad leniendum apta. 70

De pastillis, et primo de his, qui ad recentia vulnera glutinanda, sanandaque apti sunt. 70

Alius pastillus ad glutinanda vulnera. 70

De sphragide pastillo, quem Polybus conficit, ad glutinandum uulnus. 70

Pastillus ad ulcera sordida, et nigritiem in auribus, naribus, ob-

scenis partibus, inflammatio-
nesque eorum. 70

Pastillus andronis ad unam inflammatam, ad naturalia sordida etiam cancro laborantia. 70

Pastillus ad fissam anam, uel ora uenarum fundentia sanguinem, uel cancerum. 70

Pastillus ad expellendum calculum cum urina. 70

De pessis. 70

Ad sanguinem euocandum. 70

Ad uulnam molliendam. 70

Alia pessi compositio ad idem ualens. 71

Ad inflammationes uulue Numenij, Pessus. 71

Ad eiciendum e uulua infantem mortuum. 71

Simul et uicio locorum concidit, qua curatione utendum sit. 71

De medicamentis quibus aridum uelimur, ad carnem super crescentem exedendam. 71

Ad putrem carnem continendam ne ultra serpat: eamque leniter exedendam plures compositiones. 71

Hier e compositio. 71

Iudei compositio. 71

Iole compositio. 71

Ad sanguinis proflumia, uel ex membrana cerebri, uel alijs locis et ad cancerum, et ad inducendam cicatricem, et ad coercentem carnem crescentem. 71

Tinui compositio ad ignem sacrum, uel cancerum. 71

Ad sternutamenta excitanda. 71

Gargariationes quibus fieri de-

beant.	72	quæ maxime per telâ infe-	
De antidotis, & quibus malis		runtur.	74
opitulentur.	72	Quæ uulnera i sanabilia sint.	74
Compositio antidoti.	72	Quæ uulnera difficilem ci-	
Aliud antidotum Ambrosia no-		rationem habeant.	75
minatum, quod Popyrus Pto-		Quæ uulnera tutiorem cu-	
lemæo regi composuit.	72	rationem habeant.	75
Antidotum Mithridatis.	72	Observationes quedam & æta-	
De acopis.	72	tis, & corporis, & uitæ, &	
Acopum & wdes nervis utile.	72	temporis in uulneribus.	75
Ex xpiæ ad ulcera purganda,		Signa percussæ cordis.	75
& implenda.	73	Signa pulmonis icti.	75
Ad sacrum ignem.	73	Signa iocineris uulnerati.	75
De catapotijs.	73	Signa percussorum renium.	75
Catapotiū ualentis ad somnū.	73	Signa uulnerati lienis.	75
Catapotium ad plurimos dolores		Signa percussæ uulnæ.	75
per somnum leniendos.	73	Signa percussæ cerebri, uel mem-	
Catapotium aliud ad multa		branæ eius.	76
uolens.	73	Signa percussæ stomachi.	76
Catapotiū ad inducendū somnū:		Signa ieiunij intestini, & uentri-	
quod uulua dolens prohibuit.	73	culi uulnerati, & aliorum	
Ad iecur sanandum.	73	intestinorum.	76
Ad finiendos dolores lateris.	73	Signa percussæ medullæ, quæ	
Ad thoracis dolores finiendos.	73	in spina est.	76
Catapotium Athenionis ad		Signa septi transversi percussæ.	76
tussim.	74	Signa uesicæ uulneratæ.	76
Catapotium Heraclidis tarenti-		De sanguine, & sanie, & pure, et	
nij ad tussim, & somnū.	74	eorum speciebus quando ue me-	
Catapotium ad purganda ulcera		lora, deteriora ue sint.	76
in faucibus tussientibus.	74	Curatio aduersus profusionem	
Collice cassij medica.	74	sanguinis in uulneribus.	76
Ad infantem mortuum, aut se-		Curationes aduersus uulnerum	
cundas expellendas.	74	inflammationem.	77
Laborantibus ex partu quid		De glutinatione uulnerum.	77
dari debeat.	74	Quomodo uulnus ligari con-	
Ad adiuvandam uocem.	74	ueniat.	78
Aduersus difficultatē urinae.	74	De ratione uictus, & notis uul-	
Arteriaces compositio quō fiat.	74	nerū, curationibusq; eorū.	78
De quinque generibus noxarū cor-		Curatiōes propriæ articulorū.	78
poris, & primo de uulneribus,		Vulnus quomodo purgandū est.	79

nibus.	101	LIBER SEPTIMVS.
De dentium dolore, & cura- tionibus.	101	De chirurgis, & qui in ea cla- ruerint: & qualis esse chirurgi- cus debeat: & quid in hoc li- bro describatur.
De tonsillis, & earum cura.	102	108
De oris ulceribus, & curationi- bus, & quæ antheræ sint.	102	De luxatis.
De gingivarum ulceribus.	103	108
De una morbo, et curatione.	103	De his, quæ per se intumescunt quomodo exadenda, & curan- da sunt.
De cancro oris.	104	108
De parotibus, quæ sub auribus oriuntur.	104	De bonis, malis, & signis exulce- ratorum.
De umbilici prominentis cura- tione.	104	109
De obscenarum partium uicijs, et curationibus.	104	De fistulis.
De colis morbis, & curatio- nibus.	104	109
De cancri, qui in colle nasci- tur, curatione.	105	De ani fistulis.
De phagedæne in cole nascentis curatione.	106	110
De carbunculo, qui in cole na- scitur.	106	De telis e corpore extrahendis
De testiculorum morbis, & eo- rum curatione.	106	110
De rhagidijs, & Condylomate, & hæmorrhoidibus, alijsq; ani morbis, & curationibus eorum, & primo de rhagidijs.	106	De ganglijs, & meliceride, & a- theromate, & steatomate capi- tis tuberculis.
De condylomate.	106	111
De hæmorrhoidibus.	107	De oculorum uicijs quæ scalpel- lo, & manu curantur.
Si anus, uel os uulue procidit, qua curatione utendū sit.	107	112
De ulcere fungo simili i ano.	107	De crithæ tuberculo palpebra- rum.
De digitorum ulceribus.	107	112
		De chalazia palpebrarum.
		112
		De ungue oculorum, quod mæp- uor a græcis uocatur.
		112
		De enchanti tuberculo.
		113
		De ancyloblepharo oculorum uicio.
		113
		De agylopa fistula oculorum.
		113
		De pilis palpebrarum oculum irritantibus.
		113
		De lagophthalmo oculorum.
		114
		De ectropio.
		114
		De staphylomate oculi.
		114
		De clauis oculorum.
		115
		De natura oculorum, & eorum suffusione.
		115
		De pituita oculorum.
		116
		De aurium morbis, qui manu, et scalpello curantur.
		116

Curta in auribus, labrisq; ac na-	Et de calculo, curationibusq;	125
ribus, quomodo sarari, Et cura	eorum.	125
ri possint.	Que curatio calculosis adhi-	126
De polypi curatione p ferru. 117	beat.	126
De ozena. 117	Signa calculorum, uel harenoso-	127
De ore uicijs, quæ manu, Et fer-	rum, uel mollium.	127
ro curantur. 118	De calculis foeminarum. 127	127
De dentibus. 118	Quæ curatio calculo emulso ha-	128
De uua. 118	benda sit.	128
De lingua. 118	De cancro qui excisa uescia nasci-	128
De abscessu sub lingua. 119	tur, et qua cura uti debeat. 128	128
De labris. 119	Si naturalia foeminarum concu-	129
De ceruicis uicijs, et curatiõe. 119	bitum non admittunt, quomo-	129
De umbilici uicijs. 119	do curari conueniat.	129
Quomodo aqua hydropicis	Qua curatione partus emortuus	130
emittatur. 120	ex utero excutatur.	130
De intestinorum uulneratorum	De ani uicijs, Et eorum cura-	130
curationibus. 120	tione.	130
De interiore parte abdominis ru-	De condylomatum curatiõe. 131	131
pta, Et qua ratione curanda	De uaricum curatione. 131	131
sit. 121	Curatio digitoru coheretia. 131	131
De uariabus ueneris. 121	De cangrenæ curatione. 132	132
De testiculorum natura, Et mor-		
bis eorum. 121		
De testiculoru curatiõibus cõibus,	LIBER OCTAVVS.	
Et primo de incisione, Et cura	De positu, Et figura totius huma-	
tione inguinis, uel scroti. 122	ni corporis. 132	132
De intestini curatione. 123	Ossa uiciata, Et corrupta quibus	
De omenti curatione. 124	signis cognoscantur: Et qua	
De ramicis curatione. 124	ratione curentur. 134	134
De carne, quæ iter tunicis testicu-	Quomodo os excidatur, et de mo-	
lorum concreuit: Et de nervo	diolo, Et terebra ferramentis	
indurato. 125	ad id paratis. 135	135
De ramice inguinis. 125	De caluarie curatione. 136	136
Ad tegendam gladem colis si nu-	De narium fracturarum curatio-	
da est. 125	ne. 138	138
Quomodo glans penis contacta	De auriu fracturaru curatiõe. 138	138
aperiri possit. 125	De maxillæ fracturæ curatione:	
Infibulandi ratio. 125	deq; quibusdam ad omnia ossa	
De urinae reddendæ difficultate,	pertinentibus. 138	138

De iuguli fracti curatione. 139

De costarum fractarum curatione. 139

De spine curatione. 140

De humerorum, brachiorum, femorum, crurum, digitorum fractorum, uel emulforum, comminibus curationibus. 140

De fracti humeri curatione. 141

De brachij fracti curatione. 141

De crurum, femorumq; fractorum curatione. 142

De fracti digiti curatione. 142

Communes curationes ad humeros, brachia, crura, femina, digitosq; confractos pertinentia. 142

De luxatis ossibus. 143

De maxilla luxata curatione. 144

De capite luxato. 144

De spina luxata. 144

De humero luxato. 144

De cubiti luxati curatione. 145

De manu luxata. 145

De palma. 145

De digitis. 146

De femore. 146

De genu. 146

De talo. 146

De planta. 147

De digitis. 147

INDEX QUINTI SERENI.

Capiti medendo. 149

Hemocraneo medendo. 149

Porrigini depellendæ. 149

Capillo tingendo. 149

Phthiriasi arcendæ. 149

Prurigni, papulis, & scabiei arcendis. 150

Frenesi, ac capiti purgando. 150

Fluori capillorum, & maculis capitis tollendis. 150

Frigori sedando. 150

Elephantiasi propellendæ. 150

Cutis, & faciei uitij propellendis. 150

Aurium uitij succurrendis. 151

Oculorum dolori mitigando. 151

Dentium uitio, & oris foetori medendo. 152

Vulvæ faucibus, & quæ mollienda sunt medendis. 152

De rigore cervicis. 152

Tussi, & coleribus medendis. 152

Digestioni, & stomacho. 153

Felli uomitus, uel phthiriasi arcendis. 153

Mammis sanandis, uel stringendis. 153

Reiectioni cibi, aut sanguinis absanandæ. 153

Iecoris, & lateris uitij medendis. 154

Spleni curando. 154

Præcordijs sanandis. 154

Lûbis, & renibus sanandis. 154

Ventris dolori mitigando. 155

Hydropisi depellendæ. 155

Ventri molliendo. 155

Solutioni uentris, & dysenteriae compescendae.	156	Comitiali morbo medendo.	162
Lumbricis, & tinea purgan- dis.	156	Regio morbo expellendo.	162
Colo sedando.	156	Dentibus, uel strigis inquietatis infantibus.	162
Vesicae, & calculo purgando: & urinae prouocandae.	156	Combusturis igne, uel frigore factis.	162
De conceptione, & partu.	157	Venenis prohibendis.	162
Proflusio cuiusq; sanguinis, & matrici.	157	Venenis datis.	162
Pilis quibuscunq; internecandis, quae oculos impediunt.	157	Vulneribus, & rei dubiae cu- randis.	163
Omnibus obsecenis medendis.	157	Verrucis tollendis.	163
Scies, & articulari morbo.	158	Haemorrhoidis medendis.	163
Furunculo medendo.	158	Paralysi depellendae. primo die ita agendum.	163
Carboni medendo.	158	Secunda ita medendum est.	163
Pani, uomicae, & strumae depel- lendis.	158	Tertia die ita curandum est.	163
Igni sacro medendo.	159	Quid quarta die, & reliquis peragendum sit.	164
Podagrae depellendae.	159		
Vulneribus ferro, aut uerberi- bus factis.	159		
Vulneribus quibuscunq; casibus actis.	159		
Ab homine, uel simia morsus	159		
Serpentium morsibus, & uenenis pellendis.	159		
Istibus scorpj, & morsibus mu- ris caeci, uel aranei.	160		
Subitaneo dolori, feбри, atq; ostho- copo.	160		
Ad Typum quartanae.	160		
Ad Typum tertianae.	161		
Ad Typum quotidianae.	161		
Hemitritaeo depellendo.	161		
Fracturis, & luxis sanandis.	161		
Neruis incisis, & dolentibus, atq; contractis.	161		
Aegris somno asciscendo.	161		
Letbargiae expellendae.	162		

AVRELII CORNELII CELSI ARTIVM
LIBER SEXTVS, IDEM MEDI-
CINAE LIBER PRIMVS.

T alimenta sanis corporibus agricultura, sic
sanitatem aegris medicina promittit. haec qui-
dem nusquam non est. siquidem etiam im-
peritissimae gentes herbas, aliq; prompta in
auxilium vulnerum, morborumq; nouerunt.
Veruntamen apud Graecos aliquanto magis,
quàm in cæteris nationibus exulta est. ac ne

apud hos quidem à prima origine, sed paucis ante nos saeculis: ut po-
te cū uetustissimus auctor Aesculapius celebretur. qui quoniam adhuc
rudem, & uulgarem hanc scientiam paulo subtilius excoluit, in deo
rum numerum receptus est. huius deinde duo filij Podalirius, & Ma-
chaon bello troiano ducem Agamemnonem secuti, non mediocrè opẽ
commilitonibus suis attulerunt. quos tamen Homerus non in pestilen-
tia, neq; in uarijs generibus morborum aliquid attulisse auxilij: sed
uulneribus tantummodo ferro, & medicamentis mederi solitos esse pro-
posuit. ex quo apparet has partes medicinae solas ab his esse tentatas:
easq; esse uetustissimas. Eodemq; auctore disci potest morbos tum ad
iram deorum immortalium relatos esse: & ab iisdem opem posci so-
litam. ueriq; simile est inter nonnulla auxilia aduersae ualitudinis,
plerunq; tamen eam bonam contigisse ob bonos mores, quos neq; de-
dia, neq; luxuria tentant. si quidem haec duo, corpora prius in Grae-
cia, deinde apud nos affligerunt. Ideoq; multiplex ista medicina neq;
olim apud Graecos, neq; apud alias gentes necessaria, uix aliquos ex
bonis ad senectutis principia perducat. Ergo etiam post eos, de quibus
retuli, nonnulli clari uiri medicinam exercuerunt, donec maiore stu-
dio literarum disciplina agitari coepit. quæ ut animo præcipue omniū
necessaria, sic corpori inimica est. Primoq; medendi scientia sapientiae
pars habebatur. ut & morborū curatio, & rerum naturæ contem-
platio sub iisdem auctoribus nata sit. scilicet his hanc maxime requi-
rentibus, qui corporū suorū roborā quietā cogitatione, nocturna q; ui-
gilā minuerant. ideoq; multos ex sapientiae professoribus peritos, eius
fuisse accepimus. clarissimos uero ex his Pythagorā, et Empedoclem,
& Democritum. huius autem, ut quidā crediderunt, discipulus Hip-
pocrates Cōus: primus quidē ex omnibus memoria dignus, ab studio
sapientiae disciplinam hanc separauit: uir & arte, & facundia insi-
gnis. post quem Diocles Carystus, deinde Praxagoras, et Chrysippus,

Avrelj Cor.

LIBER

3^a *in quo tempore fuerit
inuenit*

*uicis rōe sine nōe cognitiōe
ne habent n pot*

eum Herophilus, et Erasistratus sic artem hanc exercuerunt, ut etiā in diuersas curandi uias processerint. Iisdemq; temporibus in tres partes medicina diducta est, ut una esset quæ uictu, altera quæ medicamentis, tertia quæ manu mederetur. Primā *διαίτην*, secundā quæ uictu morbos curat longe clarissimī authores etiam altius quædam agitare conati, rerum quoq; naturæ sibi cognitionem uendicauerunt, tanquam sine ea trunca, et debilis medicina esset. Post quos Serapion primus omnium nihil hanc rationalem disciplinam pertinere ad medicinā professus, in usu tantum, et experientis eam posuit. quem Apollonius, et Glaucias, et aliquanto post Heraclides Tarentinus, et aliqui non mediocres uiri secuti, ex ipsa professione se *ἐμπειροὺς* appellauerunt. Sic in duas partes ea quoq; quæ uictu curat, medicina diuisa est: alijs rationalem artem, alijs usum tantum sibi uendicantibus. nullo uero quicq; post eos, qui supra comprehēsi sunt, agitante, nisi quod acceperat: donec Asclepiades medendi rationē ex magna parte mutauit. Ex cuius successoribus Themison nuper ipse quoq; quædam in senectute deflexit. Et per hos quidem maxime uiros salutaris ista nobis professio increuit. Quoniam autem ex tribus medicinæ partibus ut difficillima, sic etiam clarissima est ea, quæ morbis medetur: ante omnia de hac dicendum est. Et quia prima in ea dissensio est, quod alij sibi experimentorum tantummodo notitiā necessariam esse contendunt: alij nisi corporum, rerumq; ratione comperta, non satis potentem usum esse proponunt: indicandum est quæ maxime ex utraq; parte dicantur: quo facilius nostra quoq; opinio interponi possit. Igitur hi qui rationalem medicinā profitentur, hæc necessaria esse proponunt. *αἰτιατῶν*, et morbos continentium causarū notitiā, deinde euidētium: post hæc etiam naturalium actionum nouissime partiū interiorū. Abditas causas uocant in qbus requiritur ex quibus principijs nostra corpora sint: quid secundam, quid aduersam ualeitudinem faciat. Neq; enim credunt posse eum scire quomodo morbos curare conueniat, qui unde hi sint, ignoret. Neq; esse dubiū, quin alia curatione opus sit, si ex quatuor principijs uel superans aliquid, uel deficiens aduersam ualeitudinem creat: ut quidam ex sapientiae professoribus dixerunt. Alia si in humidis omne uitium est, ut Herophilo uisum est. alia si in spiritu, ut Hippocrati. alia si sanguis in eas uenas, quæ spiritui accommodatæ sunt, transfunditur: et inflammationem quam Græci *φλεγμὸν* nominant, excitat: eaq; inflammatio talem motum efficit, qualis in febre est: ut Erasistrato placuit. alia si manantia corpuscula per inuisibilia foramina subsisten-

*Medicini
pro*

*serapion
m.*

Causa

Partes

do iter claudunt: ut Asclepiades contēdit. Eum uero recte curaturū, *Non*
 quem prima origo causae non fecerit. Neque uero insiciantur experi-
 menta quoque esse necessaria. sed ne ad haec quidē aditum fieri potuisse,
 nisi ab aliqua ratione contendunt. Non n. quidlibet et antiquiores viros
 aegris inuolasse: sed cogitasse qd maxime conueniret: et id usu explo-
 rasse, quod ante coniectura aliqua duxisset. neque interesse an initia ple-
 raque explorata sint, si à consilio tamen coeperunt. et id quidē in mul-
 tis ita se habere. Saepe uero et noua inuadere genera morborū, in qui-
 bus nihil adhuc usus ostenderit. et ideo necessariū sit animaduertere
 unde ea coeperint, sine quo nemo mortaliū reperire possit, cur hoc,
 qui in illo potius utatur. et ob haec quidē in obscuro positas causas per-
 sequuntur. Euidentes uero has appellant, in quibus querunt initium mor-
 bi calor attulerit, an frigus. fames, an satietas. et quae similia sunt. Oc-
 cursum enim uitio dicunt eum, qui originē non ignorarit. Naturales
 uero corporis actiones appellant, per quas spiritū trahimus, et emitti-
 mus cibum: potionemque, et assumimus, et concoquimus. Itemque per quas
 eadē haec in omnes membrorum partes digeruntur: tum requirunt et
 quare uenae nostrae modo submittant sese: modo attollant. quae ratio
 somni, quae uigiliae sit. sine quorum notitia neminem putant uel cau-
 rere, uel mederi morbis, inter haec nascentibus, posse. Ex quibus quia
 quā maxime pertinere ad rem concoctio uidetur. Huic potissimū in-
 stant: et duce alij Erasistrato atteri cibū in uentre contendunt. alij Pli-
 stonico Praxagorae discipulo putrescere. Alij credunt Hippocrati p-
 calorem abos concoqui. Acceduntque Asclepiadis amuli, qui omnia ista ua-
 na, et superuacua esse proponunt. Nihil enim concoqui, sed crudā mate-
 riā, sicut assumpta est, in corpus omne diduci. Et haec quidē inter eos
 parū constant. Illud uero cōuenit, alium dandū cibum laborātibus, si
 hoc: alium si illud uerū est. Nam si teritur intus, eum querendū esse,
 qui facillime teri possit. Si putrescat, eū in quo hoc expeditissimū est.
 Si calor concoquit, eū qui maxime calorem moueat. At nihil ex his eē
 querendū, si nihil concoquitur. Ea uero sumunda, quae maxime manēt,
 qualia assumpta sunt. Eadēque ratione cū spiritus grauis est, cū somnus
 aut uigilia urget, eū mederi posse arbitrantur: quod prius illa ipsa, quali-
 ter eueniant, peperit. Præter haec cū in interioribus partibus et dolores,
 et morborū uaria genera nascantur, neminē putant his adhibere posse
 remedia, quae ipse ignoret. Necessariū ergo esse inuadere corpora mer-
 tuorum: eorumque uiscera, atque interna scrutari. Longeque optime fecisse Hero-
 philū, et Erasistratū, qui nocētes homines à regibus ex carcere acceptos, Hippocrati et Erasistrato
 uinos inuaderint: considerantque et spiritu manente, ea quae natura an-
 te clausisset: eorumque positurā, colorem, figurā, magnitudinē, ordinem,
 et uisum.

*Niclas inuolens
 aeternum*

*Hippocrati et Erasistrato
 recipiunt homines
 et uinos inuadunt
 et uisum*

a ij

LIBER

duritiem, molliem, leuorem, contactum: processus deinde singulorū,
 & recessus: & siue quid inferitur alteri: siue quid partē alterius in
 se recipit. Neq; enim cum dolor inus incidit, scire quid doleat eum,
 qui qua parte quodq; viscus intestinum'ue sit, non cognouerit. Neq; cu
 rari id quod aegru est, posse ab eo, qui quid sit, ignoret. Et cum p vul
 nus alicuius viscera patefacta sunt, eum, qui sanæ cuiusq; colorē par
 tis ignoret, nescire quid integrū, quid corruptum sit. Ita ne succurre
 re quidem posse corruptis. aptiusq; extrinsecus imponi remedia, cō
 pertis interiorum, & sedibus, & figuris. Cognitūq; eorū magnitudi
 ne, similesq; omnia, quæ posita sunt, rationes habere. Neq; esse crude
 le, sicut pleriq; proponunt, hominū nocentium: & horum quoq; pau
 corum supplicij remedia populus in iocentibus seculorum omnū quæ
 ri. Contra hi, qui se ἐμπειρὺς ab experientia nominant: euidentēs
 quidē causas ut necessarias amplectuntur. Obscurarū uero causarum,
 & naturalium actionum quæstionem ideo supernam esse conten
 dunt, quoniam incōprehensibilis natura sit. non posse uero cōprehē
 di, patere ex eorum, qui de his disputarunt, discordia: cum de ista re,
 neq; inter sapiētiae professores, neq; inter ipsos medicos conueniūt. Cur
 enim potius aliquis Hippocrati credat, q̄ Herophilo? Cur huic potius,
 q̄ Asclepiadi? si rationes sequi uelit, omnium posse uideri non impro
 bables. si curationes, ab omnibus his egros perductos esse ad sanitatē.
 Ita neq; disputationi, neq; auctoritati cuiusq; fidē derogari oportuisse.
 Etiam sapientiæ studiosos maximo: medicos esse, si ratio natio hoc fa
 ceret. nunc illis uerba superesse, deesse medendi scientiam. Differre
 quoq; pro natura locorū genera medicinæ: & aliud opus esse Romæ:
 aliud in Aegypto: aliud in Gallia. Quod si morbos eadem causæ face
 rent ubiq; remedia quoq; ubiq; eadē esse debuissent. sape ēt causas ap
 parere: ut puti lippitudinis, uulneris, neq; ex his patere medianam.
 Quod si scientiā hanc non subiiciat euidentis causa, multo minus eam
 posse subijcere, quæ in dubio est. Cū igitur illa incerta incōprehēsi
 bilisq; sit, a certis potius, et exploratis petendū esse præsidij. i. his, quæ
 experiētia in ipsis curationibus docuerit, sicut in cæteris omnibus ar
 tibus. Nam ne agricolam quidem, aut gubernatorem disputatione, sed
 usu fieri. ac nihil istas cogitationes ad medicinam pertinere. Eo quoq;
 disci, quod qui diuersa de his scripserint, ad eandē tamen sanitatē ho
 mines perduxerint. id enim fecisse, q̄ a nō ab obscuris causis, neq; a na
 turalibus actionibus, quæ apud eos diuersæ erant: sed ab experimen
 tis pro ut cuiq; responderant, medendi uias traxerint: ne inter initia
 quidem ab istis quæstionibus deductā esse medicinam, sed ab experi
 mentis. Aegrorum enim, qui sine medicis erāt, alios propter auiditatē

Medicini solum locum

Exempum

primis diebus protinus cibum assumpsisse: alios propter festi diu absti-
 nuisse: leuatumq; magis eorū morbum esse, qui abstinnerant. Itemq;
 alios in ipsa febre aliquid edisse: alios paulo ante ea: alios post remissio-
 nem eius. optime deinde his cessasse, qui post finē febris id fecerint. Ea
 deq; ratione alios inter principia protinus usos esse cibo pleniore: alios
 exiguo: grauioreq; eos factos, qui se impleverint. *Hæc similiaq; cū coti-* *Medicinis ergo*
die inciderent, diligentes homines notasse, quæ plerunq; melius respon-
derent: deinde ægrotantibus ea præcipere cœpisse. sic medicinam ortā,
subinde aliorū salute, aliorū interitu: perniciofa discernentē à salutaribus.
 Repertis deinde medicine remedijs, hoies de rationibus corū disse-
 rere cœpisse: nec post rationē medicinam esse inuentam, sed post inue-
 tam medicinā rationē esse quasitam. Requiere et si ratio idē doceat
 quod experientia, an aliud. Si idē, superuacua esse. si aliud, et con-
 trariam. Primo tamen remedia explorāda summa cura fuisse. nunc
 uero iam explorata esse: neq; ulla, aut noua genera morborū reperiri,
 aut nouam desiderari medicinā. Quod si id incidat mali genus ali-
 quod ignotū: non ideo tamen fore medico de rebus cogitandū obscu-
 ris: sed eū protinus uisurū, cui morbo id proximū sit: tentaturūq; re-
 media similia illis, quæ uicino malo sæpe succurrerint: et per eius si-
 militudinē opem reperturū. Neq; n. se dicere consilio medicū non ege-
 re: et irrationale animal hanc artē posse præstare. sed has latentiu
 rerū coniecturas ad rē non pertinere: quia non inter sit, quid morbi
 faciat, sed quid tollat. Neq; ad rē pertineat quomodo, sed qd optima
 digeratur: siue hac de causa cōcoctio incidat, siue de illa. et siue cō-
 coctio sit illa, siue tantū digestio. Neq; quærēdū esse quomodo spiremus:
 sed quid grauē, tardūq; spiritū expediat. neq; quid uenas moueat:
 sed quid quæq; motus genera significant. Hæc aut cognosci experimē-
 tis, et in omnibus eiusmodi cogitationibus in utrāq; partē differi pos-
 se. Itaq; ingeniū et facundiam uincere: morbos aut non eloquentia, *Non*
 sed remedijs curari. Quæ si quis elinguis usu discreta bene norit: hūc
 aliquanto maiore medicinam futurū: q̄ si sine usu linguā suā excolue-
 rit. Atq; ea quidē, de quibus est dictū, superuacua esse tantummodo.
 Id uero quod restat et crudele: uiuorū hominum: aliū, atq; præcor-
 dia incidit: et salutis humanæ præsidē artem n. n. solū pestem alicui,
 sed hanc et atrocissimam inferre: cū præsertim ex his, quæ tanta uio-
 lentia quærantur, alia non possint omnino cognosci: alia possint et
 sine scelere. nā colorem, læuorē, mollitiem, duritiem, similiaq; omnia
 nō esse talia in cō corpore, qualia integro fuerint. q̄ cū corporibus in-
 uiolatis, hæc tamen metu, dolore, inedia, cruditate, lassitudine, mille alijs
 mediocribus affectibus sæpe mutantur: multo magis uerisimile est inte-

LIBER

viora, quibus maior mollities lux ipsa noua sit, sub grauissimis ulneribus et ipsa trucidatione mutari: neque quicquam esse stultius, quam quale quidque uiuo homine est, tale existimare esse moriente, immo iam mortuo.

Nam utrum quidem, qui minus ad rem pertineat, spirante homine posse diduci? simulatque uero ferrum ad praecordia accessit: et discissum transversum septum est: quod membrana quadam superiores partes ab inferioribus diducit, (διὰ πρᾶξιν, ἢ γὰρ ἡμεῖς ἰατροὶ οὕτως ἔχοντες) hominem protinus animam amittere. Ita demum mortui praecordia, et uiscus omne in conspectum latrocinantis medici dari: quod necesse sit tale esse, quale mortui sit: non quale uiui fuit. Itaque consequi medicum ut hominem crudeliter iugulet: non ut sciat qualia uiui uiscera habeamus. Si quid tamen sit, quod adhuc spirante homine conspectui subiiciatur, id saepe casum offerre curantibus. Interdum enim gladiatorem in harena, uel militem in acie, uel uiatorem a latronibus exceptum, sic uulnerari: ut eius interior aliqua pars aperiatur: et in alio alia sita: sedes, positum, ordinem: figuram: similiaque alia cognoscere prudentem medicum non cadere, sed sanitatem molientem: idque per misericordiam discere, quod alij dira crudelitate cognouerint. Ob haec ne mortuorum quidem laceratione necessariam esse: quae et si non crudelis, tamen foeda sit: cum aliter pleraque in mortuis se habeant. Quatum uero in uiuis cognosci potest, ipsa curatio ostendat. Cum haec per multa uolumina, per quae magnae contentione disputationes a medicis saepe tractata sint, atque tractentur: subiiciendum est, quae proxima uero uideri possint: ea neque addicta alterutri opinioni sunt: neque ab utraque nimium abhorrentia, media quodammodo inter diuersas sententias. Quod in plurimis contentionibus deprehendere licet sine ambitione uerum scrutantibus: ut in hac ipsa re. Nam quae demum causae uel secundam ualitudinem praesent: uel morbos excitet: quomodo spiritus, aut cibus uel detrahatur, uel digeratur: ne sapientiae quidem professores scientia comprehendunt: sed coniectura persequuntur. cuius autem rei non est certa noticia, eius opinio certum reperire remedium non potest. Verumque est ad ipsam curandi rationem nihil plus conferre, quam experientiam. Quamquam igitur multa sint ad ipsas artes proprie non pertinentia: tamen eas adiuvat excitando artificis ingenium. Itaque ista quoque naturae rerum contemplatio quae non faciat medicum aptiorem, tamen medicinae reddit perfectum. Verumque simile est et Hippocrati, et Erasistrato, et quicumque alij non contenti febres et ulcera agitare, rerum quoque naturam ex aliqua parte scrutati sint: non ideo quidem medicos fuisse: uerum ideo quoque maiores medicos extitisse. Ratione uero opus est ipsi medicinae, et si non inter obscuras causas, neque inter naturales actiones, tamen saepe. Est uero haec ars coniecturalis: neque respondet ei plerumque non solum coniectura,

sed etiam experientia. et interdum non febris, non cibus, non somnus
 subsequitur sicut affuerit. Rarius, sed aliquando tamen morbus quoque
 ipse nouus est, quem non incidere, manifeste falsum est: cum aetate no-
 stra quaedam ex naturalibus partibus carne prolapsa, et arente, in-
 tra paucas horas expirauerit: sic ut nobilissimi medici neque genus
 mali, neque remedium inuenerint: quos ego nihil ideo tentasse iudico:
 quia nemo in splendida persona periclitari coniectura sua ueluerit:
 ne occidisse, nisi seruasset, uideretur. Veri tamen simile est, potuisse ali-
 quid cogitare detracta tali uerecundia: et fortasse responsurum
 fuisse id quod aliquis esset expertus. Ad quod medicinae genus neque
 semper similitudo aliquid confert: et si quando confert: tamen id ip-
 sum rationale est inter multa similia genera et morborum, et reme-
 diorum cogitare, quo potissimum medicamento sit utendum. Cum igitur
 talis res incidit: medicus aliquid oportet inueniat: quod non utique
 fortasse, sed saepius tamen etiam respondeat. Petet autem nouum
 quoque consilium non ab rebus latentibus (istae enim dubiae, et incer-
 tae sunt) sed ab his quae explorari possunt: idest euidentibus cau-
 sis. Interest enim fatigatio morbi: an sitis, an frigus, an calor, an uigilia,
 an fames fecerit: an cibi, uinique abundantia: an intemperantia libi-
 dinis: neque ignorare hunc oportet, quae sit aegri natura, humidum ma-
 gis, an magis siccum corpus eius sit: ualidi nerui, an infirmi: frequens
 aduersa uoletudo, an rara, ea, quae cum est, uehemens esse soleat: an le-
 uis, breuis, an longa. Quod is uitae genus sit secutus, laboriosum, an
 quietum, cum luxu, an cum frugalitate. ex his enim, similibusque saepe co-
 rrandi noua ratio ducenda est. Quamuis ne haec quidem sic praeteriri
 debent, quasi nullam controuersiam recipiant. Nam et Erasistratus non
 ex his fieri morbos dixit: quoniam et alij, et uide alia post ista non febri-
 citarent: et quidam medici saeculi nostri sub authore (ut ipsi uideri uo-
 lunt) Themisone contendunt nullius causae notitiam quicquam ad curatio-
 nes pertinere: satisque esse quaedam coia morborum intueri. si quidem ho-
 rum tria genera esse, unum adstrictum, alterum fluens, tertium mixtum.
 Nam modo parum excernere aegros, modo nimium: modo alia parte pa-
 rum, alia nimium. Haec autem genera morborum modo acuta esse, modo lon-
 ga: et modo incrementum, modo consistere: modo minui consueuerunt. Co-
 gnito igitur eo quod ex his est, si corpus adstrictum est, digerendum esse:
 si profluvio laborat, continendum. si mixtum uitium habet, occurrendum
 subinde uehementiori malo. et aliter acutis morbis medendum, aliter ue-
 tustis. aliter incrementibus, aliter subsistentibus. aliter iam ad sanitatem
 inclinantibus. Horum observationem medicinam esse: quam ita finiunt, ut
 quasi uiam quandam quam methodos graeci nominant: eorumque quae in

*cinchona bark
 singly.*

general mor...

LIBER

morbis cōia sunt, contemplatricē esse contendunt: ac neq; rationalibus
 se, neq; experimēta tantum spectatibus annumerari uolunt: cū ab illis
 eo nomine dissentiant, quod in cōiectura rerū latentū nolunt esse me-
 dicinā: ab his eo quod parū artis esse in obseruatione experimentorū
 credunt. Quod ad Erasistratū pertinet, primū ipsa euidentia eius
 opinioni repugnat: q̄a raro nisi post horū aliquid morbus uenit. De-
 inde non sequitur, ut quod aliū non afficit, aut eundē aliās: id ne al-
 teri quidē, aut eidem tempore alio noceat. Possunt enim quēdā subesse
 corpori, uel ex infirmitate eius, uel ex aliquo affectu: quæ uel ī alio nō
 sunt: uel in hoc aliās nō fuerunt. eaq; p se non tanta ui concitant mor-
 bum: tamen obnoxiiū magis alijs iniurijs corpus efficiunt. Quod si cō-
 tēplationem rerū naturæ, quā temere medici sibi uendicant: satis cō-
 prehēdisset: et illud scīsser: nihil omnino ob unā causam fieri, sed id pro
 causa apprehendi: quod cōtulisse plurimū uidetur. Potest aut id dū so-
 lum est, nō mouere: quod iunctū alijs maxime mouet. Accedit ad hæc,
 quod ne ipse quidē Erasistratus, qui trāsffuso in arterias sanguine, fe-
 brem fieri dicit: idq; nimis repleto corpore incidere repperit: aut ex
 duobus æque repletis, alter in morbū inciderit: alter omni periculo
 uacuit: quod cotidie fieri apparet, nō discreuerit. Ex quo disci pōt, ut
 uera sit illa trāsffusio, tamen illā non p se, cum plenū corpus est, fieri:
 sed cū horū aliquid accesserit. Themisonis uero æmuli, si ppetua quæ
 promittunt, habent: magis ē q̄ ulli rationales sunt. Neq; n. si quis nō
 omnia tenet, quæ rationalis alius probat: protinus alio nouo nomine
 artis indiget. Si modo, quod primū est: non memoriæ soli, sed rationi
 quoq; insit. Si quod uero propius est, uix ulla perpetua præcepta
 medicinalis ars recipit: ijdē sunt, quod hi, quos experimenta sola susti-
 nent. Eo magis qm si cōpresserit aliquē morbus, an fuderit: quilibet
 ē imperitissimus uidet. Quid aut cōpressum corpus resoluat: quid so-
 lutū teneat: si à ratione tractū est, rationalis est medicus. Si ut ei, qui
 se rationale negat, cōfiteri necesse est: ab experientia empiricus est. Ita
 apud eū morbi cognitio extra artē, medicina intra usum ē. Neq; ad-
 iectum quicq; empiricorū professioni, sed demptum est: qm illi multa
 circūspiciunt: hi tantum facillima et non plusq; uulgaria. Nā et hi
 qui pecoribus ac iumentis medentur, cū propria cuiusq; ex multis ani-
 malibus nosse non possint: cōibus tantummodo insistant. Et exteræ gē-
 tes, cum subtilē medicinæ rationē non nouerint: cōia tantum uident.
 Et qui ample ualitudinarios nutriunt, quia singulis summa cura cō-
 sulere non subsistent: ad cōia ista confugiunt. Neq; Hercules istud, et
 antiqui medici nescierunt: sed his contenti non fuerunt. Ergo ēt uetu-
 sissimus author Hippocrates dixit mederi oportere et cōia, et pro-

pria inueniēte. Ac ne isti quidē ipsi intra suam professionem consistere ullo modo possunt. si quidē & cōpressorum, & fluentium morborum genera diuersa sunt: faciliusq; id in his quæ fluunt, inspicī pōt. Aliud est. n. sanguine, aliud bilem, aliud cibū uomere: aliud deiectionibus, aliud torminibus laborare: aliud sudore digeri: aliud tabe cōsumi. Atq; in partes quoq; humor erumpit, ut in oculos, auresq;. quo periculo nullum humanū membrum uacat: nihil aut horū sic, ut aliud curatur. Ita protinus in his à cōi fluentis morbi contēplatione ad propriam medicina descendit. Atq; in hac quoq; rursus alia proprietatis noticia sepe necessaria est: quia non eadē omnibus et in similibus casibus opitulantur. si quidē certæ quædā res sunt, quæ in pluribus uē trem aut astringunt, aut resolunt: inueniuntur tñ in quibus aliter, atq; in cæteris idemeueniat. In his ergo cōmunium inspectio contraria est: priorū tantū salutaris: et causæ quoq; æstimatio sepe morbum soluit. Ergo et ingeniosissimus seculi nostri medicus, quem nuper uidimus, Cassius febricitanti cuidam, & magna siti affecto, cum post ebrietatem eū premi cœpisse cognosceret: aquam frigida ingessit: quæ ille epotæ, cum uini uim miscendo fregisset, protinus febrē, omni & sudore discussit. Quod auxilium medicus opportune prouidit, nō ex eo, quod aut strictum corpus erat, aut fluebat: sed ex causâ, quæ ante præcesserat. Estq; etiam propriū aliquid & loci, & temporis istis quoq; authoribus: qui cum disputant quemadmodum sanis hominibus agendum sit, præcipiunt ut grauib; aut locis, aut temporibus magis uiuetur frigus, æstus, sacietas, labor, libido: magisq; ut conuiescat hisdem aut locis aut temporibus, si quis grauitatem corporis sentit: ac neq; uomitu stomachum, neq; purgatione aluum sollicitet. Quæ uera quidem sunt: à communibus tamen ad quædam propria descendunt. nisi persuadere nobis uolunt, sanis quidem considerandum esse: quod cælum, quod tempus anni sit, ægris uero non esse: quibus tanto magis omnis observatio necessaria est, quanto magis obnoxia offensis infirmitas est. Quin etiam morborum in hisdem hominibus aliæ, atq; aliæ proprietates sunt: & qui secundis aliquando frustra curatus est: contrarijs sepe restituitur. Plurimaq; in dando cibo discrimina reperiuntur: ex quibus contentus uno ero. nam famem facilius fert adulescens, quàm puer: facilius in densò cælo, quàm in tenui: facilius in hyeme, quàm in æstate: facilius uno cibo, quàm prandio quoq; assuetus: facilius in exercitatus, quàm exercitatus homo sustinet. Sepe autem in eo magis necessaria cibi festinatio est, qui minus in diem tolerat. Ob quæ competit eum qui propria non nouit, communia tantum intueri debere: cumq; qui nosse propria potest, illa quidem non oportere negli-

Cassius

Ald. 3. 4. 6

LIBER

gere, sed his quoque insistere. Ideoque cum par scientia sit, utiliore tamen medicum esse amicum, quam extraneum. Igitur ut ad propositum meum redeam, rationalem quidem puto medicinam esse debere: instrui vero ab evidentibus causis, obscuris omnibus non à cogitatione artificis, sed ab ipsa arte reiectis. Incidere autem uiuorum corpora, et crudele, et superuacuum est: mortuorum corpora discentibus necessarium. Nam positum, et ordinem nosse debent, quæ cadauera melius, quam uiuus et uulneratus homo representant: sed et cætera quæ modo in uiuis cognosci possunt, in ipsis curationibus uulneratorum paulo tardius, sed aliquando mitius usus ipse monstrauit. His propositis, primum dicam quemadmodum sanos agere conueniat: tum ad ea transibo, quæ ad morbos, curationesque eorum pertinebunt.

Caput primum quemadmodum sanos agere conueniat.

Anus homo qui et bene ualet, et suæ spontis est, nullis obligare se legibus debet: ac neque medico, neque iatrolipta egere. Huc oportet uariū habere uitæ genus: modo ruri esse, modo in urbe: sæpiusque in agro, nauigare, uenari, quiescere interdum: sed frequentius se exercere. Siquidem ignauia corpus hebetat: labor firmat. illa maturam se nequitiam: hic longam adolescentiam reddit. Prodest etiam interdum balneo, interdum aquis frigidis uti. modo ungi, modo id ipsum negligere. nullum cibi genus fugere, quo populus utatur. interdum in conuiuio esse: interdum ab eo se retrahere. modo plus iusto, modo non amplius assumere. bis die potius, quam semel cibum capere, et semper quam plurimum, dummodo hunc concoquat. Sed ut huius generis exercitationes, cibique necessarii sunt, sic athletici superuacui: nam et intermissus propter ciuiles aliquas necessitates ordo exercitationis corpus affligit: et ea corpora, quæ more eorum repleta sunt, celerrime, et senescunt, et ægrotant. Concubitus uero neque nimis concupiscendus, neque nimis pertimescendus est. Rarus corpus excitat: frequens soluit. Cum autem frequens non numero sit, sed natura: ratione ætatis et corporis: scire licet eum non inutilem esse, quem corporis neque languor, neque dolor sequitur. Idem interdum peior est, nocturnus tutior. ita tamen si neque illum abusus, neque hunc cum uigilia labor statim sequitur. Hæc firmis seruanda sunt: cauendumque ne in secunda ualetudine aduersa præsidia consumantur.

Quæ stomacho imbecilli seruanda sint, Caput secundum.

Stomachus.

T imbecillis stomacho, quo in numero magna pars urbanorum, omnesq; penè cupidi literarum sunt: obseruatio maior necessaria est. ut quod uel corporis, uel loci, uel studij ratio detrahit, cura restituat. Ex his igitur q; bene concoxit, mane tuto surget. qui parū, quiescere debet. Et si mane surgendi necessitas fuerit, redormire. Qui nō concoxit, ex toto conuiescere: ac neq; labori se, neq; exercitationi, neq; negotio credere. Qui crudū sine præcordiorum dolore ructat, is ex intervallo aquā frigidam bibere: Et se nihilominus continere. Habitare uero ædificio lucido per flatum æstiuum hibernum solem habente. cauere meridianum solem: matutinum, Et uespertinum frigus: itemq; auras fluminum, atq; stagnorum: minimeq; núbilo cœlo soli aperienti se committere: ne modo frigus, modo calor moleat. quæ res maxime grauedines, distillationesq; concitat. Magis uero grauib; locis ista seruanda sunt: in quibus est pestilentiam faciunt. Scire aut licet integrum corpus esse, cum cotidie mane urina alba, dein ruffa est. Illud concoquere, hoc concoxisse significat. Vbi ex perrectus est aliquis, paulum intermittere: deinde nisi hyems est, fouere os multa aqua frigida debet, longis diebus meridiari potius ante cibum, sin minus, post eum. per hyemem potissimum totis noctibus conuiescere. sin lucubrandum est, nō post cibum id facere, sed post concoctionem. Quem interdū uel domesticis, uel ciuilib; officiis tenuerunt: huic tempus aliquod seruandum curationi corporis sui est. prima autem eius curatio exercitatio est: quæ semper antecedere cibum debet: in eo qui minus laborauit, Et bene concoxit, amplior. in eo qui fatigatus est, Et minus concoxit, remissior. Commodè uero exercent clara lectio, arma, pila, cursus, ambulatio: atq; hæc non utiq; plana commodior est. siquidem melius ascensus quoq; Et descensus cum quadam uarietate corpus moueat: nisi tamen id perquam imbecillum est. melior autem est sub diuo, quàm in porticu. melior si caput patitur, in sole, quàm in umbra. melior in umbra, quam parietes, aut uiridaria efficiunt, quàm quæ tecto subest. melior recta, quàm flexuosa. exercitationis autem plerunq; finis esse debet sudor: aut certe lassitudo, quæ citra fationem sit: idq; ipsum modo minus, modo magis faciendum est. Ac ne his quidem athletarum exemplo, uel certa esse lex, uel immodicus esse labor debet. Exercitationem recte sequitur modo unctio uel in sole, uel ad ignem: modo balneū, sed conclauī quam maxime, Et alto, Et lucido, Et spaciofo. Ex his uero neutrum sepe fieri oportet: sed sepius alterutrum

Exercitatio.
6 Epul. f. 2

LIBER

pot. 2. 3
in liq. potu qua
cibo repleri. 9

Secunda mensa
qbus nocet.

potio aquae frigidae
qñ faciunda.

Labor qñ vitandus

pro corporis natura. Post hæc paulum conuiescere opus est. ubi ad cibum uentum est: nunquam utilis est nimia sacietas. sæpe etiam inutilis nimia abstinentia. sæpe si qua intemperantia subest: tutior est in potione quam in esca. Cibus à salsamentis, oleribus, similibusq; rebus melius incipit. Tum caro assumenda est, quæ assa optima, aut elixa est. Condita omnia duabus de causis inutilia sunt. quoniam et plus propter dulcedinem assumitur: et quod modo par est, tamen ægrius concoquitur. Secunda mensa bono stomacho nihil nocet: in imbecillo coacta. si quis itaq; hoc parum ualet, palmulas, pomaq; et similia melius primo cibo assumit. Post multas potiones, quæ aliquantum sitim exarserunt, nihil edendū est. post sacietatem, nihil agendum. Vbi expletus est aliquis, facilius concoquit: si quicqd assumpsit, potione aquæ frigidae includit: tum paulisper inuigilat: deinde bene dormit. Si quis interdum se implebit: post cibum neq; frigori, neq; aestui, neq; labori se debet committere. neq; enim tam facile hæc inanī corpore, quā repleto nocet. Si quibus de causis futura inedia est: labor omnis uitandus est.

Observationes quedam prout res nouæ accidunt: et prout corporū genera, et sexus, et ætates, et tempora anni sunt. Caput tertium.

Atq; hæc quidem penè perpetua sunt. Quasdam aut observationes desiderant et nouæ res, et corporū genera, et sexus, et ætates, et tempora anni. Nam neq; ex salubri loco in grauem, neq; ex graui in salubrem transitus satis tutus est. Ex salubri in grauem prima hyeme, ex graui in eum, qui salubris est, prima æstate transire melius est. Neq; uero ex multa fame nimia sacietas: neq; ex nimia sacietate famēs idonea est. Periclitaturq; et qui semel, et qui bis die cibum incontinenter contra consuetudinem assumit. Item neq; ex nimio labore subitum otium: neq; ex nimio otio subitus labor sine graui noxa est. Ergo cum quis mutare aliquid uolet, paulatim debet effuscere. Omnem etiam laborem facilius uel puer, uel senex, quam insuetus homo sustinet. Atq; ideo quoq; nimis ociosa uita utilis non est, quia potest incidere laboris necessitas. Si quando tamen insuetus aliquis laborauit, aut multo plus quam solet, etiam si qui assueuit, huic ieiunio dormiendum est: multo magis si etiam os amarum est: uel oculi caligant: aut uenter perturbatur. Tum enim non dormiendum tantummodo ieiunio est, sed etiam in posterum diem permanendum: nisi cito id quies sustulit. Quod si factum est: surgere oportet, et lente paululum ambulare. At si somni necessitas non fuit, quia modice magis

aliquis laborauit, tamen ingredi aliquid eodē modo debet. Cōmuni-
 deinde omnibus sunt post fatigationem cibum sumpturi, ubi paulum
 ambulauerunt, si balneum nō est, calido loco uel in sole, uel ad ignem
 ungi: atq; sudare. si est, ante omnia intepidario residere. Deinde ubi
 paulum conquieuerunt, intrare, et descendere in solium. tum multo oleo
 ungi, leniterq; perfricari: iterum in solium descendere. Post hæc os
 aqua calida fouere, deinde frigida. Balneum his feruens idoneū non
 est. Ergo si nimium alicui fatigato penē febris est, huic abunde est loco
 tepido demittere se inguinibus tenus in aquam calidam, cui paulū olei
 adiectum: deinde totum quidē corpus, maxime tamen eas partes, quæ
 in aqua fuerunt, leniter perfricare ex oleo, cui uinum, et paulum con-
 triti salis sit adiectum. Post hæc omnibus fatigatis, aptum est cibum
 sumere, eoq; humido uti. aqua, uel certe diluta potione esse contentos, ma-
 ximeq; ea, quæ moueat urinam. illud quoq; nosse oportet, quod ex la-
 bore sudanti frigida potio perniciosissima est. atq; etiam cum sudor se
 remisit, itinere fatigatis inutilis. A balneo quoq; uenientibus Asclepi-
 ades inutilem eam indicauit. quod in his uerum est, quibus aliud fac-
 le nec tuto resoluitur: quiq; facile inhorrescunt. perpetuū in omnibus
 non est, cum potius naturale sit potione ætuantem stomachum refri-
 gerari: frigentem calefieri. quod ita præcipio, ut tamen fatear ne ex
 hac quidem causa sudanti adhuc frigidum bibendum esse. Solet etiā
 prodesse post uariū cibum, frequentesq; dilutas potiones, uomitus, &
 postero die longa quies, deinde modica exercitatio. Si assidua fatigatio
 urget, inuicem modo aqua, modo uinum bibendum est: raroq; balneo
 utendum. Leuatq; lassitudinem etiam laboris mutatio: cumq; quem
 nouum genus: eiusdem laboris pressit, id quod in consuetudine est, re-
 fidit. Fatigato cotidianum cubile turissimū est: insolitum contra lassat.
 quod enim contra consuetudinem est, nocet, seu molle, seu durum est.
 proprie quedam ad eum pertinent, qui ambulando fatigatur. Hunc
 reficit in ipso quoq; itinere frequens frictio: post iter, primum sedile,
 deinde unctio: tum calida aqua in balneo magis superiores partes, q̃
 inferiores foueat. Si quis uero exustus in sole est, huic in balneum pro-
 tinus eundem est: persundendumq; oleo corpus, & caput. deinde in
 solium bene calidum descendendum est. tum multa aqua per caput in-
 fundenda prius calida, deinde frigida. At ei qui perfruxit, opus est in
 balneo primū inuolutū sedere, donec insudet: tum ungi, deinde lau-
 ri cibum modicum, deinde potiones meracæ assumere. Is uero qui na-
 uigauit, & nauis pressus est, si multam bilem euomuit, uel abstine-
 re cibo debet: uel paulum aliquid assumere. Si pituitam acidam effu-
 dit, utiq; sumere cibum: sed assueto leniorem. Si sine uomitu nauis a

*Fatigatio ex
 & Erasmo.*

LIBER

fuit, uel abstinere, uel post cibū uomere. Qui uero toto die, uel in uhi-
culo, uel in spectaculo sedet, huic nihil currendū, sed lente ambulam-
dum est. Lenta quoq; in balneo mora, dein coena exigua prodesse con-
sueuerunt. Si quis in balneo aestuat, reficiat hunc ore exceptum, & in
eo retentum acetum. si id non est, eodem modo frigida aqua assump-
pta. Ante omnia autem norit quisq; naturā sui corporis: quoniam alij
graciles, alij obesi sunt. alij calidi, alij frigidiores. alij humidi, alij sic-
ci. alios astricta, alios resoluta aluus exercet. raro quisquam non ali-
quam partem corporis imbecillam habet. Tenuis uero homo imple-
re se debet: plenus extenuare: calidus refrigerare: frigidus caleface-
re: madens siccare: siccus madefacere. itemq; aluum firmitate is, cui
fusa soluere is, cui astricta est. Suaturrendumq; semper parti maxi-
me laboranti est. Implet autem corpus modica exercitatio, frequen-
tior quies, unctio. & si post prandium est balneum, contracta aluus,
modicum frigus hyeme, somnus & plenus, & non nimis longus.
molle cubile, animi securitas, assumpta per cibos, & potiones maxime
dulcia & pinguis cibis & frequentior, & quantius plenissimus po-
test concoqui. Extenuat corpus aqua calida, si quis in eam descendit,
magisq; si salsa est. in ieiunio balneū, inurēs sol, et omnis calor, cura,
uigilia, somnus nimium uel breuis, uel longus lectus per astatem ter-
ra, hyeme durum cubile. cursus, multa ambulatio, omnisq; uchemens
exercitatio, uomitus, deiectio, acida res et austera, & semel die assump-
pta epula, & uini non perfrigidi, ieiunio potio in consuetudinem ad-
ducta. Cum uero inter extenuantia posuerim uomitum, & deiectio-
nem, de his quoq; proprie quadam dicenda sunt. Eiectum esse ab
Asclepiade uomitum in eo uolumine, quod de tuenda sanitate am-
posuit, uideo. neq; reprehendo, si offensus eorum est consuetudine, qui
cotidie eijciendo uorandi facultatem moliantur. paulo etiam longius
prociessit, idem purgationes quoq; eodem uolumine expulit. & sunt
hae perniciosae, si nimis ualentibus medicamentis fiunt. sed haec tamen
subueniunda esse, non est perpetuum. quia corporum, temporumq; ra-
tio potest ea facere necessaria, dū & modo, & non nisi cum opus est,
adhibeantur. Ergo ille quoq; ipse, si quid iam corruptum esset, expelli
debere confessus est. Ita non ex toto res condemnanda est. sed esse eius
etiam plures causae possunt. siq; in ea quadam paulo subtilior obfer-
uatio adhibenda. Vomitus utilior est hyeme, quam aestate. Nam tum
& pituitae plus, & capitis grauitas maior subest. inutilis est grad-
libus, & imbecillum stomachum habentibus. utilis est plenus & bi-
liosus omulius, si uel nimium se repleuerunt: uel parum concoxerunt.
nam siue plus est, quā quod concoqui possit, periclitari ne corruptum-

que corp' implet

que extenuant

de uomit' & deiectione

patur, non oportet. Si uero corruptum est, nihil commodius est, quam id, quæ uia primum expelli potest, eijcere. Itaq; ubi amari ructus cū dolore, & grauitate præcordiorum sunt, ad hunc protinus confugendum est. Itē prodest ei, cui pectus æstuat, & frequens salina uel nauſea est: aut cui sonant aures: aut madent oculi: aut os amarum est. Similiterq; ei, qui uel cælum, uel locum mutat: huiusq; quibus, si per plures dies non uomuerunt, dolor præcordia infestat. Neq; ignoro inter hæc præcipi quietem. quæ non semper contingere potest agendi necessitatem habentibus: nec in omnibus idem facit. Itaq; istud luxuriæ causa fieri non oportere confiteor. interdum ualitudinis causa recte fieri experimentis credo. Commoneo tamen ne quis, qui ualere et se- nescere uolet, hoc cotidianum habeat. Qui uomere post cibum uolet, si ex facili facit, aquam tantum tepidam ante debet assumere. si difficilius, aquæ, uel salis, uel mellis paulum adijcere. At qui mane uomiturus est, ante bibere mulsum, uel hyssopum, aut esse radicula debet. deinde aquam tepidam, ut supra scriptum est, bibere. Cætera quæ antiqui medici præceperunt, stomachum omnia infestant. Post uomitum, si stomachus infirmus est, paulum cibi sed huius idonei, gustandum: et aquæ frigida cyathi tres bibendi sunt. Si autem uomitus fauces exasperauit, q̄ uomuit, si mane id fecit, ambulare debet: tum un- ḡ, deinde cenare. si post cenam, postero die lauare: & in balneo sudare: hinc proximus cibus, medio: rus utilior est: usq; esse debet cum pane hesterno, uino austero meraco, & carne assa, abisq; omnibus quam siccissimis. Qui uomere bis in mense nult, melius consulet, si bi duo continuarit, quam si post quintum decimum diem uomuerit: nisi hæc mora grauitatem pectori faciat. deiectio autem medicamen- to quoq; petenda est, ubi uenter suppressus parum reddit. ex eoq; in- flammationes, caligines, capitis dolores, aliaq; superioris partis ma- la increſcunt. Quid enim inter hæc adiuuare possunt quies, & ine- dia quæ per illas maxime eueniunt? Qui eijcere uolet, primum ci- bis, uinisq; utetur his, quæ hoc præstant. dehinc si parum illa pro- ficiant, aloen sumat. Sed purgationes quoq; ut interdum necessarie sunt, sic ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assueſcit. n. non ali- corpus: & ob hoc infirmum erit, cum omnibus morbis obnoxia ma- xime infirmitas sit. Caleſcit autem unctio, aqua salſa, magisq; si ca- lida est. omnia salſa, amara, carnoſa. si post cibum est balneum, ui- num austerrum. Refrigerat in ieiunio & balneum, & somnus nisi ni- mis longius est: & omnia acida, aqua q̄ frigidissima, oleum si aquæ miscatur. Humidū autem corpus effiat labor maior q̄ ex consuetudi- ne, frequens balneum, cibus plenior, multa potio, post hac ambulatio

Modestus

Anus

LIBER

Et uigilia. Per se quoque ambulatio multa, et uehemens, et matutina
 exercitatio, et non protinus abius adiectus, ea genera esse que ue-
 niunt ex locis frigidis, et pluujs, et irriguis. Contra sicut modica
 exercitatio, fames, unctio sine aqua, calor, sol modicus, frigida aqua, ci-
 bus exercitationi statim subiectus, et is ipse ex siccis, et aestuosis locis
 ueniens. Alium astringit labor, sedile, creta figularis corpori illita, ci-
 bus imminutus, et is ipse semel die assumptus ab eo, qui bis solet. exi-
 gua potio, neque adhibita nisi cum cibi quis quantum assumpturus est, ce-
 pit. post cibum quies. Contra soluit aucta ambulatio, atque est post mo-
 tus, qui post cibum est. subinde potiones cibo immixtae. Illud quoque scire
 oportet, quod uenter uomitus solum comprimit: compressum soluit.
 Itemque comprimit is uomitus, qui statim post cibum est: soluit is qui tar-
 de superuenit. Quod ad aetates uero pertinet, in mediam facillime susti-
 nent mediae aetates: minus iuuenes: minime pueri, et senectute conse-
 cti. quod minus fert facile quisque, eo saepius debet cibum assumere: ma-
 ximeque eo eget, qui in rescit. Calida lauatio et pueris, et senibus
 apta est. Vinum dilutius pueris, senibus meracius. neutri aetati quae
 inflationes mouent. Iuuenum minus quae assumant, et quomodo cu-
 rentur, interest. quibus iuuenibus fluxit aluus, plerumque in senectu-
 te coarbitur. Quibus in adolescentia fuit astricta, saepe in senectute
 soluitur. Melior est autem in iuvene fusior: in sene astrictior. Tempus
 quoque anni considerare oportet. hyeme plus esse conuenit. minus, sed
 meracius bilere. multo pane uti. carne potius elixa. modice oleribus. se-
 mel die cibum capere: nisi si nimis uenter astrictus est. Si prandet ali-
 quis, utilius est exiguum aliquid, et ipsum siccum sine carne, sine po-
 tione sumere. Eo tempore anni calidis omnibus potius utendum est,
 uel calorem mouentibus. Venus tum non aequae perniciosa est. At uere
 paulum cibo demendum, adiciendumque potioni: sed dilutius tamen bi-
 bendum est. magis carne utendum. magis oleribus. transeundum pau-
 latim ad assa ab elixis. Venus eo tempore anni tutissima est. Aestate
 uero et potione, et cibo corpus saepius eget. ideo prandere quoque con-
 modum est. Eo tempore aptissima sunt et caro, et olus. potio quamdi-
 lutissima, ut et sitim tollat: nec corpus incēdat. Frigida lauatio, caro
 assa, frigidi cibi, uel qui refrigerent. ut saepius autem cibo utendum,
 sic exiguum est. Per autumnum propter caeli uarietatem periculum ma-
 ximum est. Itaque neque sine ueste, neque sine calciamentis prodire oportet,
 praecipueque diebus frigidioribus. neque sub diuo nocte dormire: aut
 certe bene operiri. Cibo uero iam paulo pleniore uti licet. minus, sed
 meracius bibere. Poma nocere quidam putant, quae immodice toto die
 plerumque sic assumuntur, ne quid ex densiore cibo remittatur. Ita non
 haec, sed

R. 125. f. 121. a

lib. de uita p. 121. a
 Tempus.

hæc, sed consumatio omnium nocet. Ex quibus in nullo tamē minusq̃ in his noxa est. Sed his uti non sæpius quā alio cibo conuenit. Deniq; aliquid densiori cibo, cum id accedit, necessarium est demi. Neq; æstate uero, neq; autumnō utilis uenus est: tolerabilior tamen per autumnum: æstate uero & toto (si fieri potest) abstinentum.

De his, qui aliqua parte corporis laborant: et primum de his, quibus caput infirmum est. Caput. iij.

Roximū est ut de his dicā, qui partem aliquam corporis imbecillas habent, cui caput infirmum est: is si bene concoxerit, leniter perfricāre id mane manibus suis debet. nūquam id, si fieri potest, ueste uelare: aut ad cutem tonderi. Utileq; lunam uitare, maximeq; ante ipsum lunæ, solisq; concursum. sed nusquam post cibum progredi si cui capilli sunt, eos cotidie pectere: multum ambulare. sed si licet, neq; sub tecto, neq; in sole. Vbiq; autem uitare solis ardorem, maximeq; post cibum, & uinum. potius ungi, q̃ lauari. nunq̃ ad flammam ungi: interdum ad prunam. Si in balneum uenit: sub ueste primum paulum in tepidario insudare: ibi ungi: tum trāsire in calidarium: ubi sudabit, in solium non descendere: sed multa calida aqua per caput se totū perfundere: tum tepida uti, dein frigida: diutiusq; ea caput, quā cæteras partes perfundere: deinde id aliquādiu perfricāre: nouissime detergere, & ungere. Capiti nihil æque prodest atq; aqua frigida. Itaq; is, cui hoc infirmum est, per æstatem id bene largo canali cotidie debet aliquādiu subijcere. Semper autem etiam si sine balneo unctus est, neq; totum corpus refrigerare sustinet: caput tamen aqua frigida perfundere. sed cum cæteras partes attingi nolit: demittere id ne ad ceruicem aqua descendat: eamq; ne quid oculis, alijs uel partibus noceat, defluentem subinde manibus ad os regere. huic modicus cibus necessarius est, quem facile concoquat. isq; si ie iunio caput læditur, assumendus etiam medio die est. si non læditur, semel potius bibere huic assidue uinum dilutum, leue, quā aquam magis expedit: ut cum caput grauius esse cæperit, sit quod confugiat: eiq; ex toto neq; uinum, neq; aqua semper utilia sunt. medicamentum utrumq; est, cum inuicem assumitur. Scribere, legere, uoce contendere, huic opus non est utiq; post cœnam: post quam ne cogitatio quidem ei satis tuta est: maxime tamen uomitus alienus est.

Aurelij Cor.

b

Caput.

Frictio

Capiti infirmo
quid nocet?

De his q lippitudine, grauedine, desillatione, tonsillisq; laborat. Cap. V.

*Desillatio.
Tonsillo.*

Eq; uero his solis, quos capitis imbecillitas torquet, usus aquæ frigidae prodest: sed his etiā, quos assidue lippitudines, grauedines, desillationes, tonsillæq; male habent. his autem non caput tantum cotidie perfundendum est: sed os quoq; multa frigida aqua fouendum est. præcipueq; omnibus, quibus hoc utile auxilium est: eo utendum est, ubi grauius cœlum Austri reddiderunt. cumq; omnibus inutilis sit post cibum aut contentio, aut cogitatio animi: tum his præcipue, qui uel capitis, uel arteriæ dolores habere consuerunt, uel quoslibet alios oris affectus. Vitari etiā grauedines, desillationesq; possunt: si quamminime eum, qui his oportunus est, aerem, uel loca, aquasq; mutet. si caput in sole protegit, ne incendatur: ne ue subitum ex repentino nubilo frigus id moueat. Si post concoctionem ieiunus caput radit. Si post cibum neq; legit, neq; scribit.

Ad solutam aluum remedia.

Caput VI.

Vem uero frequenter citata aluus exercet, huic opus est pila, similibusq; superiores partes exercere: dum ieiunus est, ambulare: uitare solis nimium ardorem, continua balnea, ungi citra sudorem: non uti cibis uarijs, minimeq; iurulentis, aut leguminibus, oleribus ue his, quæ celeriter descendunt: omnia deniq; fugere, quæ tarde concoquantur. Venatio, duriq; pisces, & ex domesticis animalibus assa atro maxime iuuant. Nunquam uinum salsum bibere expedit: ne tenue quidem, aut dulcæ, sed austerum, & plenius, neq; id ipsum perueniet. Si mulso uti uolet, id ex decocto melle faciendum est. Si frigidae potiones uentrem eius non turbant, his utendum potissimum est. Si quid offensa in cœna sensit, uomere debet: idq; postero quoq; die facere. tertio modici ponderis panem ex uino esse, adiecta uua, uel olea, uel ex defruto, similibusq; alijs: deinde ad consuetudinem redire. Semper autem post cibum conuiescere: ac neq; intendere animum: neq; ambulatione quamuis leui dimoueri.

Remedia ad coli dolorem. Caput VII.

T si laxius intestinum dolere consuevit, quod uōλον nominant: cum id nihil nisi genus inflationis sit: id agendū est, ut concoquat aliquis, ut lectione et alijs generibus exerceatur: utatur balneo calido: cibus quoq; & potionibus calidis: deniq; omnimodo frigus euitet. item dulcia omnia, leguminaq; & quicquid inflare consuevit.

Alui p fluxum

cibus

Potus.

Colij dolor,

Quæ agenda sint stomacho laborantibus.

Caput octauum.

I quis uero stomacho laborat, legere clare debet: post
lectionem ambulare, tum pila, uel armis, alio uero quo
s genere, quo superior pars mouetur, exerceri. Non
aquam, sed uinum calidum bibere ieiunus. Tum ci-
bum bis die assumere: sic tamen ut facile concoquat.

Ut uino tenui, et austero: et post cibum frigidis potionibus potius.
Stomachum autem infirmum indicant pallor, macies, præcordiorum
dolor, nausea, et uolentium uomitus. In ieiunio dolor capitis: quæ in
quo non sunt, is firmi stomachi est. Neque credendum utique nostris est:
qui cum in aduersa ualetudine uinum, aut frigidam aquam concupie-
runt, deliciarum patrociniū in acausationem non merentis stomachi
habent. At qui tarde concoquunt, et quorum ideo præcordia inflan-
tur, quæ propter ardorem aliquem noctu sitire consueverunt, antequam
conquiescant, duos tres uel cyathos per tenuem fistulā bibant. Prodest
et aduersus tardam concoctionem clare legere: deinde ambulare: tum
uel ungere, uel lauare assidue: uinum frigidum bibere: et post cibum ma-
gnam potionem, sed, ut supra dixi, per syphonem. deinde omnes po-
tiones aqua frigida includere. Cui uero cibus accit, is ante eum bibe-
re aqua egelidam debet, et uomere. At his, cui ex hoc frequēs deiectio
incidit, quotiens aluus ei constiterit, frigida potione potissimū utatur.

Quid obseruandū sit dolore nervorum laborantibus. Caput nonum.

I cui uero dolere nervi solent, quod in podagra, chi-
ragra uel esse consuevit, huic quantū fieri potest, exer-
cendum id est quod affectum est: obijciendumque labo-
ri, et frigori, nisi cum dolor increuit. Sub diuino quies
optima est. Venus semper inimica est. Concoctio, sicuti

in omnibus corporis affectibus, necessaria est. Cruditas enim id maxime
lædit: et quotiens offensum corpus est, uiciosa pars maxime sentit. Ut
concoctio autem omnibus uitis eaurrit: sic rursus alijs frigus, alijs
calor. Quæ sequi quisque pro habitu corporis sui debet. Frigus inimicus
est seni, tenui, uulnere, præcordijs, intestinis, uescicæ, auribus, coxis, scap-
ulis, naturalibus, ossibus, dentibus, nervis, uulua, cerebro. Idē sum-
mam cutem facit pallidam, aridam, durā, nigram. ex hoc horrores,
tremoresque nascuntur. At prodest iuuenilibus, et omnibus plenis. ere-
ctiorque mens est, et melius concoquitur, ubi frigus quidem est, sed at-
tuetur. A qua uero frigida infusa præter quam capiti, etiam stomacho

Stomachi
laboris.

Seq. si uideri
et sanj.

cui cibus accit.

Dolor nervorum

cap. 3. Frigus
cui inimicus.

Int. su
Int. 3. su

Frigus cui prodest

LIBER

prodest. Item articulis, doloribusq; qui sunt sine ulceribus. item rubi-
cundis nimis hominibus, si dolore uacant. Calor aut adiuuat omnia,
quæ frigus infestat. ite lippietes: si nec dolor, nec lachrymæ sunt. Ner-
uos quoq; q contrahuntur, præcipueq; ea ulcera, quæ ex frigore sunt.
Idem corporis colorem bonum f. cit: urinā mouet. si nimius est, corpus
effoeminat: nervos emollit: stomachum soluit. Minime uero aut frigus,
aut calor tuta sunt: ubi subita insuetis sunt. Nam frigus lateris dolo-
res, aliq; uitia, frigida aqua strumas excitat. Calor cōctionem pro-
hibet: somnum auferit: sudorem digerit: obnoxium morbis pestilenti-
bus corpus effiat.

Observatio in pestilentia. caput. x.

St etiā observatio necessaria, qua quis in pestilentia
utatur adhuc integer: cum in securus esse non possit.
e Tum igitur oportet peregrinari: nauigare. Vbi id nō
licet, gestari: ambulare sub diuo ante æstum leniter: co-
demq; modo ungi: & ut supra cōprehensum est, ui-
tare fationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem: multoq; ma-
gis se continere, si qua grauitas in corpore est. Tū neq; mane surgen-
dum, neq; pedibus nudis ambulandum est. minimēq; post cibum aut
balneum. neq; ieiunio, neq; coenato uocendum est. neq; mouenda alius:
atq; etiā si per se mota est, cōprimenda est. Abstnendum potius si
plenus corpus est. Itemq; uitandum balneum, sudor, meridianus som-
nus utiq; si cibus quoq; antecessit: qui tamen semel die tunc commodius
assumitur: insuper etiā modicus, ne cruditatem moueat. Alternis die-
bus inuicem modo aqua, modo uinum bibendum est. quibus serua-
tis, ex reliqua uictus cōsuetudine quā minimum mutari debet. Cum
uero hæc in omni pestilentia facienda sint: tum in ea maxime, quam
Austri exatant. Atq; etiā peregrinantibus eadem necessaria sunt,
ubi graui tempore anni discesserunt ex suis sedibus: uel ubi in graues
regiones uenerunt. Ac si cætera res aliqua prohibebit: utiq; abstnere
debebit. Atq; ita à uino ad aquam, ab hac ad uinum eo, qui supra
positus est modo, transitus ei esse.

LIBER SECVNDVS.

*N*stantis autem aduersæ ualitudinis signa com-
plura sunt: in quibus explicandis non dubita-
bo authoritate antiquorum uirorum uti, maxi-
mèq; Hippocratis: cum recentiores quoq; medi-
ci, quamuis quædam in curationibus mutarint:
tamen hæc illum optime præfagisse fateantur.

*S*ed antequam dico quibus præcedentibus mor-
borum timor subit: non alienum uidetur exponere, quæ tempora
anni, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qualia corpora ma-
xime tuta, uel periculis opportuna sint: quod genus aduersæ ualitudi-
nis in quoq; timeri maxime possit. Non quo non omni tempore, in om-
ni tempestatum genere, omnis ætatis, omnis habitus hominum per om-
nia genera morborum & ægrotent, & moriantur: sed quod fre-
quentius, tamen quædam eueniant. Ideoq; utile est scire unūquenq;
quid, & quando maxime caueat.

Quæ anni tempora, quæ tempestatum genera, quæ partes ætatis, qua-
lia corpora uel tuta, uel morbis oportuna sunt: & quod ualitudinis
genus in quoq; timeri possit. Caput. I.

*C*itur saluberrimum uer est: proxima deinde ab
hoc hyems: periculiosior æstas. autumnus longe peri-
culosissimus. Ex tempestatibus uero optimæ æquales
sunt, siue frigida, siue calida: pessimæ, quæ uariant
maxime. quo fit ut autumnus plurimos opprimat.

*N*am ferè meridianis temporibus calor: nocturnis atq; matutinis, si-
mulq; etiam uespertinis frigus est. Corpus ergo & æstate, & subinde
meridianis caloribus relaxatum, subito frigore excipitur. Sed ut eo tē-
pore id maxime fit: sic quodocunq; euenit, noxium est. Vbi æquali-
tas aut est: tamen saluberrimi sunt sereni dies: meliores pluuji, quàm
tantum nebulosi, aut nubili: optimiq; hyeme, q̄ omni uento uacant: æsta-
te, quibus Fauonij perflant. Si genus aliud uentorū est, salubriores sep-
tentrionales, q̄ subsolani, uel austri sunt. sic tamē ut hæc interdum re-
gionum sorte mutantur. Nam ferè uentus ubiq; à mediterraneis re-
gionibus ueniens salubris, à mari grauis est. Neq; solū in bono tempesta-
tum habitu certior ualitudo est: sed priores morbi quoq; si qui inci-
derunt, leuiores sunt: & promptius finiuntur. Pessimum ergo celiū
est, q̄ ægrum fecit: adeo ut in id quoq; genus, quod natura peius est in

Aurelij Cor.

b iij

17. 3 29.

17. 3 28.

LIBER

hoc statu, salubris mutatio sit. At ætas media tutissima est: quæ neq;
 iuuentæ calore, neq; senectutis frigore infestatur. Longis morbis se=
 nectus, acutis adolescentia magis patet. Corpus autem habilissimum
 quadratum est, neq; gracile, neq; obesum. Nam longa statura ut in iu=
 uenta decora est: sic matura senectute conficitur. gracile corpus,
 infirmum, obesum, hebes est. Vere tamen maxime quæcunq; humoris
 motu nouantur, in metu esse consuerunt. ergo tum lippitudines, pustu=
 læ, profusio sanguinis, abscessus corporis, quæ ἀποσμήματα græci nomi=
 nant: bilis atra, quam μίλαν χολεῖαν appellant: insania, morbus comi=
 tialis, angina, grauedines, destillationes oriri solent. hi quoq; morbi, q;
 in articulis, nervisq; modo urgent, modo quiescunt: tum maxime et
 inchoantur, et repetunt. At æstus non quidem uacat plerisq; ab his
 morbis: sed adiicit febres, uel continuas, uel ardentes, uel tertianas, uo=
 mitus, alui deiectiones, auricularum dolores, ulcera oris, cancri, et in
 cæteris quidem partibus, sed maxime obscenis: et quicquid sudore
 hominem resoluit. uix quicquam ex his in autumnum non incidit:
 sed oriuntur eo quoq; tempore febres incertæ: lienis dolor, aqua in=
 tercutem, tabes, quam græci πθίσιον nominant: urinae difficultas, quam
 σπάρουσιον appellant: tenuioris intestini morbus, quem ἰλεον nomi=
 nant. Fit item lenitas intestinorum, quæ λενιτεῖα uocatur: coxæ dolo=
 res: morbi comitiales. Idemq; tempus, et diutinis malis fatigatos, et
 ab æstate tantum proxima pressos interimit: et alijs nouis morbis
 conficit: et quosdam longissimis implicat, maximeq; quartanis: quæ
 per hyemem quoq; exercent. Neq; aliud magis tempus pestilentia
 patet: cuiuscuq; ea generis est, quamuis uarijs rationibus nocet. Hyems
 autem capitis dolores, tussim, et quicquid in faucibus, in lateribus, in
 uisceribus mali contrahitur, irritat. Ex tempestatibus Aquilo tussim
 mouet: fauces exasperat: uentrem astringit: urinam supprimit: hor=
 rores excitat: item dolores lateris, et pectoris. Sanum tamen corpus
 spissat, et mobilius, atq; expeditius reddit. Auster aures hebetat: sen=
 sus tardat: capitis dolores mouet: aluum soluit: totum corpus efficit he=
 bes, humidum, languidum. Cæteri uenti quo uel huic, uel illi propio=
 res sunt: eo magis uicinos his, illis uel affectus faciunt. Deniq; omnis ca=
 lor, et iecur, et lienem inflammat: mentem hebetat: ut anima defi=
 ciat, ut sanguis prorumpat, efficit. Frigus, modo nervorum distentio=
 nem, modo rigorem infert. Illud σπασμὸς, hoc τένταρος græce nomi=
 natur: nigritem in ulceribus, horrorem in febribus excitat. In siatit=
 tibus acutæ febres, lippitudines, tormina, urinae difficultas, articulo=
 rum dolores oriuntur. Per imbres longæ febres, alui deiectiones,
 angina, cancri, morbi comitiales, resolutio nervorum, quam παραλύ-

Tempus

Ald

consistit . cii græci nominant . Neq; solum interest quales dies sint: sed etiam
 quales ante præcesserint . Si hyems siccæ septentrionales uentos ha-
 buit, uer autem austros, & pluuias exhibet: ferè subeunt lippitudi-
 nes, tormina, febres, maximeq; in mollioribus corporibus: ideoq;
 præcipue in mulieribus . Si uero Austri, pluuiæq; hyemem occupa-
 runt: uer autem frigidum, & siccum est: grauidæ quidem foemi-
 næ, quibus tum adest partus, abortu periclitantur . hæ uero quæ
 gignunt, imbecillos, uixq; uitaes edunt . cæteros lippitudo arida,
 & si seniores sunt, grauedines, atq; destillationes male habent . At
 si à prima hyeme Austri ad ultimum uer continuauerunt: laterum do-
 lores, & insania febricitantium, quam *peritiv* appellant, quam ce-
 lerrime rapiunt . *Ubi* primo calor à primo uere orsus, æstatem quoq;
 similem exhibet, necesse est multum sudorem in febribus subsequi . At
 si sicca æstas Aquilones habuit: autumno uero imbres, Austriq; sunt:
 tota hyeme, quæ proxima est, tussis, destillatio, raucitas, in quibus-
 dam etiam tabes oriuntur . *Sin* autem autumnus quoq; æq; siccus
 hisdem Aquilonibus perflatur: omnibus quidem mollioribus corpo-
 ribus, inter quæ muliebria esse proposui: secunda ualetudo contin-
 git . durioribus uero instare possunt & aridæ lippitudines, & fe-
 bres partim acutæ, partim longæ, & hi morbi: qui ex atra bile na-
 scuntur . Quod ad ætates uero pertinet: pueri, proximiq; his, uere op-
 time ualent: & æstate prima tutissimi sunt . Senes æstate, & autumnis
 prima parte: iuuenes hyeme: quiq; inter iuuetam, senectutemq; sunt .
 inimicior senibus hyems: æstas adolescentibus est . Tum si qua imbe-
 cillitas oritur, proximum est ut infantes, tenerosq; adhuc pueros ser-
 pentia ulcera oris, quæ *aplas* græci nominant, uomitus, nocturnæ ui-
 gliæ, aurium humor, circa umbilicum inflammationes exerceant .
 Propria etiam dentientium, ganguarumq; exulcerationes, disintio-
 nes neuorum, febricula interdum, alui deiectiones, maxillæq; caninis
 dentibus orientibus male habent . quæ pericula plenissimi cuiq; sunt:
 & cui maxime uenter astrictus est . At ubi ætas paulum prociussit:
 glandulæ, & uerbrarum, quæ in spina sunt: aliquæ inclinationes,
 strumæ, uerrucarum quædam genera dolentia, (*ἀποχρόσας* græ-
 ci appellant) & plura alia tubercula oriuntur . Incipiente uero iam
 pube ex hisdem multæ, & longæ febres: sanguinis ex naribus cur-
 sus . maximeq; omnis pueritia primum circa quadragesimum diem,
 deinde septimo mense, tum septimo anno, postea circa pubertatem
 periclitatur . Si qua etiam genera morborum in infantem incide-
 runt: ac neq; pubertate, neque primis coitibus, neq; in foemina pri-

f. 3/211.

212

213

214

24

25.

26.

27

LIBER

mis menstruis finita sunt: ferè longa sunt. Sæpius tamen morbi pueriles, q̄ diutius manserunt: terminantur. Adolescentia morbis acutis, itē comitialibus, tabiq; maxime obiecta est: ferèq; iuuenes sunt, qui sanguinem expuunt. Post hanc ætatem laterum, & pulmonis dolores, lethargus, cholera, insania, sanguinis per quædam etiam uelut ora uenarum (αἱμορροΐδας græci appellant) profusio. In senectute spiritus, & urinae difficultas: grauedo articularum, & renum dolores: neruorum resolutiones: malus corporis habitus (καχεξία græci appellant): nocturnæ uigiliæ: uitia longiora aurium, oculorum, etiam narium, præcipueq; soluta aluius: et quæ sequuntur hæc tormina: uel leuitas intestinorum, cæteraq; fusi uetris mala. Præter hæc graciles: tabes, deiectiones, defillationes, item uiscerū, & laterum dolores fatigant. Obesi plerunq; acutis morbis, & difficultate spirandi strangulantur: subitoq; sæpe moriuntur. quod in corpore tenuiore uix euenit.

De notis aduersæ ualetudinis futuræ. Caput. II.

Nte aduersam autem ualetudinē, ut supra dixi, quædam notæ oriuntur, quarū omnium commune est, aliter se corpus habere, atq; consuevit: neq; in peius tantum, sed etiam in melius. Ergo si plenior aliquis, & speciosior, & coloratior factus est, suspecta habere bona sua debet. quæ quia neq; in eodem habitu subsistere, neq; ultra progredi possunt: ferè retro quasi ruina quadam reuoluntur. Peius tamen signum est ubi aliquis contra consuetudinem emacruit, & colorem, decoremq; amisit. quoniam in his quæ superant, est quod morbus demat: in his quæ desunt, non est quod ipsum morbum ferat. Præter hæc protinus timeri debet, si grauiora membra sunt: si crebra ulcera oriuntur: si corpus supra consuetudinem incaluit: si grauior somnus pressit: si tumultuosa somnia fuerunt: si sæpius expergitur aliquis q̄ assuevit: deinde iterū soporatur. si corpus dormientis circa partes aliquas contra consuetudinē insudat: maximèq; circa pectus, aut ceruices, aut crura, uel genua, uel coxas. Itē si marcet animus: si loqui, & moueri piget. si corpus torpet: si dolor præcordiorū est, aut totius pectoris: aut qui in plurimis euenit capitis: si salinae plenum est os: si oculi cum dolore uertuntur: si tēpora astricta sunt: si membra inhorrescunt: si spiritus grauior est: si circa frontem intentæ uenæ mouentur: si frequentes oscitationes: si genua quasi fatigata sunt: totum uel corpus lassitudinē sentit. Ex quibus sæpe plura, nunq̄ non aliqua fe-

brem antecedunt. In primis tamen illud considerandū est, nunquid
sepius horum aliquid eueniat: ac ideo neq; corporis ulla difficultas
subsequatur. Sunt enim quædam proprietates hominum, sine quarū
notitia non facile quicquam in futurum præagiri potest: Facile itaq;
securus est in his aliquis, quæ sæpe sine piculo euasit. Ille solitari de
bet, cui hæc noua sunt: aut q̄ ista nunq̄ sine custodia sui, tutā habuit.

Proprietas hominis.

Quæ bona in ægrotantibus signa sint. Caput III.

Bi uero febris aliquem occupat: scire licet non peri-
clitari, si in latus, aut dextrum, aut sinistrum, ut ipse
uifum est, cubat: cruribus paulū reductis: qui ferè sani
quoq; iacentis habitus est: si faciale conuertitur: si noctu
dormit: si interdū uigilat: si ex facili spirat: si nō cō-
flictatur: si circa umbilicum, & pubem cutis plana est: si præcordia
eius sine ullo sensu doloris æqualiter mollia in utraq; pte sunt. quod
si paulo tumidiora sunt: sed tamen digitis cedunt, & nō dolent: hæc
ualetudo, ut spaciū aliquod habebit: sic tutā erit. Corpus quoq; quod
æqualiter molle, & calidum est: quodq; æqualiter totum insudat: &
cuius febriçula eo sudore finitur: securitatem pollicetur: quando iam
ad sanitatem uenit corpus. Sternutamentum etiā inter bona indicia est.
Et cupiditas cibi uel à primo seruata, uel etiam post fastidium orta.
neq; terrere debet ea febris, quæ eodem die finita est: ac ne ea quidē,
quæ quamuis longiore tempore euasit: tamen ante alterā accessio-
nem ex toto quieuit sic, ut & corpus integrum, quod aīu pīuēs græci
uocant, fieret. si quis autē incidit uomitus, mixtus esse et bile, & pitui-
ta debet: & in urina subsidere album: leue, æquale sic, ut etiam si
quæ quasi nubeculæ innatarint: in imum deferantur. At uenter ei qui
à periculo tutus est, reddit modo mollia figuratæ eodē ferè tempore,
quo secunda ualetudine assuevit: modo conuenientia his quæ assumun-
tur. peior citā alius est. Sed ne hæc quidem terrere protinus debet: si
matutinis temporibus coacta magis est: aut si procedente tempore pau-
latim contrahitur, & ruffa est: neq; foeditate odoris similem alium
sanī hominis excedit. Ac lumbricos quoq; aliquos sub fine morbi de-
scendisse nihil nocet. si inflammatio in superioribus partibus dolorē,
tumoremq; fecit, bonum signum est. sonus uentris inde ad inferio-
res partes euolutus, magisq; etiam si sine difficultate cum stercore
excessit.

Contra grauis morbi periculum est: ubi supinus æger
 iacet porrectis manibus, & cruribus. ubi residere
 uult in ipso acuti morbi impetu, præcipueq; pulmo-
 nibus laborantibus. ubi nocturna uigilia premitur:
 etiam si interdiu somnus accedit. Ex quo tamen peior
 est, qui inter quartam horam, & noctem: q̃ qui matutino tempore ad
 quartam. Pessimum tamen est si somnus neq; noctu, neq; interdiu ace-
 dit. id enim ferè sine continuo dolore esse non potest. Aeq; uero signũ
 malum est etiam somno ultra debitum urgeri: peiusq; quo magis se
 sopor interdiu, noctuq; continuat. Mali etiam morbi testimonium est
 uehementer, & crebro spirare: à sexto die cœpisse inhorrescere: plus
 expuere: uix excreare: dolorẽ habere continuũ: difficulter ferre mor-
 bum: iactare brachia, & crura: sine uoluntate lachrymare: habere
 humorem glutinosum dentibus inhaerentem: cutẽ circa umbilicum, et
 pubem macram: præcordia inflammata, dolentia, dura, tumida, inten-
 ta: magisq; si hæc dextra parte, q̃ sinistra sunt: periculosissimum ta-
 men est: si uenæ quoq; ibi uehementer agitantur. Mali et morbi signũ
 est, nimis celeriter emacrescere: caput, et pedes, manusq; calidas habe-
 re: uentre, & lateribus frigentibus, aut frigidæ extremas partes acu-
 to morbo urgente: aut post sudorem inhorrescere: aut post uomitũ sin-
 gultum esse: uel rubere oculos: aut post cupiditatẽ cibi, post uel longas fe-
 bres hũc fastidire: aut multũ sudare, maximeq; frigido sudore: aut ha-
 bere sudores non per totum corpus æquales, quiq; febrem non fini-
 ant: & eas febres, quæ cotidie tempore eodẽ reuertantur: quæ uel sem-
 per pares accessiones habeant: neq; tertio quoq; die leuentur, quæ uel
 continuent, ut per accessiones increstant: per discessiones tantum mol-
 liantur: nec unquam integrum corpus dimittant. Pessimum est si ne le-
 uatur quidem febris: sed æque concitata continuat. Periculosum est
 etiam post arquatũ morbũ febrem oriri, utiq; si præcordia dextra
 parte dura manserunt: ac dolentibus his leua. Nulla acuta febris leui-
 ter terrere nos debet: neq; unquam in acuta febre, aut à somno non
 est terribilis neruorum distentio. timere et ex somno, mali morbi est.
 Itemq; in prima febre protinus mentem esse turbatam: membrum uel
 aliquod esse resolutum. ex quo casu quamuis uita redditur: tamen id
 ferè membrum debilitatur. Vomitus etiam periculosus est sinceræ pi-
 tuitæ uel bilis: peiorq; si uiridis, aut niger est. At mala urina est, in
 qua subsidunt uel rubra, aut liuida, deterior, in qua quasi fila quedã
 tenuia, atq; alba. pessima ex his, si tanq̃ ex furfuribus factas nubeculæ

las representat. diluta quoq; atq; alba vitiosa ē: sed in phreniticis maxime. Alius aut mala est ex toto suppressa. Periculosa etiā quæ inter febres fluens, conuiescere hominem in cubili non patitur: utiq; si quod descendit est perliquidum, aut albidum, aut pallidum, aut spumans. Præter hæc periculum ostendit id quod excernitur, si est exiguum, glutinosum, leue, album, idemq; subpallidum: uel si est aut liuidum, aut biliosum, aut cruentum, aut peioris odoris, quàm ex consuetudine. Malum est etiā, quod post longas febres sincerum est.

De signis longæ ualitudinis. Caput. V.

Ost hæc inditia notum est longum morbum fieri. sic enim
 p neesse est: nisi occidit. Neq; ulla alia spes in malis magnis
 est: q̄ ut impetum morbi trahendo, aliquis effugiat: por-
 rigaturq; in id tempus, quod curationi locum præstet.
 protinus tñ signa quedam sunt: ex quibus colligere possumus morbum
 & si non interemerit: longus tñ tempus habiturum. Vbi frigidus su-
 dor inter febres non auras circa caput tantum, & ceruices oritur:
 aut ubi febre non quiescente corpus insudat: aut ubi corpus modo fri-
 gidum, modo calidum est, & color alius ex alio fit: aut ubi quod in-
 ter febres aliqua parte abscessit, ad sanitatē nō peruenit: aut ubi æger
 pro spacio parum emacrescat. Itē si urina modo liquida, et pura est:
 modo habet quedā subsidia: si leuia, atq; alba, rubraue sunt, quæ
 in ea subsidunt: aut si quasidā quasi maculas representat: aut si bullu-
 las excitat.

De indicijs mortis. Caput. VI.

Ed inter hæc quidem proposito metu spes tamen su-
 pereft. Ad ultima uero iam uentum esse, testantur na-
 s res acute, collapsa tempora, oculi conuulsi, frigida, lan-
 guideq; aures, & in his partibus leniter uersæ: cutis
 circa frontem dura, et intentæ: color aut niger, aut per-
 pallidus: multoq; magis si ita hæc sunt: ut neq; uigilia præesserit,
 neq; uentris reolutio, neq; inedia. Ex quibus causis interdum hæc spe-
 cies oritur: sed uno die finitur. Itaq; diutius durans, mortis index est.
 Si uero in morbo uetere iam triduo talis est: in propinquo mors est:
 magisq; si præter hæc oculi quoq; lumen refugiunt et illachrymant:
 quæq; in his alba esse debent, rubescunt: atq; in hisdem uenulæ pallēt:
 pituitaq; in his innatas nouissime angulis inhaerescit: alterq; ex his
 maior est: hiq; aut uehementer subsederunt: aut facti tumidiore sunt:

LIBER

perq; somnum palpebræ non cōmittuntur: sed inter has ex albo oculorum aliquid apparet: neq; id fluens alius expressit: eademq; palpebræ pallent: & idem pallor labra, et nares decolorat. eademq; labra, & nares, oculiq; et palpebræ, et supercilia, aliqua'ne ex his peruertuntur: isq; propter imbecillitatem iam non audit: aut non uidet eadem: mors denuntiatur. Vbi ægri supini cubant: hisq; genua contra cta sunt: ubi deorsum ad pedes subinde delabitur: ubi brachia, & crura nudat, & inæquabiliter dispergit: neq; his calor subest: ubi hiat: ubi assidue dormit: ubi his qui mentis suæ non est: neq; id facere sanus solet: dentibus stridet: ubi ulcus quod aut ante, aut in ipso morbo natum est: aridum, & aut pallidum, aut liuidum factum est. Illa quoq; mortis indicia sunt: unguis, digitiq; pallidi: frigidus spiritus: aut si manibus quis in febre, & acuto morbo uel insania, pulmonis'ue dolore, uel capitis, in ueste floccos legit: fimbrias'ue diducit: uel in adiuncto pariete si qua minuta eminent: carpit. Dolores etiam circa coxas, et inferiores partes orti, si ad uiscera transierunt: subitoq; desierunt: mortē subesse testantur: magisq; si alia quoq; signa accesserunt. Neq; is seruari potest, qui sine ullo timore febricitans, subito stragulatur: aut denotare saluam suam non potest. Cui'ue in eodem febris, corporisq; habitu ceruix conuertitur: sic ut denotare æque nihil possit: aut cui simul & continua febris, & ultima corporis infirmitas est: aut cui febre non quiescente exterior pars friget: interior sic calet: ut etiam sitim faciat: aut qui febre æque non quiescente: simul & delirio, & spirandi difficultate uexatur: aut qui epoto ueratro exceptus distentione neruorum est: aut qui ebrius obmutuit: is enim febre, adiecta neruorum distentione consumitur: nisi aut febris accessit, aut eo tempore, quo ebrietas solui debet, loqui cepit. Mulier quoq; grauida acuto morbo facile cōsumitur: & is, cui somnus dolorem auget: & cui protinus in recenti morbo bilis atra, uel infra, uel supra se ostendit: cui'ue alterutrum modo se prompsit: cum iam longo morbo corpus eius esset extenuatum, et affectum. sputum ēt bilicūm, & purulentum, siue separatim ista, siue mixta proueniunt: interitus periculū ostendunt. Ac si circa septimum diē tale esse cōpit: proximū est ut is circa quartumdecimum diem deccdat: nisi alia signa meliora, peiora'ue accesserint. quæ quo leniora, grauiora'ue subsēcuta sunt: eo uel feriozem mortem, uel maturiozem denunciant. Sudor quoq; frigidus in acuta febre pestiferus est. atq; in omni morbo uomitus: qui uariis, & multorum colorum est: præcipueq; si malus in hoc odor est. Ac sanguinē quoq; in febre uomuisse pestiferum est. Urina uero rubra, & tenuis in magna cruditate esse cōsuevit: & sæpe antequam spacio

matureſcat, hominem rapit. Itaq; ſi talis diutius permanet, periculū
mortis oſtendit. Peſſima tamen eſt, præcipueq; mortifera, nigra, craſſa,
mali odoris: atq; in uiris quidem, & mulieribus talis deterrima eſt.
In pueris uero, quæ tenuis, & diluta eſt. Alius quoq; uaria peſtiferæ
eſt: quæ ſtrigmentū, ſanguinem, bilem uiridem, aliquid modo diuerſis
temporibus, modo ſimul: & in mixtura quadam diſcreta tamen re=
preſentat. Sed hæc quidem poteſt paulo diutius trahere. In præcipiti
uero iam eſſe denunciat quæ liquida: eademq; uel nigra, uel pallida,
uel pinguis eſt: utiq; ſi magna fæditas odoris acceſſit. Illud interroga=
ri me poſſe ab aliquo ſcio, ſi certa futura mortis indicia ſunt: quomo=
do interdum deſerti à medicis conualeſcant: quosdamq; fama prodi=
derit in ipſis funeribus reuixiſſe. Quinetiam uir iure magni nomi=
nis Democritus, ne finita quidē uitæ ſatis certas notas eſſe propoſuit,
quibus medici credidiſſent: adeo illud non reliquit, ut certa aliqua ſi=
gna futura mortis eſſent: aduerſus quos, ne dicam illud quidem, quod
in uicino ſæpe quædam notæ poſitæ non bonos, ſed imperitos medi=
cos decipiunt: quod Aſclepiades funeri obuius intellexit eum uiuere,
qui efferebatur: ne protinus crimen artis eſſet, ſi quod profeſſoris ſui:
illa tamen moderatius ſubiiciam. Coniecturalē artem eſſe medicinam,
rationemq; coniecturæ talem eſſe: ut cum ſæpius aliquando reſponde=
rit, interdum tñ fallat nos. Si quid itaq; uix in milleſimo corpore ali=
quādo decipit: id notā nō habet, cum per innumerabiles homines re=
ſpondeat. Idq; non in his tantum, quæ peſtiferæ ſunt, dico: ſed in his
quoq; quæ ſalutaria. Si quidem etiam ſpes interdum fruſtratur: &
moritur aliquis, de quo medicus ſecurus primo fuit. Quæq; medendi
cauſa reperta ſunt, non nunquam in peius aliquid conuertunt. Neq;
id evitare humana imbecillitas in tanta uarietate corporum poteſt.
Sed eſt tamen medicinæ fides, quæ multo ſæpius, perq; multo plures
ægros prodeſt. Neq; tamen ignorare oportet in acutis morbis fallaces
magis notas eſſe & ſalutis, & mortis.

De notis, quas aliquis in ſingulis morborum generibus habere poſſit.
Caput ſextum.

¶ Ed cum propoſuerim ſigna quæ in omniā aduerſa ua=
litudine cōia eſſe conſuerunt: ea quoq; trāſibo, ut quas
aliquis in ſingulis morborū generibus habere poſſit
notas, indicē. Quædā aut ſunt, quæ añ febres, quæ=
dam, quæ inter eas quid aut intus ſit, aut uenturum
ſit, oſtendunt. Ante febres, ſi caput graue eſt: aut ex ſomno oculi cali=

LIBER

gant: aut frequētia sternutamenta sunt: circa caput aliquis pituita im-
petus timeri potest. Si sanguis, aut calor abundat: proximum est, ut ali-
qua parte profusum sanguinis fiat. Si sine causa quis emacrescit:
ne in malum habitum corpus eius recidat, metus est. Si præcordia do-
lent: aut inflammatiō grauis est: aut non toto die concocta fertur urina:
cruditas esse manifestum est. Quibus diu color sine morbo regio ma-
lus est: hi uel capitis doloribus cōsistantur: uel terrā edunt. Qui diu
habent faciem pallidam, & tumidam: aut capite, aut uisceribus, aut
alio laborant. Si in cōtinua febre puero ueter nihil reddit, mutaturq;
ei color: nec somnus accedit: ploratq; is assidue: metuenda nervorū di-
stentio est. Frequens aut desillatio in corpore tenui, longq; tabem ti-
mendam esse testatur. Vbi pluribus diebus non descendit aluus, docet
aut subitam deiectionē, aut febriculam instare. Vbi pedes turgent, lon-
gæ deiectiones sunt. Vbi dolor in imo uentre et icoxis est, aqua inter-
cutis instat. sed hoc morbi genus ab ilibus oriri solet. Idem propositū
periculum est his, quibus uoluntas desidendi est: uenter nihil reddit,
nisi & ægre, & durū: tumor in pedibus est. idemq; modo dextra,
modo sinistra parte uentris inuicē oritur, atq; finitur. sed à iecinore
id malum proficisci uidetur. eiusdem morbi nota est. Vbi circa um-
bilicum intestina torquentur (σπόρον græci nominant) coxæq; dolores
manent: eaq; neq; tempore, neq; remedijs soluantur. Dolor aut arti-
culorum, pro ut in pedibus, manibus'ue, aut alia qualibet parte sic
est, ut eo loco nerui contrahantur: aut si id membrum ex leui causa
fatigatum, æq; frigido, calidoq; offenditur: podagrā, chiram'ue, uel
eius articuli, in quo id sentitur, morbū futurum esse denuntiat. Qui-
bus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desit: hi uel ca-
pitis doloribus cōsistentur necesse est: uel in articulis aliquas exulce-
rationes graues habeant: uel aliquo morbo etiam debilitentur. Qui-
bus fœminis menstrua non proueniunt, necesse est capitis acerbissimi
dolores sint: uel quelibet alia pars morbo infestetur. Eademq; his
pericula sunt, quibus articularum uicia dolores, tumoresq; sine pod-
gra, similibusq; morbis oriūtur, & desinunt. Vtiq; si sæpe tempora
hisdem dolent: noctuq; corpora insudant: si frons prurit, lippitudi-
nis motus est. Si mulier à partu uehementes dolores habet: neq; alia
præter ea signa mala sunt: circa uigesimum diem aut sanguis per na-
res erumpet, aut in inferioribus partibus aliquid abscedet. Quicūq;
etiam dolorem ingentem circa tempora, & frontem habebit: is alte-
rutra ratione eum finiet, magisq; si iuuenis erit, per sanguinis pro-
fusionem: si senior, per suppurationem. Febris aut quæ subito sine ra-
tione sine bonis signis finita est, ferè reuertitur. Cui fauces sanguine, et

interdum, & noctu replentur sic, ut neq; capitis dolores, neq; præcordiorum, neq; tussis, neq; uomitus, neq; febricula præcesserit: huius aut in naribus, aut in faucibus ulcus reperietur. Si mulieri ex inguine febricula orta est: neq; causa apparet, ulcus in uulua est. Vrina autem crassa, ex qua quod desidet, album est: significat circa articulos, aut circa uiscera dolorem, metumq; morbi esse. Eadem uiridis, aut uiscerum dolorem, tumoremq; cum aliquo periculo subesse: aut certe corpus integrum non esse testatur. At si sanguis, aut pus in urina est: uel uesica, uel renes exulcerati sunt. Si hæc crassa arumculas quasdam exiguis quasi capillos habet: aut si bullat, aut si male olet: & interdum quasi harenam, interdum quasi sanguinem trahit: dolent autem coxæ: quæq; inter has, superq; pubem sunt: & accedunt frequentes ructus: interdum uomitus biliosus, extremæq; partes frigesunt: urina crebra cupiditas, sed magna difficultas est: & quod inde excreta tum est, aque simile uel rufum, uel pallidum est: paulum tamen in eo leuamenti est: alius uero cum multo spiritu redditur: utiq; in renibus uitium est. Aut si paulatim desillat: uel si sanguis per hanc editur, & in eo quedam cruenta concreta sunt, idq; ipsum cum difficultate redditur, & circa pubem inferiores partes dolent, in eadem uesica uitium est. Calculosi uero his indicij cognoscuntur. Difficiliter urina redditur: paulatimq; interdum etiam sine uoluntate desillat. Eadem harena est: nonnunq; aut sanguis, aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea excreta. Eamq; quidam promptius recti, quidam resupinati: maximeq; hi qui grandes calculos habent: quidam etiam inclinati reddunt: colemq; extendendo, dolorem leuant. Grauitatis quoq; cuiusdam in ea parte sensus est: atq; ea cursu, omniq; motu augentur. Quidam etiam cum torquentur, pedes inter se subinde mutatis uicibus implicant. Fœminæ uero oras naturalium suorum manibus admotis scalpere crebro coguntur. Nonnunquam si digitum admouerunt, ubi uesicae cernicem is urget, calculum sentiunt. At qui spumantem sanguinem excreant, his in pulmone uicium est. Mulieri grauidæ sine modo fusa aluius elidere partu potest. Eidem si lac ex mæmbris profluit, imbecillum est, quod intus gerit. duræ mæmæ sanum illud esse testantur. Frequens singultus, & præter consuetudinem continuus iecur inflammatum esse significat. Si tumores super ulcera subito esse desierunt, idq; à tergo incidit: uel distentio neruorum, uel rigor timeri potest. At si à priore parte id euenit: uel lateris acutus dolor, uel insana expectanda est. Interdum etiam huiusmodi casum, quæ tutissima inter hæc est, profusio alui sequitur. Si ora uenarii sanguinem solita fundere, subito suppressa sunt: aut aqua

LIBER

inter ceteris aut tabes sequitur: eadem tabes subit, si in lateris dolore orta suppuratio, intra quadraginta dies purgari non potuit. At si longa tristitia cum longo timore, et uigilia est: atra bilis morbus subest. Quibus saepe ex naribus fluit sanguis, his aut lienis tumet: aut capitis dolores sunt: quos sequitur, ut quaedam ante oculos tanquam imagines obuersentur. At quibus magni lienes sunt, his gingivae male sunt: et os olet: aut sanguis aliqua parte prorumpit. quorum si nihil evenit, necesse est in cruribus mala ulcera, et ex his nigra cicatrices fiant. Quibus causa doloris neque sensus eius est, his mens labat. Si in uentre sanguis confluxit: ibi in pus uertitur. Si a coxis, et ab inferioribus partibus dolor in pectus transit: neque ullum signum malum accessit: supurationis eo loco periculum est. Quibus sine febre aliqua ex parte dolor, aut prurigo cum rubore, aut calore est: ibi aliquid suppurat. Vrina quoque quae in homine sano parum liquida est, circa aures futuram aliquam suppurationem esse denunciat. Haec uero cum sine febre quoque, uel latentium, uel futurarum rerum notis habeant, multo certiora sunt, ubi febris accessit: atque etiam aliorum morborum tum signa nascuntur. Ergo protinus insania timenda est: ubi expeditior alicuius, quam sanum fuit sermo est: subitaque loquacitas orta est: et haec ipsa solito audacior. aut ubi raro quis, et uehementer spirat: uenasque concitatas habet, praecordii duris, et tumentibus. Oculorum quoque frequens motus, et in capitis dolore offusae oculis tenebrae: uel nullo dolore substante somnus ereptus, continuataque nocte, et die uigilia: uel prostratum contra consuetudinem corpus in uentrem sic, ut ipsius alui dolor id non coegerit. Item robusto adhuc corpore insolitus dentium stridor, insaniae signa sunt. Siquid etiam abscessit: et antequam suppuraret, manente adhuc corpore insolita febre subsedit, periculum affert primum furoris, deinde interitus: auris quoque dolor acutus cum febre continua, uehementique saepe mentem turbat: et ex eo casu iuniores interdum intra septimum diem moriuntur: seniores tardius. quoniam neque aequae magnas febres expeririuntur: neque aequae insaniunt. ita sustinent, dum his affectus intus uersatur. Suffuse quoque sanguine mulieris mammae, furorem uenturum esse testantur. Quibus autem longae febres sunt: his aut abscessus aliqui, aut articulorum dolores erunt. Quorum faucibus in febre eliditur spiritus, instat his nervorum distentio. Si angina subito finita est, in pulmonem id malum transit: idque saepe intra septimum diem occidit: quod nisi incadat, sequitur, ut aliqua parte suppuret. Deinde post alui longam resolutionem, tormina. Post haec intestinorum leuitas oritur. Post nimias destillationes, tabes. post lateris dolores, uitia pulmonum. post haec, insania. Post magnos feruores corporis, nervorum rigor, aut distentio. Vbi

distentio. ubi caput vulneratum est, delirium. ubi uigilia torfit, neruorum distentio. ubi uehementer uenæ super ulcera mouentur: sanguinis profluvium erit. suppuratio uero pluribus morbis excitatur. Nā si longæ febres sine dolore, sine manifesta causa remanent: in aliquā partem id malum incumbit, in iunioribus tamen: nam in senioribus ex eiusmodi morbo quartana ferè nascitur. Eadem suppuratio fit, si præcordia dura dolentia ante uigesimum diem hominē non sustulerunt: neq; sanguis ex naribus fluxit, maximeq; in adolescentibus. utiq; si inter principia aut oculorū caligo, aut capitis dolores fuerunt: sed cum inferioribus partibus aliquid abscessit. aut si præcordia tumorem mollem habent: neq; habere intra sexaginta dies desinunt: hæretq; per omne id tempus febris. Sed tum in superioribus partibus fit abscessus: ac si inter ipsa ulcera nō fuit: circa aures erumpit. Cumq; omnis longus tumor ad suppurationem ferè spectet: magis se tendit is, qui in præcordiis, q̄ is qui est in uentre: & is qui supra umbilicū, q̄ is qui infra est. si lassitudinis etiam sensus in febre est: uel in maxillis, uel in articulis aliquid abscedit. Interdum quoq; urina tenuis, et cruda sic diu fertur: ut alia salutaria signa sint. Ex quo eo casu plerunq; infra transuersum septum, quod διαφραγμα græci uocant, fit abscessus. Dolor autem pulmonis si neq; per sputa, neq; per cucurbitulas, neq; per sanguinis detractionem, neq; per uictus rationem finitus est, uomica aliquas intus excitat aut circa uigesimum diem, aut circa xxx: nonnunq; etiam circa sexagesimum. numerabimus autem ab eo die, quo primū febricitauit aliquis, aut inhorruit, aut grauitatem eius partis sensit. sed hæ uomicæ modo à pulmone, modo à contraria parte nascuntur. Quod suppurat ab ea parte, quam afficit: dolorem, inflammationemq; concitat, ipsum calidius est: et si in partem sanam aliquis decubuit: onerare eam ex pondere aliquo uidetur. Omnis etiā suppuratio quæ nondum oculis patet, sic deprehendi potest. si febris nō dimittit: eaq; interdum lenior est: noctu increscit: multus sudor oritur: cupiditas tussēdi est: et penè nihil in tussi excreatur: oculi cæui sunt: malæ rubent: uenæ sub lingua inalbescunt: in manibus fiunt adunci ungues, digiti, maximeq; summi pallēt: in pedibus tumores sunt: spiritus difficiliter trahitur: abi fastidium est: pustulæ toto corpore oriuntur. Quod si protinus initio dolor & tussis fuit, & spiritus difficiliter: uomica uel ante, uel circa uigesimum diem erumpet. si serius ista coeperint: necesse est quidem increscant. sed quo minus cito affecterint: eo tardius soluentur. Solent etiam in graui morbo pedes cum digitis, unguibusq; nigrescere. quod si non est mors consecuta, & reliquum corpus inualuit: pedes tamen decidunt.

Aurelij Cor.

c

Suppuratio hinc

Quæ notæ in quoq; morbi genere, uel spem, uel pericula ostendant.
Caput. VII.

Equitur ut in quoq; morbi genere proprias notæ expli-
cem: quæ uel spem, uel periculum ostendant. Ex uescia do-
lente si purulenta urina processit: inq; ea leue, & album
subsedu: metu detrahitis. In pulmonis morbo si sputo ipse
leuatur dolor: quantum id purulentum est: tamen æger facile spirat: fa-
cile excreat: morbum ipsum non difficulter fert: potest ei secunda ua-
letudo contingere. Neq; inter initia terreri conuenit: si protinus sputum
mixtum est ruffo quodam, & sanguine, dummodo statim edatur. La-
terum dolores suppuratione facta, deinde intra quadragesimum diē
purgata finiuntur. Si in iecinore uomica est, & ex ea fertur pus pu-
rum, & album: salus ei facilis. Id enim malum in tunica est. Ex sup-
purationibus uero hæc tolerabiles sunt: quæ in exteriorem partem fe-
runtur, et acuiuntur. Et ex his quæ intus procedunt, hæc leuior: quæ
contra se cutem non afficiunt: eamq; & sine dolore esse, & eiusdem
coloris, cuius reliquæ partes sunt, sinunt esse. Pus quoq; quacumq; par-
te erumpit: si est leue, album, & unius coloris, sine ullo metu est: &
quo effuso febris protinus conquieuit: desieruntq; urgere cibi fastidium,
& potationis desiderium. si quando etiam suppuratio descendu in cru-
ra: sputumq; eiusdem factum pro ruffo purulentum est: periculi mi-
nus est. At in tabe eius, qui saluus futurus est: putum esse debet albū,
æquale totum: eiusdemq; coloris sine pituita: eiq; etiā simile esse opor-
tet si quid in nares à capite destillat. Longe optimum est febrem omni-
no non esse. secundum est tantulum esse: ut neq; cibum impediat, neq;
crebram sitim faciat. Alius in hac ualetudine ea tuta est: quæ cotidie
coacta: eaq; conuenientia his quæ assumuntur, reddit. Corpus, id quod
minime tenue, maximeq; lati pectoris, atq; setosi est: cuiusq; cartilago
exigua, & carnosæ est. Super tabem si mulieri quoq; suppressa men-
strua fuerunt: et circa pectus, atq; scapulas dolor mansit: subitoq; san-
guis erupit: leuari morbus solet. Nā & tussis minuitur: et sitis atq; fe-
bricula desinūt. sed ipsæ ferè nisi redit sanguis, uomica erumpit: quæ
quo cruentior, eo melior est. A qua autem inter cutem minime terribi-
lis est: quæ nullo antecedente morbo cœpit. deinde quæ longo morbo
superuenit. Vtiq; si firma uiscera sunt: si spiritus facilis: si nullus do-
lor: si sine calore corpus est: æqualiterq; in extremis partibus macra
est: si uenter mollis: si nulla tussis: nulla sitis: si lingua ne per som-
num quidem inarescit: si cibi cupiditas est: si uenter medicamentis mo-
uetur: si per se excernit mollia, & figurata: si extenuatur: si urina &

Vescia

pulmonis

pleuritis

hepatitis

Suppuratio in

pus

tabes

Hydrops

uini mutatione, & epotis aliquibus medicamentis mutatur: si corpus sine lassitudine est, & morbum facile sustinet. si quidem in quo omnia hæc sunt: is ex toto tutus est: in quo plura ex his sunt, is in bona spe est. Articulorum uero uitia ut podagræ, chiragræq; si iuuenes tentantur: neq; callum induxerunt: solui possunt: maximeq; torminibus leniuntur: & ex quocunq; modo uenit fluit. Item morbus comitialis ante pubertatem ortus non ægre finitur: & in quo ab una parte corporis uenientis accessionis sensus incipit. optimum est à manibus, pedibusue initium fieri: deinde à lateribus: pessimum inter hæc à capite. Atq; in his quoq; ea maxime prosunt: quæ per deiectiones exænuantur. Ipsa autem deiectio sine ulla noxa est: quæ sine febre est: si celeriter desinit: si contracto uentre nullus motus eius sentitur: si extremam aluum spiritus sequitur. Acrida tormina quidem periculosa non sunt: si sanguis, & strigmenta descendunt: dum febris, cæteræq; accessiones huius morbi absint: adeo ut etiam grauida mulier non solum referuari possit: sed etiam partum referuare. Prodestq; in hoc morbo si iam ætate aliquis processit. Contra intestinorum leuitas facilius à teneris ætatibus depellitur: utiq; si fieri urina, et alio corpus incipit. Eadem ætas prodest, & in coxæ dolore, & humerorum, et in omni resolutione nervorum. ex quibus coxa si sine torpore est: si leuiter friget: quantum magnos dolores habet: tamen & facile, & mature sanatur: resolutumq; membrum si nihilominus aliter fieri sanum potest: oris resolutio, etiam aluo cito finitur: omnisq; deiectio lippienti prodest. At uarix ortus, uel per ora uenarum subita profusio sanguinis, uel tormina insaniam tollunt. Humerorum dolores, qui ad scapulas uel manus tendunt: uomitu atræ bilis soluntur. et quisquis dolor deorsum tendit: sanabilior est. Singultus sternutamento finitur. Longas deiectiones supprimit uomitus. Mulier sanguine uomens, profusis mēstruis liberatur. Quæ menstruis nō purgatur, si sanguine, ex naribus fudit: omni periculo uacat. Quæ locis laborat: aut difficulter partum edit: sternutamento leuatur. Aëstua quartana fere breuis est. cui calor, & tremor est: saluti delirium est. Lienosis bona tormina sunt. deniq; ipsa febris, quod maxime mirum uideri potest: sæpe præsidio est. nam & præcordiorum dolores si sine inflammatione sunt, finit: & in iecinoris dolore succurrit: & nervorum distentionem, rigoremq; si postea capit: ex toto tollit: & ex difficultate urinae morbum tenuioris intestini ortum, si urina per calorem mouet: leuat. At dolores capitis quibus oculorum caligo, et rubor cum quadam frontis prurigne accedunt: sanguinis profusione, uel fortuita, uel et petita summoventur. Si capitis, ac frontis dolores ex uento, uel frigore, aut aestu sunt: grauedine, et sternutamentis finiuntur.

c ij

arthralis

Epilepsia

Dumbus

Lippus

Lippus

Arterialis q.

Varius

Cephalalgia

Febrem autem ardentem, quam græci *ναύρωα* uocant: subitus horror exoluit. Si in febre aures obtusæ sunt: si sanguis e naribus fluxit: aut uenter resolutus est: illud malum desinit ex toto. Nihil plus aduersus surditatem, quam biliosa alius potest. Quibus in fistula urinæ uti mæ nuti apices, quos *ουράτα* græci uocant: esse cœperunt: ubi pus ea pte profluxit, sanitas redditur. ex quibus cum pleraque per se proueniant: scire licet interea quoque quæ ars adhibet: naturam plurimum posse. Contra si caput febre continenti dolet: neque quicquam reddi: malum atque mortiferum est: maximeque id periculum est pueris à septimo anno ad quartum decimum. In pulmonis morbo si sputum primis diebus non fuit: deinde à septimo die cœpit, et ultra septimum mansit: periculosum est. Quantoque magis mixtos, neque inter se diductos colores habet: tanto deterius. et tamen nihil peius est, quam sincerum id edi: siue rufum est, siue cruentum: siue album, siue glutinosum: siue pallidum, siue spumans. nigrum tamen pessimum est. In eodem morbo periculosa sunt tussis, destillatio, etiam quod aliis salutare habetur, sternutamentum. Periculosissimumque est si hæc secuta subita deiectio est. Ferè uero quæ in pulmonis, eadem in lateris doloribus, et mitiora signa, et asperiora esse consueverunt. Ex iecinore si pus cruentum exit: mortiferum est. At ex suppurationibus hæc pessimæ sunt: quæ intus tendunt sic, ut exteriorem quoque cutem decolorent. Ex his deinde, quæ in exteriorem partem prorumpunt, quæ maximæ: quæque planissimæ sunt. Quod si ne rupta quidem uomica uel pure extrinsecus emissio febris quieuit: aut quauis quierit: tamen repetit. item si sitis est: si cibi fastidium, si uenter liquidus, si pus est liuidum, et pallidum, si nihil æger excreat, nisi pituitam spumantem: periculum certum est. Atque ex his quidem suppurationibus, quas pulmonum morbi concitant: ferè senes moriuntur: ex cæteris iuniores. At in tabe sputum mixtum, purulentum, febris assidua, quæ et cibi tempora eripit: et siti affligit in corpore tenui: periculum subesse testatur. Si quis etiam in eo morbo diutius traxit: ubi capilli fluunt: ubi urina quædam araneis similia subsidentia ostendit: atque in his odor foedus est: maximeque ubi post hæc orta deiectio est: protinus moritur. Vtique si tempus autumnus est: quo ferè qui cætera parte anni traxerunt: resoluuntur. Itè pus expuisse in hoc morbo, deinde ex toto spueri desisse, mortiferum est. Solent etiam in adolescentibus ex eo morbo uomica, fistulaeque oriri: quæ non facile sanescunt: nisi si multa signa bonæ ualeitudinis subsequuta sunt. Ex reliquis uero minime facile sanantur uirgines, aut hæc mulieres: quibus super tabem menstrua suppressa sunt. Cui uero sano subitus dolor capitis ortus est: dein somnus oppressit, sic ut stertat: neque

neq; expergetur, intra septimum diem pereundū est: magis si cum alius cita non antecesserit. Si palpebrae dormientis non coeunt: si albi oculorum apparet. quos tamen ita mors sequitur: si id malum non est febre discussum. At aqua inter cutem, si ex acuto morbo coepit: ad sanitatem raro perducitur. utiq; si contraria his, quae supra posita sunt: subsequuntur. &que in ea quoq; tussis spem tollit. Item si sanguis sursum, deorsumq; erupit: & aqua medium corpus impleuit. Quibusdam etia in hoc morbo tumores oriuntur: deinde desinunt: deinde rursus assurgunt. Hi quidem tutiores sunt: quam qui supra comprehensi sunt, si attenduntur. sed ferè fiducia secundae valetudinis opprimuntur. Illud inre aliquis mirabitur: quomodo quaedam simul & affligunt nostra corpora, & parte aliqua tueantur. Nam siue aqua inter cutem quem impleuit: siue in magno abscessu multum puris coit: simul id omne effudisse aequè mortiferum est: ac si quis sani corporis vulnere factus exanguis est. Articuli uero, qui sic dolent, ut super eos ex callo quaedam tubercula innata sint: nunquam liberantur. quæq; eorum uicia uel in senectute coeperunt: uel in senectutem ab adolescentia peruenerunt, ut aliquando leniri possint: sic nunquam ex toto finiuntur. Morbus quoq; comitialis post annum quintum & uigesimum ortus ægre curatur: multoq; ægrius is, qui post quadragesimum annum coepit, adeo ut in ea ætate aliquid in natura spei, uix quicquam in medicina sit. In eodem morbo si simul totum corpus afficitur: neq; ante in partibus aliquis uenientis mali sensus est: sed homo ex improviso concidit: cuiuscunq; is ætatis est: uix sanescit. Si uero aut mens læsa est: aut neruorum facta resolutio: medicinae locus non est. Deiectionibus quoq; si febris accessit: si inflammatio iocinoris, aut precordiorum, aut uentris: si inmodica sitis, si longius tempus, si aluus uaria, si cum dolore est: etiam mortis periculum subest. maximeq; si inter hæc tormina uetera esse coeperunt. Isq; morbus maxime pueros absumit usq; ad annum decimum. ceteræ ætates facilius sustinent. Mulier quoq; grauida eiusmodi casu rapi potest, atq; etiam si ipsa conuuluit, partum tamen perdit. Quin etia tormina ab atra bile orsa, mortifera sunt: aut si sub his extenuato iam corpore subito nigra aluus profluxit: aut intestinorum leuitas. Periculosior est si frequens deiectio est: si uenter omnibus horis, & cum somno, & sine hoc profluit: si similiter noctu, & interdiu: si quod excernitur aut crudum est, aut nigrum: & præter id etiam leue, & mali odoris sit: si sitis urget: si post potionem urina non redditur: quod euenit quia tunc liquor omnis non in uesciam, sed in intestina descendit: si os exulceratur: si rubet facies, & quasi maculis quibusdam colorum omnium distin-

Aurelij Cor.

c. iij

*Morbus ex parte
si morbus potius*

Eptia

Inuolutio

Tum

LIBER

guitur: si uenter est quasi fermentatus, pinguis, atq; rugosus: si et ibi cupiditas non est. Inter quæ cum euidentis mors sit, multo euidentior est: si iam longum quoq; id uitium est: maximeq; si etiã in corpore se nili est. si uero in tenuiore intestino morbus est: uomitus, singultus, neruorum distentio, delirium: mala sunt. At in morbo arquato durũ fieri iecur perniciosissimum est. Quos lienis male habet, si tormina prehenderunt: deinde uersa sunt: uel in aquam inter cutem, uel intestinorum leuitatem uix ulla medicina periculo subtrahit. Morbus intestini tenuioris, nisi resolutus est intra septimum diem, occidit. Mulier ex partu si cum febre uehementibus etiam, et assiduus capitis doloribus premittur: in periculo mortis est. si dolor, atq; inflammatio est in his partibus, quibus uiscera continentur: frequenter spirare signum malum est. Si sine causa longus dolor capitis est: et in ceruices, ac scapulas transit: rursumq; in caput reuertitur: aut à capite ad ceruices, scapulasq; peruenit: perniciosus est: nisi uomitam aliquam excitauit sic, ut pus extussiretur: aut nisi sanguis ex aliqua parte prorupit: aut nisi in capite multa prurigo, toto ne corpore pustulæ ortæ sunt. Aequè magnum malum est, ubi torpor, atq; prurigo peruagantur modo per totum caput, modo in parte: aut sensus alicuius ibi quasi frigoris est: eaq; ad summam quoq; linguam perueniunt. Et cum in hisdem abscessibus auxilium sit: eo difficilior sanitas est: quo minus sæpe sub his malis illi subsequuntur. In coxæ uero doloribus si uehemens torpor est: frigesctq; crus, et coxa: aliusq; nisi coacta non reddit: idq; quod excernitur, mucosum est: iamq; ætas eius hominis quadragesimum annum excessit: is morbus erit longissimus, minimeq; annuus: neq; finiiri poterit nisi aut uere, aut autumno. Difficilis æque curatio est in eadem ætate, ubi humerorum dolor uel ad manus peruenit: uel ad scapulas tendit: torporemq; et dolorem creat: neq; bilis uomitu leuatur. Quacumq; uero parte corporis membrum aliquod resolutum est: si neq; mouetur, et emacrescit: in pristinum habitum non reuertitur: eoq; minus quo uetustus id uitium est: et quo magis in corpore senili est. Omnisq; resolutioni neruorum ad medicinam non idonea tempora sunt hyemis, et autumnus. aliquid sperari potest uere, et æstate. Isq; morbus mediocris uix sanatur: uehemens sanari non potest. Omnis etiã dolor minus medicinæ pater: qui sursum procedit. Mulieri grauidæ, si subito mammæ emacruerunt: abortus periculum est. Quæ neq; peperit, neq; grauida est, si lac habet: à menstruis defecta est. Quartana æstima breuis: autumnalis ferè longa est: maximeq; quæ coepit hyeme appropinquante. si sanguis profluxit: deinde secuta est dementia cum distentione neruorum: periculum mortis est. Itemq; si

medicamentis purgatum, & adhuc inanem, nervorum distentio oppres-
sit: aut si in magno dolore extremæ partes frigent: neq; is ad vitam
redit: qui ex suspendio spumante ore detractus est. Alius nigra san-
guini atro similis repentina siue cum febre, siue etiam sine hac, per-
niciosa est.

De morborum curationibus. Caput. VIII.

Ognitis inditijs, quæ nos uel spe consolentur: uel metu ter-
reant: ad curationes morborum transeundum est. Ex his
quædam cões sunt: quædam propriæ. cões, quæ pluri-
bus morbis opitulantur. propriæ, quæ singulis. ante de
communibus dicam. Ex quibus tamen quædam non ægros solum, sed
sanos quoq; sustinent: quædam in aduersa tantum ualitudine adhiben-
tur. Omne uero auxilium corporis aut demit aliquam materiam:
aut adiut: aut euocat: aut reprimat: aut refrigerat: aut calefacit: si-
mulq; aut durat: aut molliat. Quædam non uno modo tantum, sed et
duobus inter se non contrarijs adiuvant. Demitur materia sanguinis
detractione, cucurbitula, deiectione, uomitu, frictioe, gestatione, omniq;
exercitatione corporis, abstinentia, sudore: de quibus protinus dicam.

*Corruptio Cões
curationis. Gal.*

De sanguinis detractone per uenas. Caput. IX.

Anguinem incisa uena mitti nouum non est. sed nullum
pene morbum esse, in quo non mittatur: nouum est. Item
mitti iunioribus, & foeminis uterû non gerentibus, uetus
est. In pueris uero idẽ experiri, & in senioribus, & in
gravidis quoq; mulieribus uetus non est. si quidẽ antiqui primam, ul-
timamq; ætatem sustinere non posse hoc auxilij genus iudicabant: per-
suaserantq; sibi mulierem gravidã, quæ ita curata esset: abortum esse
facturã. Postea uero usus ostendit nihil ex his esse perpetuum: aliasq;
potiores obseruationes adhibendas esse: ad quas dirigi curantis consi-
lium debeat. interest enim non quæ ætas sit: neq; qd in corpore in-
tus geratur: sed quæ uires sint. Ergo si iuuenis imbecillus est: aut si mu-
lier, quæ gruida non est: parum ualet: male sanguis emittitur. Ema-
ritur enim uis, si quæ his supererat: et hoc modo erepta ẽ. At firmus
puer, & robustus senex, & gruida mulier ualens, tuto curantur. Ma-
xime tamen in his medicus imperitus falli põt: quia ferẽ minus robo-
ris illis ætatibus subest. Mulieriq; prægnati post curationẽ quoq; uiri
bus opus est nõ tantũ ad se, sed et ad partiũ sustinendũ. Non qd aut

*ad Mulieris pueri
quædam pueri
in pueris se
medicanda.*

Arts magis copiosus

lib. 2. de Febr.

intentionem animi, aut prudentiam exigit, protinus faciendum est: cum præcipua in hoc ars sit, quæ non annos numeret: neque conceptionem solam uideat: sed vires æstimet: & ex eo colligat, possit nec ne su-
peresse quod uel puerum, uel senem, uel in una muliere quod duo cor-
pora simul sustineat. Interest enim inter ualens corpus, et obesum: in-
ter tenue, & infirmum. Femtioribus magis sanguis, plenioribus ma-
gis caro abundat. Facilius itaq; illi detractionem eiusmodi sustinent:
celeriusq; ea, si nimium est pinguis: quis affligitur. Ideoq; uis corpo-
ris melius ex uenis, quam ex ipsa specie æstimator. neq; enim solum
hæc considerata sunt, sed etiam morbi genus quod sit. utrum su-
perans, an deficiens materia læserit. Corruptum corpus sit, an inte-
grum. Nam si materia uel deest, uel integra est: istud alienum est.
At si uel copia sui male habet, uel corrupta est: nullo modo melius
succurritur. Ergo uehemens febris ubi rubet corpus, plenæq; uenæ tu-
ment: sanguinis detractionem requirit. Item uiscerum, morbi, neruo-
rumq; resolutio, & rigor, & distentio, quicquid deniq; fauces difficul-
tate spiritus strangulat: quicquid subito suppressit uocem: quisquis in-
tolerabilis dolor est: & quacumq; de causa ruptum aliquid intus, atq;
collisum est. Item malus corporis habitus, omnesq; acuti morbi, qui
modo, ut supra dixi, non infirmitate, sed onere nocet. fieri tamen po-
test, ut morbus quidem id desideret: corpus autem uix pati posse ui-
deatur. Sed si nullum tamen appareat aliud auxilium: periturusq; sit
qui laborat, nisi temeraria quoq; uia fuerit adiutus: in hoc statu boni
medici est ostendere: q̄ nulla spes sine sanguinis detractione sit: fi-
teri q; quantus in hac ipsa re sit motus. & tum demum si exigetur,
sanguinem mittere. de quo dubitari in eiusmodi re non oportet. satius
est enim anceps auxilium experiri, quam nullum. idq; maxime fie-
ri debet ubi nervi resoluti sunt: ubi subito aliquis obmutuit: ubi ang-
ina strangulatur: ubi prioris febris accessio penè conficit, parem q;
subsequi uerisimile est, neq; eandem uidentur sustinere ægri vires
posse. Cum sit autem minime crudo sanguis mittendus: tamen ne id qui-
dem perpetuum est. neq; enim semper concoctionem res expectat.
Ergo si ex superiore parte aliquis decidit: si contusus est: si ex aliquo
subito casu sanguinem uomit, quamuis paulo ante sumpsit cibum: ta-
men protinus ei demenda materia est: ne si subsederit, corpus affligit.
Idemq; etiam in alijs casibus repentinis qui strangulabunt, dictum
erit. At si morbi ratio patietur: tum demum nulla cruditudinis suspi-
tione remanente id fiet. Ideoq; ei rei uidetur aptissimus aduersæ ua-
letudinis dies secundus, aut tertius. sed ut aliquando etiam primo die
sanguinem mittere necesse est: sic nunquam utile post diem quar-
tum est:

*In casu or alio q̄
primus natus*

tum est: cum iam spatio ipso materia & exhausta est, & corpus cor-
rumpit: ut detractio imbecillum id facere possit: non possit integrum.
Quod si uehemens febris urget: in ipso impetu eius sanguinem mitte-
re, hominem iugulare est. Expectanda ergo remissio est, si non decre-
scat: sed crescere desit: neq; speratur remissio, tunc quoq; quamuis pe-
ior: sola tamen occasio non omittenda est. Ferè etiam ista medicina
ubi necessaria est: in biduum diuidenda est. satius est enim in primis
lenare ægrum: deinde perpurigare: quàm simul omni ui effusa for-
tasse præcipitare. Quod si in cura quoq; aqua, quæ inter cutem est,
ista respondet: quanto magis necesse est in sanguine respondeat. miti
uero is debet, si totius corporis causa sit, ex brachio. si partis alicuius,
ex ea ipsa parte: aut certe quàm proxima. quia non ubiq; mitti potest,
sed in temporibus: in brachijs, iuxta talos. Neq; ignoro quosdam dice-
re quamlongissime sanguinem inde, ubi lædit, esse mittendum. sic enim
auerti materiæ cursum: at illo modo in id ipsum quod grauat, euoca-
ri. sed id ipsum falsum est. Proximum enim locum primo exaruit.
Ex ulterioribus autem catenus sanguis sequitur, quatenus emittitur.
ubi is suppressus est: quia non trahitur, ne uenit quidem. Videtur ta-
men usus ipse docuisse: si caput fractum est, ex brachio potius sangui-
nem mittendum esse. Si quod in humero uicium est, ex altero brachio:
credo quia si quid parum cesserit, opportuniore hæ partes iniuriæ
sunt: q̃ quæ iam male habent. auertitur quoq; interdum sanguis, ubi
alia parte prorumpens: alia emittitur. Desinit enim fluere qua uolu-
mus: inde obiectis quæ prohibeant, alio dato itinere. Mittere autem
sanguinem cum sit expeditissimum: usum habenti, tum ignaro diffi-
cillimum est. iuncta enim est uena arterijs, his nervi. ita si neruum
scalpellus attigit: sequitur neruorum distentio: eaq; hominem crudeli-
ter consumit. At arteria incisa neq; coit, neq; sanescit: interdum etiam
ut sanguis uehementer erumpat, effluit. Ipsius quoq; uenæ, si forte præ-
cisa est, capita comprimuntur: neq; sanguinem emittunt. At si timide
scalpellus demittitur: summam cutem lacerat: neq; uenam inadit. Nō
numquam etiam ea latet: neq; facile reperitur. ita multæ res id diffi-
cile inscio faciunt: quod perito facillimum est. Incidenda ad medium
uena est: ex qua cum sanguis erumpit, colorem eius, habitumq; oportet
attendere. Nam si is crassus, & niger est, uitiosus est: ideoq; utiliter
effunditur. Si rubet, & pellucet, integer est. eaq; missio sanguinis adeo
nō prodest: ut etiā noceat protinusq; is suppressendus est. Sed id eue-
nire non potest sub eo medico, qui scit ex quali corpore sanguis mitten-
dus sit. Illud magis fieri solet, ut æquæ niger assidue ac primo die
profluat. quod quamuis ita est, tamen si iam satis fluxit: suppressum

De febre feb.

*Emunctio vni
quodammodo*

Quod sanguis. con.

aus est: semperq; ante finis faciendus est, q; anima deficiat. deligan-
dumq; brachiū super imposito expresso ex aqua frigida penicillo: et
postero die auerso medio digito, non aut scalpello, uena ferienda: ut re-
cens coitus eius resoluitur: iterumq; sanguinem fundat. siue aut pri-
mo, siue secundo die sanguis, qui crassus, et niger initio fluxerat: et
rubere, et pellucere cepit: satis materiae detractum est: atq; quod
superest, sincerum est. Ideoq; protinus brachium deligandum: ha-
bendumq; ita est, donec ualens cicatrix sit: quæ celerime in uena
confirmatur.

De sanguinis detractioe per cucurbitulas. Caput. X.

Cucurbitularum uero duo genera sunt: aeneum, et cor-
neum. Aenea altera patet: altera clausa est. Cornea alte-
ra parte æque patens, altera foramen habet exiguum. In
aeneam linamentum ardēs coniicitur: ac sic os eius corpo-
ri aptatur: imprimiturq; donec inhæreat. Cornea per se corpori im-
ponitur: deinde ubi ea parte qua exiguum foramen est, ore spiritus ad-
ductus est: superq; cæra cauum id clausum est: æque inhærescit.
Vtraq; non ex his tantum materiae generibus, sed etiam ex quolibet
alio recte fit. At si cætera defecerūt: caliculus quoq; aut pultarius oris
compressioris ei rei commode aptatur: ubi inhæsit: si concisa ante scal-
pello cutis est, sanguinem extrahit. si integra est, spiritum. Ergo ubi
materia quæ intus est, lædit: illo modo: ubi inflatio, hoc imponi solet.
V¹ usus autem cucurbitulae præcipuus est: ubi non in toto corpore, sed in
parte aliqua uitium est: quam exhauriri ad confirmandam ualetu-
dinem satis est. Idq; ipsum testimonium est: etiam scalpello sanguine,
ubi membro succurritur, ab ea potissimum parte: quæ iam læsa est: esse
mittendum. q; nemo cucurbitulam diuersæ parti imponit: nisi cum
profusionem sanguinis eo auertit: sed ei ipsi quæ dolet: quæq; liberã
da est. Opus etiam esse cucurbitula potest in morbis longis: quanuis et
spacium aliquod accessit: siue corrupta materia, siue spiritu male ha-
bente. In acutis quoq; quibusdã si et leuari corpus debet: et ex uena
sanguinem mitti: uires non patiuntur. Idq; auxilium ut minus uehe-
mens, ita magis tutum. Neq; unquam periculosum est, et si in medio fe-
bris impetu et si in cruditate adhibetur. Ideoq; ubi sanguinem mitti
opus est: si incisa uena præceps periculum est: aut si in parte corpo-
ris etiam uitium est: huc potius confugiendum est. cū eo tamen ut scia-
mus, hic ut nullum periculum, ita lenius præsidium esse: nec posse ue-
hementi malo, nisi æque uehemens auxilium succurrere.

lib. 1. A. 6.

Deier Leo

d Eiectionem aut antiqui varijs medicamentis, crebraq; alui
ductione in omnibus ferè morbis moliebantur: dabantq;
aut nigrum ueratrū, aut filiculam, aut squamam æris,
quam λεπίδος χαλκός græci uocant: aut lactucæ marinæ
lac: cuius gutta panī adiecta, abunde purgat: aut lac uel asininum, uel
bubulum, uel caprinum: eiq; salis paulum adiciebant: decoquebantq;
id: et sublatis his, quæ coierant: quod quasi serum supererat: bibere
cogebant. Sed medicamenta stomachū ferè lædunt. ideoq; omnibus ca-
tharticis aloe miscenda est. Aluus si uehementius fluit: aut sæpius duc-
tur: hominem infirmit. Ergo nunquam in aduersa ualetudine medica-
mentum eius rei causa recte datur: nisi ubi is morbus sine febre est. Ut
cum ueratrū nigrum, aut atra bile uexatis, aut cum tristitia insanien-
tibus, aut is quorū nerui parte aliqua resoluti sunt: datur. At ubi fe-
bres sunt: satius est eius rei causa cibos, potionesq; assumere: qui simul
et alant: et uentrē molliant. Suntq; ualetudinis genera, quibus ex la-
cte purgatio conuenit. Plerumq; uero aluus potius ducenda est: quod ab
Asclepiade quoq; sic uituperatum, ut tamen seruatum sit: uideo ple-
rumq; sæculo nostro præteriri. Est autem ea moderatio, quam is seculi
uideretur: aptissima: ut neq; sæpe ea medicina tentetur: et tamen se-
mel sumptum uel bis, non omittatur. Si caput graue est: si oculi cali-
gant: si morbus maioris intestini est, quod græci πύλιν nominant: si in
imo uentre, aut in coxa dolores sunt: si in stomachū quædam biliosa
cōcurrunt: uel et pituita eò se, humor'ue aliquis aquæ similis confert:
si spiritus difficiliter redditur: si nihil per se uenter excernit. utiq; si
iuxta quoq; sterqus est, et intus remanet: aut si stercoreis odorē nihil
deiciens, eger ex spiritu suo sentit: aut si corruptum est quod excerni-
tur: aut si prima media febrē non sustulit: aut si sanguinem mitti, cui
opus sit: uires non patiuntur: tempus'ue eius rei præterijt. aut si mul-
tum ante morbū aliquis portauit: aut si is qui sæpe, uel sponte, uel casu
purgatus est: subito habet aluū suppressam. seruanda uero illa sunt, ne
ante diem tertiu ducatur: ne ulla cruditate substante, ne in corpore in-
firmo, diuq; aduersa ualetudine exhausto: ne'ue in eo, cui satis aluus
reddit cotidie, qui'ue eam liquidam habebit: ne in ipso accessionis im-
petu, q' quod tum infusum est, aluo continetur: regestumq; in caput
multo grauius piculū efficit. pridie uero abstinere debet eger: ut aptus
tali curationi sit. Eodē die ante aliquot horas aquā calidā bibere, ut
superiores eius ptes madescat: tum imittēda in aluū est: si leui medici-
na cōiecti sumus: pura aqua, si paulo ualētiori: mulsa, si leni, ex aqua in

Lac alui ducit

Aluus & ab alijs
officijs p'hibet.

Alui ducendi
modi d'notantur

Alui ducendi
modi d'notantur

LIBER

aqua faenum graecum uel ptisana uel malua decocta sit. si reprimendi causa: ex uerbena. acris autem est marina aqua uel alia, sale adiecto: atque utraq; decocta commodior est. Acrior fit adiecto uel oleo elu nitro uel melle quoque. Si acrior est: eo plus extrahit: sed minus faciel sustinetur. Id quod infunditur: neque frigidum esse oportet: neque calidum: ne alterutro modo laedat. Cum infusum est: quantum fieri potest continere se in lectulo debet aeger: nec primae cupiditati deiectionis proinus cadere. ubi necesse est, tum demum residere. feretque eo modo decepta materia superioribus partibus leuatis morbum ipsum moluit. Cum uero, quoties res coegit, desidendo aliquis se exhaust: paullisper debet conquiescere, et ne uires deficiant: utique eo die cibum assumere. qui plenior an exiguus sit dandus: ex ratione eius accessionis, quae expectabitur, aut in metu non erit, aestimari oportebit.

De uomitu. Caput. XII.

T uomitus ut in secunda quoque ualitudine saepe necessarius biliosis est: sic et in his morbis, quos bilis concitauit. Ergo omnibus, qui ante febres horrore, et tremore uexantur: omnibus, qui cholera laborant: omnibus et cum quadam hilaritate insanientibus, et comitiali quoque morbo oppressis, necessarius est. Sed si acutus morbus est, sicut in cholera: si febris est, ut inter horrores: asperioribus medicamentis opus non est: sicut in deiectionibus quoque supra dictum est. satisque est ea uomitus causa sumi: quae sanis quoque sumenda esse proposui. At ubi longi ualentesque morbi sine febre sunt, ut comitialis, aut insania: ueratro quoque albo utendum est: id neque hyeme, neque aestate recte datur: optime uere: tolerabiliter autumno. quisquis daturus erit, id agere ante debet, ut accepturi corpus humidius sit. Illud scire oportet, omne eiusmodi medicamentum, quod potui datur, non semper aegris prodesse: semper sanis nocere.

De frictione. Caput. XIII.

E frictione uero, et gestatione adeo multa Asclepiades tanquam inuentor eius posuit: quod in eo volumine, quod communium auxiliorum scripsit: cum trium tantum facere mentionem, uinis. s. et aque, et gestationis: tamen maximam partem in hoc consumpserit. Oportet autem neque recentiores uiros in his fraudare: quae uel repperunt: uel recte secuti sunt. Et tamen ea, quae apud antiquiores aliquos posita sunt: authoribus suis reddere. Neque dubitari potest quin latius quidem

Et dilucidius ubi, Et quomodo frictione utendū esset, A sclepiades præ-
 cepit: nihil tamen reppererit, quod non à vetustissimo auctore Hip-
 pocrate paucis uerbis cōprehensum sit: qui dixit. frictione, si uehemēs
 sit, durari corpus: si lenis, molliri: si multa, minui: si modica, impleri. se-
 quitur ergo ut tum utendum sit: cum aut astringendum corpus sit,
 quod fluēs est: aut molindū quod induruit: aut digerendū in eo quod
 copia nocet. aut alendum id q̄ tenue: Et infirmum est. Quas tamen
 species si quis curiosius æstinet, quod iam ad medicum non pertinet: fa-
 cile intelliget omnes ex una causa pendere, quæ demit. Nam Et astrin-
 gitur aliqd eo dempto: quod interpositum, ut id laxaretur, effecerat.
 Et molitur eo detracto, quod duriciē creabat: Et impletur non ipsa
 frictione, sed eo cibo: qui postea usq; ad cutem digestionē quadam rela-
 xatam penetrat. Diuersarum uero rerū in modo causa est. Inter un-
 ctionem autem, Et frictionem multum interest. Vng. n. leniterq; per-
 tractari corpus ē in acutis, Et recentibus morbis oportet: in remissio-
 ne tamen, Et ante cibum. Longa uero frictione uti neq; in acutis mor-
 bis, neq; in crescentibus conuenit: præter q̄ cum phreniticis somnus ea
 requiritur. Amat aut hoc auxiliū ualetudo longa, Et ē à primo im-
 petu inclinata. Neq; ignoro quosdā dicere omne auxiliū necessarium
 esse in crescentibus morbis: non cum iam per se finiuntur. quod non
 ita se habet. Potest. n. morbus etiam qui per se finem habiturus est: ci-
 tius tamen adhibito auxilio tolli. quod duabus de causis necessarium
 est: ut Et q̄ primum bona ualetudo contingat: Et ne morbus qui re-
 manet, iterum quanuis leui de causa exasperetur. Potest. n. morbus mi-
 nus grauis esse q̄ fuerit: neq; ideo tamen solui: sed reliquiis quibusdā
 inhærere: quas admotum aliquod auxiliū discentit. Sed ut leuata quoq;
 aduersa ualetudine recte frictio adhibetur: sic nunq; adhibenda est fe-
 bre incescente. Verum si fieri poterit, cum ex toto corpus ea uacabit:
 minus certe cum ea remiserit. Eodem autem modo in tutis corpori-
 bus esse debet: ut cum infirmus aliquis implendus modo est in par-
 tibus: aut quia ipsius membri imbecillitas id requirit: aut quia
 alterius. Nam Et capitis longos dolores ipsius frictio leuat: non in
 impetu tamen doloris, Et membrum aliquod resolutum ipsius fri-
 ctione confirmatur. Longe tamen sepius aliud perfricandum est, cum
 aliud dolet: maximeq; cum à summis, aut à medijs partibus corporis
 euocare materiā uolumus: ideoq; extremas partes pfricamus. Neq;
 audiendi sunt, qui numero finiunt quoties aliquis perfricandus sit. Id
 enim ex uiribus hominis colligendum est. Et si is qui per infirmus est:
 potest satis esse, quinquages. si robustior pōt, ducenties esse faciendum.
 Inter utrunq; deinde prout uires sunt. Quo fit ut et minus sepe in

Inter frictio

Unctu

quorū

LIBER

muliere, quàm in uiro: minus sæpe in puero, uel senē, quàm in iuvene manus dimouendæ sint. Deniq; si certa membra perfricantur: multa, ualentiq; frictione opus est. Nam neq; totum corpus infirmari cito per partem pōt: & opus est quā plurimū materiæ digeri: siue id ipsum membrum, siue per id aliud leuamus. At ubi totius corporis imbecillitas hanc curationē per totum id exigit: breuior esse debet, & lenior: ut tantummodo summam cutem emolliat: quo facilius capax ex recēti cibo nouæ materiæ fiat. In malis iam ægrum esse testatur: ubi exterior pars corporis friget: interior cum siti calet: ut supra posui. Sed tunc quoq; unicum in frictione præsidium est: quæ si calore in cutem euocauit: potest alicui medicinæ locum facere.

De gestatione. Caput. XIII.

g Estatio quoq; longis etiam, & inclinatis morbis aptissima est. utilisq; est & his corporibus, quæ iam ex toto febre carent: sed adhuc exerceri per se nō possunt: & his quibus lentæ morborū reliquæ remanent: neq; aliter eliduntur. Asclepiades etiam in recenti, uehementiq; febre, præcipueq; ardente, ad discutiedam eam, gestatione dixit utendum esse. sed id periculose fit: meliusq; quiete eiusmodi impetus sustinetur. si quis tamen experiri uolet: sic experiatur. si lingua non erit aspera: si nullus tumor, nulla durities, nullus dolor uisceribus, aut capiti, aut præcordiis suberit. et ex toto nunquā gestari corpus dolens debet: siue id in toto, siue in parte est: nisi tamen solis nervis dolentibus, neq; unquam in recenti febre, sed in remissione eius. Genera autem gestationis plura sunt adhibenda: quæ sunt et pro uiribus cuiusq; & pro opibus: ne aut imbecillum hominem nimis digerant: aut humili obsint. Gestationum lenissima est navi, uel in portu, uel in flumine. uehementior in alto mari navi, uel lectica, aut scanno: acrior uehiculo. Atq; hæc ipsa & intendi, & leniri possunt. si nihil horum est, suspendi lectus debet: & moueri. si ne id quidem est: at certe uni pedi lecti subiiciendus funiculus est: atq; ita lectus huc, & illuc manu impellendus. Et leuia quidem genera exercitationis infirmis conueniunt. Valentiora uero his qui iam pluribus diebus febre liberati sunt: aut his qui grauium morborum initia sic sentiunt: ut adhuc febre uacent. Quod & in tabe, et in stomachi uitij, & cum aqua cutem subijt, & interdum in morbo regio fit: aut ubi quidā morbi, qualis comitialis, qualis insania ē sine febre, quauis diu manent. In quibus affectibus ea quoq; genera exercitationum necessaria sunt, quæ cōprehendimus eo loco: quo quemadmodum sani, neq; firmi homines se gererent: præcepimus.

Abstinentiæ uero duo genera sunt: alterum ubi nihil assumit æger: alterum ubi non nisi quod oportet. Initia morborum primum famem, sitimq; desiderant: ipsi deinde morbi, moderationem: ut neq; aliud quàm expedit: neq; eius ipsius nimium sumatur. Neq; enim conuenit iuxta mediam protinus sacietatem esse. Quod si sanis quoq; corporibus inutile est: ubi aliqua necessitas famem fecit: quanto inutilius est in corpore et ægro? Neq; ulla res magis adiuvat laborantem, q̃ tempestiua abstinentia. Intemperantes homines apud nos, ipsi cibi tempora curantibus dant. Rursus alij tempora medicis pro dono remittunt: sibi ipsis modum uē dicant. Liberaliter agere se credunt qui cætera illorum arbitrio relinquunt: in genere cibi liberi sunt: quasi queratur qd medico liceat: non quid ægro salutare sit: cui uehementius nocet, quotiens in eius quod assumitur uel tempore, uel modo, uel genere peccatur.

De sudore. Caput. XVI.

Vdor etiam duobus modis elicitur: aut sicco calore, aut balneo. Siccus calor est, et harenæ calidæ, et laonici, et clibani, et quarundam naturalium sudationes. ubi è terra profusus calidus uapor edificio includitur: si ut sup̃ baras in myrtetis habemus. Præter hæc sole quoq; et exercitatioe is mouetur. Vtiliaq; hæc genera sunt quoties humor intus nocet: isq; digerendus est. Ac neruorum quoq; quedam uitia sic optime curantur: sed cætera infirmis possunt conuenire. solet exercitatio tantum robustioribus, qui tamen sine febre, uel initio morbi, uel et grauius morbis tenentur. Cauendum autem est nequid horū uel in febre, uel in cruditate tentetur. At balnei duplex usus est. nam modo discussis febribus initium cibi plenioris, uiniq; firmiteris ualeitudini facit: modo febre ipsam tollit: fereq; adhibetur, ubi summam uitæ relaxari, euocariq; corruptum humorem, et habitum corporis mutari expedit. antiqui timidius eo utebantur. Asclepiades audacius. Neq; terrere autem ea res, si tempestiua est: debet. et ante tempus nocet. Quisquis febre liberatus est: simulatq; ea uno die non accessit: eo, qui proximus est, post tēpus accessionis, tuto lauari potest. At si circuitum habet: ea febris solita est, sic, ut tertio, quarto uel die reuertatur: quodcumq; non accessit: balneum tutum est. Manentibus uero adhuc febribus, si hæc sunt lentæ, lienesq; iam diu male habent: recte medicana ista tentatur: cum eo tamen ne præcordia dura sint:

Cuiusmodi

Paulus

LIBER

De balneo
 ne'ue ea tumeant: ne'ue lingua aspera sit: ne'ue aut in medio corpore,
 aut in capite dolor ullus sit: ne'ue tum febris increseat. At in his qui-
 dem febribus, quæ certum circuitum habent, duo balnei tempora sunt:
 alterum ante horrorem, alterum febre finita. In his uero, qui lentis fe-
 briculis diu detinentur: cum aut ex toto recessit accessio: aut si id non
 solet, certe lenita est: iamq; corpus tam integrum est: quam maxime esse
 in eo genere ualitudinis solet: imbecillus homo iturus in balneum ui-
 ture debet: ne ante frigus aliquod experiatur. Vbi in balneum uenit,
 paulisper resistere: expeririq; num tempora astringantur: & an su-
 dor aliquis oriatur. Illud si incidit, hoc non secutum est: inutile eo die
 balneum est: perungendus est is leniter, & auferendus est: uitandumq;
 omnimodo frigus: & abstinentia utendum. At si temporibus integris
 primum ibi, deinde alibi sudor incipit: fouendum os aqua calida: tū
 in solio desidendum est: atq; ibi quoq; uidendum, num sub primo cō-
 tactu aquæ calidæ summa cutis inhorrescat: quod uix tamen fieri po-
 test, si priora recte cesserunt. certum id autem signum inutile bal-
 nei est. Ante uero, an posteaquam in aquam calidā se demittat: ali-
 quis perungi debeat: ex ratione ualitudinis suæ cognoscat. Fere ta-
 men, nisi ubi nominatim, ut postea fiat, id præcipitur: moto sudore le-
 uiter corpus perungendum: deinde in aquam calidam demittendū est.
 atq; hic quoq; habenda uirium ratio est. Neq; committendum ut per-
 æstum anima deficiat: sed maturius is auferendus: curiosq; in uesti-
 mentis inuoluendus est. ut neq; ad eum frigus aspires: & ibi quoq;
 antequam aliquid assumat: insudet. Fomenta quoq; calida sunt milui,
 sal, harena, quodlibet eorum calefactum, et in linteum coniectum. Si
 minore ui opus est: etiam solum linteū. At si maiore: extincti titiones,
 inuolutiq; panniculi, & sic circumdati. Quin etiam calido oleo replē-
 tur utriculi: & in uasa fictilia: ad similitudinem, quas lenticulas uo-
 cant: aqua coniātur: & sal sicco linteo excipitur. demittiturq; in a-
 quam bene calidam. tum super id membrum, quod fouendum est: collo-
 catur: iuxtaq; igne ferramenta duo sunt capitulis paulo latioribus: al-
 terumq; ex his demittitur in eū salem: & aqua super leniter asper-
 gitur. ubi frigere coepit, ad ignem refertur: & idem in altero fit: de-
 inde inuicem in utroq; inter quæ descendit salsus, & calidus suatus: qui
 contractis aliquo morbo nervis opitulatur. His omnibus commune est
 digerere id quod uel præcordia onerat: uel fauces strangulat: uel in
 aliquo membro nocet. Quando autem quoq; utendū sit, in ipsis mor-
 borum generibus dicitur.

Qui abi,

Qui cibi, potiones, uel, aut ualentis, aut mediæ, aut imbecillæ materiae sint. Caput. XVII.

Utrum de his dictum sit, quæ detrahendo inuant: ad ea
 c ueniendum est, quæ nos alunt: id est cibum, et potionem.
 hæc aut non omnium tantum morborum, sed et secundum
 diuersam ualitudinis cōia præsidia sunt. Pertinetque ad rem
 omnium proprietates nosse. primum ut sani sciant quomodo his utan-
 tur. deinde ut exsequentibus nobis morborum curationem, liceat species
 rerum, quæ assidue necessariae erunt: subiicere. neque necesse est subinde
 singulas eas nominare. scire igitur oportet omnia legumina, quæque ex
 frumentis panificia sunt, generis ualentissimi esse. Id ualentissimum
 uoco: in quo plurimum alimenti est: item omne animal quadrupes do-
 mesticum: omnem grandem feram, quales sunt caprea, ceruus, aper,
 onager, omnem grandem auem, quales sunt anser, et pauo et grus:
 omnes beluas marinas, ex quibus cetos est: quæque his pares sunt. Item
 mel, et caseum quo minus mirum est, opus pistorium ualentissimum
 esse: quod ex frumento, adipe, melle, caseo constat. In media uero mate-
 ria numerari ex oleribus debere ea: quorum radices uel bulbos assu-
 minus. Ex quadrupedibus leporem aues omnes à minimis ad phœ-
 nicopterum. item pisces omnes, qui salem non patiuntur: solidi uel sali-
 untur. Imbecillissimam uero materiam esse omne olus: et quicquid
 in cauliculo nascitur: qualis est cucurbita, et cucumis, et cæpparis,
 omnia poma, oleas, co-leas, itemque cōchilia. Sed quantumvis hæc ita discre-
 ta sunt: tamen et quæ sub eadem specie sunt: magna discrimina reci-
 piunt: aliaque res alia, uel ualentior est, uel infirmior. Si quidem plus
 alimenti est in carne, quam in ullo alio. Firminus est triticum, quam mi-
 lium: id ipsum: quam hordeum: et ex tritico firmissima siligo: deinde
 simila: deinde cui nihil ademptum est, quod αὐτόρυπον græci uocant:
 infirmior est. ex polline infirmissimus cibarius panis. Ex leguminibus
 uero ualentior faba, uel lenticula, quam pisum. Ex oleribus ualentior
 rapa, napique, et omnes bulbi: in quibus cepam quoque, et allium mi-
 nore: quam pastinacæ, uel quæ specialiter radícula appellatur. Item
 firmitior brassica, et beta, et porrum: quam lactuca, uel cucurbita, uel
 asparagus. At ex fructibus surculorum ualentiores uinæ, ficus, nices,
 palinule: quam quæ poma proprie nominantur. Atque ex his ipsis fir-
 miora, quæ succosa: quam quæ fragilia sunt. Itemque ex his auibus, quæ
 in media specie sunt: ualentior ea quæ pedibus: quam quæ uolatu ma-
 gis nititur: et ex his quæ uolatu fidunt: firmiores sunt quæ grædio-
 res aues: quam quæ minuscule sunt, ut ficedula, et turdus: Atque ea quoque,

Aurelij Cor.

d

at. ualentissimæ

LIBER

quæ in aqua degunt, leuiorem cibum præstant: quàm quæ natandi scientiam non habent. Inter domesticis uero quadrupedes leuissima suilla est: grauiissima bubula. Itemq; ex feris quo maius quodq; animal, eo robustior ex eo cibus est. Pisciumq; eorum, qui ex media materia sunt, quibus maxime utimur: tamen grauissimi sunt: ex quibus salsamenta quoq; fieri possunt: qualis lacertus est. deinde qui quantus teneriores: tamen duri sunt, ut aurata, coruius, scotus, oculata, tum plani, post quos etiam leuiiores lupi, muli; , & post hos omnes saxatiles. Neq; uero in generibus rerum tantummodo discrimen est: sed etiã in ipsis: quod & ætate fit, & membro, & solo, et cœlo, et habitu. nã quæ drupes animal omne si lactans est, minus alimenti præstat. Item quo tenerior pullus, cohortalis est. In piscibus quoq; media ætas, quæ non dum summam magnitudinem impleuit. Deinde ex eodem sue unguis, rostrum, aures, cerebellum. Ex agno, hedo'ue cum pectiolis totum caput aliquanto quàm cætera membra leuiora sunt, adeo ut in media materia poni possint. Ex auibus pectora, colla, alæ'ue recte infirmis annumerantur. Quod ad solum uero pertinet: frumentum quoq; ualentius est collinum, quàm campestre. leuior piscis inter saxa editus, quàm in harena: leuior in harena, quàm in limo. Quo fit, ut ex stagno, uel lacu, uel flumine eadẽ genera grauiora sint. Leuiorq; qui in alto, quàm qui in uado uixit. Omne etiam ferum animal domesticum leuius, & quodcunq; humido cœlo, quàm quod siccum natum est. Deinde eadem omnia pinguis, quàm macra: recentia, quàm salsa, noua, quàm uetusta plus alimenti habent. Tum res eadem magis alit iurulenta, quàm assa: magis assa, quàm elixa. Ouum durum ualentissima materiæ est: molle, uel sorbile, imbecillissima. Cum quæ panificia omnia firmissima sint: elota tamen quædam genera frumenti, ut alica, oriza, ptisana, uel ex hisdẽ facta sorbitio, uel pulticula. Et aqua quoq; madens panis imbecillissimis annumerari potest. Ex potionibus uero quæcunq; ex frumento facta est: itemq; lac mulsum, defrutum, passum, uinum aut dulce, aut uehemens, aut mustum, aut magnæ uetustatis, ualentissimi generis est. At acetum, & id uinum: quod paucorum annorum, uel austerum, uel lene est: in media materia est. Ideoq; infirmis nunquam generis alterius dari debet. A qua omnium imbecillissima est. firmiorq; ex frumento potio est, quo firmitus fuit ipsum frumentum. firmior ex eo uino, quod bono solo, quàm quod tenui: quodq; temperato cœlo, quàm quod aut nimis humido, aut nimis siccum: nimumq; aut frigido, aut calido natum est. Mulsum quo plus mellis habet: defrutum quo magis incoctum est: passum quo ex siccioris uia est: eo ualentius est. A qua leuissima pluuialis est: deinde

fontana: tum ex flumine, tum ex puteo: post hæc ex niue, aut glacie. grauior his ex lacu: grauiissima ex palude. Facilis etiam et necessaria cognitio est naturam eius requirentibus. nam leuis pondere apparet: et ex his quæ pondere pares sunt, eo melior quæq; est: quo celerius et calefit, et frigescat: quoq; celerius ex ea legumina percoquantur. ferè uero sequitur ut quo ualentior quæq; materia est: eo minus facile concoquatur: sed si concocta est, plus alit. Itaq; utendum est materiæ genere pro uiribus: modusq; omnibus pro genere sumendus. Ergo imbecillis hominibus rebus infirmis opus est. mediocriter firmos media materia optime sustinet. et robustis apta, ualidissima est. Plus deinde aliq; assumere ex lenioribus potest, magis in his quæ ualentissima sunt, temperare sibi debet.

Quæ natura, ac proprietas cuiusq; rei sit, quæ uescimur.

Caput. XVIII.

Eq; hæc solo discrimina sunt: sed etiã aliæ res boni succi: aliæ mali sunt: quas ὀχράδα, uel ὀνόχραδα græci uocant. Aliæ lenes, aliæ acres: aliæ crassiorem pituitam in nobis faciunt, aliæ tenuiorē: aliæ idoneæ sunt stomacho: aliæ alienæ sunt. Itemq; aliæ inflant: aliæ ab hoc absunt. aliæ calefaciunt: aliæ refrigerant: aliæ facile in stomacho accipiunt: aliæ non facile intus corrumuntur. aliæ mouent aluum: aliæ supprimunt. aliæ citant urinam: aliæ tardant. Quædam somnum mouent: quædam sensus excitant. Quæ omnia ideo noscenda sunt, quoniã aliud aliter, uel corpori, uel ualitudini conuenit.

Quæ res boni succi sint. Caput. XIX.

Omni succi sunt triticum, siligo, alia, oriza, amilū. Itē et lenes sunt, et stomacho aptæ: et calefaciunt iragum, ptisanæ, lac, caseus mollis, omnis uenatio, omnes aues, quæ ex media materia sunt. Ex maioribus quoq; hæc, quas supra nominauimus. Mediū inter teneros, durosq; pisces, ut mulus, et lupus, uerna, lactuca, uertica, malua, cucumis, cucurbita, ouū sorbile, portulaca, cochlea, palmula. ex pomis quodcunq; neq; acerbum, neq; acidū est. Vinum dulce uel lene, passum, de frutum: olea quæ ex his duobus in alterutro seruata sunt: uulua, rostra, trunculiq;. In summa omnis pinguis caro, omnis glutinosa, omne iecur.

d ij

LIBER

Quæ res mali succi sint. Caput. XX.

m Ali uero succi sunt milium, panicum, hordeum, legumi-
na, caro domestica per macra, omnisq; caro salsa, omne
falsamentum, garum: uetus caseus, cicer, radícula, rapa, napi,
bulbi, brassica: magisq; et cyma eius, asparagus, beta, ci-
cumis, porrum, eruca, nasturcium, thymum, nepeta, satyria, hyssopum,
ruta, anethum, feniculum, cuminum, anesum, lapatium, sinapi, et
allium, cepa, lienes, renes, intestina, pomum quodcumq; acidum, uel acer-
bum est: acetum, omnia acria, acida, acerba, oleum: pisces quoq; saxa-
tiles, omnesq; qui ex tenerrimo genere sunt: aut hi qui rursus nimium
duri: uirosiq; sunt: ut ferè quos stagna, lacus, limosi uel riuus ferunt:
qui uel in nimiam magnitudinem excesserunt.

Quæ res lenes: quæ uel acres sint. Caput. XXI.

l Enes autem sunt sorbitiones, pulticula, laganum, amilum,
ptisana, pinguis caro, et quæcumq; glutinosa est. Quod
ferè quidem in omni quæ domestica fit: præcipue tamen
in ungulis, trunculisq; suum: in pectiolis, capitulisq; he-
dorum, et uitulorum, et agnorum: omnibusq; cerebellis. Item si qui
proprie bulbi nominantur: lac, defrutum, passum, nuclei pinei. Acria
sunt omnia nimis austera: omnia acida, omnia salsa, et mel quidem
quo melius est: eo magis. Item allium, cepa, eruca, ruta, nasturcium, cu-
cumis, beta, brassica, asparagus, sinapi, radícula, intubus, ocymum, la-
ctuca, maximaq; olerum pars.

Quæ res crassiorè, quæ uel tenuiorem pituitam faciunt. Caput. XXII.

c Crassiorè autem pituitam faciunt omnia sorbilia, alia, ori-
za, amilum, ptisana, lac, bulbi, omniaq; ferè glutinosa.
Ex tenuant eandem omnia salsa, atq; acria, et acida.

Quæ res stomacho idoneæ sunt. Caput. XXIII.

s Stomacho autem aptissima sunt quæcumq; austera sunt:
et quæ acida sunt: quæq; contacta sale modico sunt. Item
panis sine fermento, et elota alia, uel oriza, uel ptisana:
omnis auis, omnis uenatio, atq; utraq; uel assa, uel elixa.
Ex domesticis animalibus bubula. Si quid ex cæteris sumitur, macrum
potius,

potius, quàm pingue. Ex sue ungulæ, rostræ, aures, vuluæ, sterilesq̃.
Ex oleribus intubus, lactuca, pastinaca, cucurbita elixa, si fer. Ex po-
mis cerasium, morum, sorbum, pirũ fragile, quale crustuminum uel
neauianum est. Item pira quæ reponuntur taretina, atq̃ signina. Ma-
lum orbiculatum, aut scandianum, uel amerinum, uel cotoneũ, uel pu-
nicum absinthium. Vuæ ex olla, molle ouum, palmulæ, nuclei pinei,
olea albæ ex dura muria, eadem aceto intinctæ, uel nigræ, quæ in ar-
bore bene permaturuerũt: uel quæ in passo, de fructu ac seruata sunt.
Vinum austerum, licet iam asperum sit: item resinatum. Duri ex me-
dia materia pisces, ostrea, pectines, murices, purpuræ, cochleæ, cibi, poti-
onesq̃: uel frigida, uel feruentes, absinthium.

Quæ res alienæ stomacho sunt. Caput. XXIII.

Liena uero stomacho sunt omnia tepida, omnia salsa, om-
nia iurulenta, prædulcia, omnia pingua, sorbito, panis,
itemq̃: uel ex milio, uel ex hordeo, oleum, radices olerũ,
et quodcunq̃ olus ex oleo, garo uel estur: mel, mulsum, de-
frutum, passum, lac, omnis caseus, una recens, ficus & uiridis, & ari-
da, legumina omnia, quæq̃ inflare consueuerunt. item thymum, nepe-
ta, satyria, hyssopum, nasturtium, lapatium, lapsanum, iuglandes. Ex
his autem intelligi potest non quicquid boni succi est, protinus stomacho
conuenire: neq̃ quicquid stomacho conuenit, protinus boni succi esse.

Quæ inflant, aut inflationem leuant. Caput. XXV.

Inflant autem omnia ferè legumina, omnia pingua, om-
nia dulcia, omnia iurulenta, mustum, atq̃ etiam id uinũ,
cui nihil adhuc ætatis accessit. Ex oleribus alium, cepa,
brassica, omnesq̃ radices excepto sifere & pastinaca:
bulbi, ficus etiam arida, sed magis uirides: una recentes, nuges omnes
exceptis nucleis pineis: lac, omnisq̃ caseus, quicquid deinde subcrudũ
aliquis assumpsit. Minima inflatio fit ex uenatione, aucupio, piscibus,
pomis, oleis, conchilijs, ouis uel mollibus, uel sorbilibus, uino uetere. Fœ-
niculum uero, & anetum inflationes etiam leuant.

Quæ res aut calefaciunt, aut refrigerant. Caput. XXVI.

Calefaciunt piper, sal, caro omnis iurulenta, alliũ, cepa,
ficus arida, salsamentum, uinum, & quo meracius est, co-
Aurelij Cor. d iij

LIBER

magis refrigerant olera, quorum crudi caules assumuntur, ut intubus, & lactuca. Item coriandrū, cucumis, elixa cucurbita, beta, mora, cerasia, mala austerā, pira fragilia, caro elixa, præcipueq; acetū, siue cibis ex eo, siue potio assumitur.

Quæ res intus facile uitiuntur, uel minime corrumpuntur.

Caput. XXVII.

Acile autem intus corrumpuntur panis fermentatus, & f quisquis alius, quàm ex tritico est: lac, mel, ideoq; lactantia, atq; omne pistoriū opus, teneri pisces, ostrea, olera, ca seus & recens, & uetus, crassa uel tenera caro, uinū dulce, mulsum, defrutum, passum, quicquid deinde uel iurulentum est, uel nimis dulce, uel nimis tenue. At minime intus uitiuntur, panis sine fermento, aues, et eæ potius duriores, aurati pisces, neq; solū aurata pira, aut scarus, sed etiā loligo, locusta, polypus. Item bubula, omnisq; dura caro, eademq; aptior est si macra, si salsa est. omniaq; salsamenta, cochleæ, murices, purpuræ, uinum austerum, uel resinatum.

Quæ res aluum mouent. Caput. XXVIII.

T aluum mouent panis fermentatus, magisq; si cibarius, a uel hordeaceus est. brassica, si subcruda est lactuca, anethum, nasturtium, ocymum, urtica, portulaca, radícula, capparis, allium, cepa, malua, lapatium, beta, asparagus, cucurbita, cerasia, mora, uua, omnia mitia, ficus etiam arida, sed magis uiridis, uue recentes pingues, minutæ aues, cochleæ, garum, salsamenta, ostrea, pelorides, echini, muscoli, & omnes fere conchule, maximeq; ius earū, saxatiles, & omnes teneri pisces, sepiarū atramentum: si qua caro assumitur pinguis, eadem uel iurulentā, uel elixa: aues quæ natant, mel crudū, lac, lactantia omnia, mulsum, uinum dulce, uel salsum, aqua, tenera omnia tepida, dulcia, pingua, elixa iurulenta, salsa, diluta.

Quæ res aluum astringunt. Caput. XXIX.

Contra astringunt panis ex siliigne, uel ex simila, magis c si sine fermento est: magis etiam si ustus est: intenditurq; uis eius et si bis coquitur. pulticula uel ex halica, uel ex panico, uel ex milio. itaq; ex hisdem sorbitio, & magis

si hæc ante fricta sunt. lenticula, cui uel beta, uel intubus, uel ambubeia, uel plantago adiecta est, magisq; et si illa ante fricta est: per se etiam intubus uel ex plantagine, uel ambubeia fricta: minuta olera, brassica bis decocta, dura oua, magisq; si assa sunt: minuta aues, merula, palumbus, magisq; si in posca decoctus est: graues quoq; aues, quæ magis currunt, quam uolant: lepus, caprea, iecur ex his, quæ seui habent, maximeq; bubulum, ac seuium ipsum, aseus: qui uehementior uetustate fit, uel ea mutatione quam in caseo transmarino uidemus: aut si recens est ex melle, mulso uel decoctus. Itē mel coctum, pira immatura, sorba, magisq; ea: quæ torminalia uocantur, mala cydonia, et punica, oleæ uel albæ, uel permaturæ, myrti, palmulæ purpureæ, murices, uinum resinatum uel asperum: item meracum, acetum mulsum quod inferbuit: item defrutum, passum, aqua uel tepida, uel præfrigida dura, idest ea quæ tarde putrescit, ideoq; pluuia potissimum: omnia dura, macra, austera, aspera, tosta, et in eadē carne: assa potius, quam elixa.

Ante ad asperum

Quæ res urinam mouent. Caput. XXX.

Urinam aut mouent quæcunq; in horto nascentia boni odoris sunt, ut apium, ruta, anethum, ocymum, menta, hyssopum, anisum, coriandrum, nasturtium, crucca, foeniculum. Præter hæc asparagus, capparitis, nepeta, thymum, satureia, lapsanum, pastinaca, magisq; agrestis, radícula, sifer, cepa. Ex uenatione maxime lepus, uinum tenue, piper et rotundum, et longum, sinapi, absinthium, nuclei pinei.

Quæ res somnum mouent, aut sensus excitant. Caput. XXXI.

Somno uero aptum est papauer, lactuca, maximeq; aestiua, cuius cauliculus iam lacte repletus est: morum, porrum. Sensus excitat nepeta, thymum, satureia, hyssopum, præcipueq; puleium, ruta, et cepa.

Quæ res corpus aut erodant, aut reprimant, aut refrigerent, aut calefaciant, aut durent, aut emolliant. Caput. XXXII.

Vocare uero materiam multa admodum possunt. sed ea quæ ex peregrinis medicamentis maxime constant: alijsq; magis, quam quibus ratione uictus succurritur, optulatur: in præsentia differam. Ponam ea uero quæ propterea his morbis de quibus protinus dicturus sum, apta: corpus erodunt:

d iij

LIBER

Et sic eo quod mali est, extrahunt. Habent autē hanc facultatem se-
 mina eruce, nasturcij, radiculæ præcipue tamē omnium sinapi. Salis
 quoq; et fici eadem vis est. leniter uero simul et reprimunt, et
 molliunt lana succida uel aceto, uel uino: quo oleum adiectum est.
 contrita palmulæ: furfures in salsa aqua, uel aceto decoctæ. At si-
 mul reprimunt et refrigerant herba muralis, parthenium uel perdi-
 cium appellant: serpillum, puleium, ocymum, herba sanguinalis, quam
 græci πολυρόριον uocant: portulaca, papaueris folia, capreoliq; uitiū,
 coriandri folia, hyoscyamū, muscus, sisēr, apiū, solanum, quā σπύλινον
 græci uocant: brassicæ folia, intubus, plantago, fœniculi semen, contrita
 pira uel mala, præcipueq; cydonia, lenticula, aqua frigida maximeq;
 pluuialis, uinum, acetum, et ex horum aliquo magis, madens uel pa-
 nis, uel farina, uel spongia, uel cinis, uel lana succida, uel etiam linteo-
 lum, creta cimolia, gypsum, melinum, myrteum, rosa, acerbum oleum,
 uerbenarū confusa cum teneris caulibus folia: cuius generis sunt olea,
 cupressus, myrtus, lentiscus, tamaris, ligustrum, rosa, rubus, laurus, he-
 dera, punicum malum. Sine frigore autem reprimunt coctæ mala cy-
 donia, malicoriū, aqua calida, in qua uerbenæ coctæ sunt, quas supra
 proposui: puluis uel ex fecē uini, uel ex myrti folijs, amaræ nucs. Ca-
 lesfacit uero ex qualibet farina cataplasma, siue ex tritici, siue ex far-
 ris, siue hordei, siue erui, uel lolij, uel milij, uel panici, uel lenticulæ, uel
 fabæ, uel lupini, uel lini, uel fœni græci, ubi ea deferbuit, calidaq; im-
 posita est. Valentior tamen ad id omnis farina est ex mulso, quam ex
 aqua cocta. Præterea cyprinum, irinum, medulla, adeps ex felle iun-
 cta oleo, magisq; si uetus est: sal nigrum, git, piper, quinq; folium, fe-
 req; quæ uehementer et reprimunt, et refrigerant. Durant quæ ca-
 lesfaciunt, et digerunt, et emolliunt. Præcipueq; ad emolliendum po-
 test cataplasma ex lini, uel fœni græci semine. His autem omnibus et
 simplicibus, et permixtis uarie medici utuntur: ut magis quid quisq;
 persuasit sibi appareat: quàm quid euidenter compererit.

De morborum generibus. Caput. I.

Rouis omnibus, quæ pertinent ad uniuersa genera morborum, ad singulorū curationes ueniam. Hos autem in duas species græci diuiserunt: aliosq; ex his acutos, alios longos esse dixerunt. Idq; quoniam nō semper eodem modo respondebant: eosdem aliq inter acutos, aliq inter longos retulerunt. Ex quo plura eorū genera esse manifestum est. Quidam enim breues utiq; sunt, qui cito uel tollunt hominem: uel ipsi cito finiuntur. Quidam longi, sub q bus neq; sanitas in propinquo, neq; exitium est. Tertiumq; genus eorum est, quā modo acuti, modo longi sunt. idq; non in febribus tantummodo, in quibus frequentissimum est: sed in alijs quoq; fit. Atq; etiam præter hos quartum est, quod neq; acutum dici potest, quia non perimit: neq; utiq; longum, quia si occurrat, facile sanatur. Ego cum de singulis dicam: qui cuiusq; generis sit indicabo. diuidam autem omnes in eos, q in totis corporibus consistere uidentur: Et eos qui oriuntur in partibus. incipiam à prioribus pauca præfatus de omnibus. In nullo quidē morbo minus fortuna sibi uendicare: quam ars potest: ut pote cum repugnante fortuna nihil medicina proficiat. magis tamen ignoscenda medico est parum proficiente in acutis morbis, quam in longis. Hic enim breue spatium est: intra quod, si quod auxilium non profuit: æger extinguitur. ibi Et deliberationi, Et mutationi remediorū tempus patet: adeo ut raro, si inter initia medicus accessit: obsequens æger sine illius uitio pereat. Longus tamen morbus cū penitus insedit: quod ad difficultatem pertinet: acuto par est. Et acutus quidē quo uetustior est: longus autem quo recentior: eo facilius curatur. Alterū illud ignorari non oportet: quod non omnibus ægris eadem auxilia conueniunt. ex quo incidit, ut alia, atq; alia summi authores quasi sola uendicarent: prout cuiq; æsserant. Oportet itaq; ubi aliquid non respondit, non tanti putare authore, quanti ægrū: Et experiri aliud, atq; aliud: sic tamen, ut in acutis morbis cito mutetur, quod nihil prodest: in longis, quos tempus ut facit, sic etiam soluit: non statim condemnatur, si quid non statim profuit. minus uero remoueatur, si quid paulum sat teminat: quia profectus tempore expletur.

Alu. h. d. d. d. d.
1

Ans. et fortuna.
gal. 1. et 2. d. d. d.

LIBER

Quomodo morbi cognoscantur: Et an incrementum, an consistant, an minuantur: Et quâ ratione ab initio qui languere incipit, curari debeat, Caput. II.

Rotinus aut inter initia scire facile est, quod acutus morbus, quis longus sit: non in his solis, in quibus semper ita se habet: sed in his quoque in quibus variat. Nam ubi sine intermissionibus accessiones, et dolores graues urgent: acutus morbus est. Vbi lenti dolores, lentæ uel febres sunt: et spacia inter accessiones porriguntur: acceduntque ea signa, quæ in priore uolumine exposita sunt: longum hunc futurum esse manifestum est. Videndum est est morbus an incrementum, an consistat, an minuat: quia quædam remedia incrementibus morbis, plura inclinantibus conueniunt. eaque quæ decrescentibus apta sunt, ubi acutus incrementum urget: in remissionibus potius experienda sunt. Incrementum autem morbus dum grauioribus dolores, accessionesque ueniunt: hæcque et antequam proxime reuertatur: et postea desinunt. Atque in longis quoque morbis etiam tales notas non habentibus, scire licet incrementum: si somnus incertus est, si deterior concoctio, si foediores deiectiones, si tardior sensus, si pigrior mens, si percurrit corpus frigus, aut calor, si idem magis pallet: ea uero quæ contraria his sunt: decedentis eius notæ sunt. Præter hæc in acutis morbis serius ager alendus est: nec nisi iam inclinatis, ut primo dempta materia, impetum frangat. in longis maturius, ut sustinere spatium aduenturi mali possit. Ac si quando is non in toto corpore, sed in parte est: magis tamen ad rem pertinet uim totius corporis molliri, quam proprie partes egre sanentur. Multum etiam interest ab initio, quis recte curatus sit, an perperam. quia curatio minus his prodest: in quibus assidue frustra fuit. si quis, temere habitus adhuc integris uiribus uiuit: admota curatione momento restituitur. sed cum ab his coeperim, quæ notas quasdam futuræ aduersæ ualitudinis exhibent: curationum quoque principium ab animaduersione eiusdem temporis faciam. igitur si quid ex his, quæ proposita sunt incidit: omnium optima sunt quies, et abstinentia. si quid bibendum, aqua idque interdum uno die fieri satis est. Interdum si terrentia manent, bi-duo, proximèque abstinentiâ sumendus est cibus exiguus: bibenda aqua: postera die etiam uinum. deinde inuicem alternis diebus, modo aqua, modo uinum, donec omnis causæ metus finiatur. Per hæc. n. sæpe instans grauis morbus discutitur: plurimique falluntur, dum se primo die protinus sublaturus languorem aut exercitatione, aut balneo, aut coacta deiectione, aut uomitu, aut sudationibus, aut uino sperant. non quo non

Morbus acutus est.

Morbus longus est.

Nutritus in morbo.

interdum id incidat, aut non decipiat: sed quo sepius fallat, solâq; abstinentia sine ullo periculo medeat. cū præsertim et pro modo terro-
 roris moderari liceat, et si leuiores inditia fuerint: satis sit à uino
 tātum abstinere: quod subtractū plusquam, si cibo quid dematur: ad-
 iuuat. si paulo grauiora, satis sit non aquam tantū bibere, sed etiā
 cibo carnem subtrahere. interdū panis quoq; minus, quā pro consue-
 tudine assumere: humidoq; cibo esse contentum, et olere potissimum. sa-
 tisq; sit, tum ex toto à cibo, à uino, ab omni motu corporis abstinere: cū
 uehementer notæ terruerunt. Neq; dubium est, quin uix quisquam, qui
 non dissimulauit, sed per hæc mature morbo occurrat: egrotet.

De febrium generibus, Caput. III.

Tq; hæc quidem sanis faciendæ sunt tantū causam me-
 tuentibus. sequitur uero curatio febriū: quod et in toto
 corpore, et uulgare maxime morbi genus est. Ex his una
 cotidiana, altera tertiana, altera quartana est. Interdum
 etiam longiore circuitu quedā redeunt. sed id raro euenit. In prio-
 ribus et morbi sunt, et medicinæ. At quartanæ quidē simpliciores
 sunt: incipiunt ferè ab horrore, deinde calor erumpit: finitaq; febre
 biduum integrum est. ita quarto die reuertitur. Tertianarū uero duo
 genera sunt: alterū eodem modo, quo quartana et incipiens, et desi-
 niens, illo tantum interposito discrimine, quod unum diem præstat in-
 tegrum: tertio redit. Alterum longe perniciosius, quod tertio quidem
 die reuertitur: ex octo autem, et quadraginta horis ferè, sex, et tri-
 ginta per accessionem occupat: interdum etiā uel minus, uel plus. neq;
 ex toto in remissione desistit: sed tantum leuius est. id genus pleriq; ma-
 dici in uisitatū appellat. cotidiane uero uariæ sunt, et multiplices.
 Aliæ enim protinus à calore incipiunt, aliæ à frigore, aliæ ab horro-
 re. Frigus uero ubi extremæ partes mēbrorū malgescunt: horrore ubi
 totū corpus intremat. Rursus aliæ sic desinunt, ut ex toto sequatur in-
 tegritas. aliæ sic, ut aliquantū quidem minuat ex febre: nihilomi-
 nus tamen quedā reliquiæ remaneant, donec altera accessio accedat:
 ac sepe aliæ uix quicquā aut nihil remittant: sed ita ut continuent.
 Deinde aliæ feruore ingentem habent, aliæ tollerabilem: aliæ cotidie
 pares fiunt, aliæ impares. atq; inuicem altero die leniores, altero ue-
 hementiores: aliæ tempore eodem postridie reuertuntur. aliæ uel se-
 rius, uel celerius: aliæ diem, noctemq; accessionem, et decessionem
 implent: aliæ minus, aliæ plus: aliæ cum decedunt sudorem mo-
 uent: aliæ non mouent. atque aliās per sudorem ad integritatem

abstinentia

Feb. quartana

Tertiana

Quotidianæ

uenitur: aliis corpus tantum imbecillius redditur. Accessiones etiam modo singula singulis diebus fiunt: modo binæ, plures uel concurrunt. ex quo sæpe euenit ut cotidie plures accessiones, remissionesq; sint: sic tamen ut una quæq; alicui priori respondeat. Interdum uero accessiones quoq; confunduntur sic, ut neq; notari tempora earum, neq; spacia possint. Neq; uerum est quod dicitur à quibusdam, nullam febrem inordinatam esse, nisi aut ex uomica, aut ex inflammatione, aut ex ulcere. facilius enim semper curatio foret: si hoc uerum esset. Sed quod euidentes causæ faciunt: facere etiam abditæ possunt. neq; de re, sed de uerbo controuersiam mouent. qui cum aliter, aliterq; in eodem morbo febres accedant: non easdē inordinate redire: sed alias, aliasq; subinde oriri dicunt. quod tamen ad curandi rationem nihil pertineret: etiā si uere diceretur. Tempora quoq; remissionum modo liberalia, modo uix ulla sunt.

De curationum diuersis generibus, Caput. IIII.

T februm quidem ratio maxime talis est. Curationum uero diuersa genera sunt: prout authores aliqui habent. Asclepiades officium esse medici dicit, ut tuto, ut celeriter, ut iocunde curet. id notum est: sed ferè periculosa esse nolumus et festinatio, et uoluptas solet. qua uero moderatione utendū sit: ut quantum fieri potest, omnia ista contingant: prima semper habita salute in ipsis partibus curationum considerandū erit. et ante omnia queritur, primis diebus æger qua ratione continendus sit. Antiqui medicamentis quibusdam datis, concoctionem moliebantur: eo quod cruditatē maxime horrebant, deinde eam materiam, quæ lædere uidebatur: ducendo sæpius aluum subtraherant. Asclepiades medicamentā sustulit: aluum non toties, sed ferè tamen in omni morbo subduxit. febre uero ipsa præcipue se ad eius remediū uti professus est. Conuellēdas enim uires ægri putauit, luce, uigilia, siti ingenti, sic, ut ne os quidem primis diebus elui sineret. Quo magis fallūtur qui per omnia iocundam eius disciplinam esse contendunt: et is enim ulterioribus quædam diebus cubantis etiam luxuriæ subscripsit: primis uero tor toris uicem exhibuit. Ego autem medicamentorum dari portiones, et aluū duci non nisi raro debere concedo. et id non ideo tamen agendum, ut ægri uires conuellantur existimo: quoniam ex imbecillitate summum periculum est. minui ergo tantum materiam superantem oportet, quæ naturaliter digeritur: ubi nihil noui accedit. Itaq; alimenndus à cibo primis diebus est: in luce habendus æger, nisi infirmus interdū est. quo-

for 1/2

Ma in munda

nam corpus ista quoque digerit: isque cubare quam maximo conclavi debet. Quod ad sitim uero somnumque pertinet: moderandum est, ut interdum uigilet: noctu, si potest, conquiescat. ac neque potest: neque nimium siti crucietur. Os etiam eius elui potest, ubi et si autem est, et ipsi fauces tet. quantum id tempus aptum potioni non est. Commodeque Erasistratus dixit saepe inferiore parte humorem non requirente, os, et fauces requirere: neque ad rem male haberi aegrum pertinere. Ac primo quidem sic tenendus est. Optimum uero medicamentum est, opportune cibibus datus: qui quando primum dari debeat: queritur. Plerique ex antiquis tarde dabant: saepe quinto die, saepe sexto. Et id fortasse uel in Asia, uel in Aegypto caeli ratio patitur. Asclepiades ubi aegrum tri-duo per omnia fatigarat: quarto die cibo destinabat. At Themison nusper non quando coepisset febris: sed quando desisset, aut certe leuata esset, considerabat: et ab illo tempore expectato die tertio, si non accesserat febris, statim: si accesserat, ubi ea uel desierat: uel si assidue inhaerebat: si certe se inclinauerat, cibum dabat. Nihil autem horum utique perpetuum est. Nam potest primo die primus cibus datus esse: potest secundo: potest tertio: potest non nisi quarto: aut quinto: potest post unam accessionem: potest post duas: potest post plures. Refert enim qualis morbus sit: quale corpus: quale coelum: quae aetas: quod tempus anni. minimeque in rebus multum inter se differetibus quod intermit-tendum non est. perpetuum esse preceptum temporis potest. In morbo, qui plus uirium aufert: celerius cibus dandus est. itemque eo caelo, quo magis digerit. Ob quam causam in Africa nullo die aeger abstinere recte uidetur. Maturius est puero, quam iuueni: aestate, quam hyeme dari debet. Vnum illud est, quod semper ubique seruandum est: ut aegri uires subinde assidens medicus inspiciat: et quandiu supererunt, abstinentia pugnet: si imbecillitatem uereri coeperit, cibo subue-niat. Id enim eius officium est, ut aegrum neque supernuacua materia one-ret: neque imbecillitatem fami prodat. Idque apud Erasistratum quoque inuenio: qui quantum parum docuit quando uenter, quando corpus ip-sum exinaniretur, dicendo tamen haec esse uisenda: et tum cibum dan-dum, cum corpori deberetur: satis ostendit dum uires superessent, dari non oportere: ne deficerent: consulendum esse. Ex his autem intelligi po-
test ab uno medico multos non posse curari: cumque, si artifex est: idom-
neum esse, qui non multum ab aegro recedit, sed qui questui serui-
unt, quoniam is maior ex populo est, libenter amplectuntur ea prae-
cepta: quae sedulitatem non exigunt: ut in hac ipsa re. Facile est enim
dies uel accessiones numerare his quoque, qui aegrum raro uident. ille
assideat necesse est: qui, quod solum opus est, uisurus est: quando nimis

typs ab-...

for 1/2

LIBER

Soll. 2/24
De diebus febribus habant.
An quidam ags.

imbecillus futurus sit, nisi cibum acceperit. In pluribus tamen ad initium cibi dies quartus aptissimus esse consuevit. Est autem alia etiam de diebus ipsis dubitatio, quoniam antiqui potissimum impares sequebantur: eosque, tanquam tunc de ægris iudicaretur, ut ipsi mos nominabant. Hi erant dies tertius, quintus, septimus, quartusdecimus, vigesimus primus: ita ut summa potentia septimo, deinde quartodecimo, deinde uni et vigesimo daretur. Igitur sic ægros nutriebant: ut die rum imparium accessiones expectarent. deinde postea cibū quasi leuioribus accessionibus instantibus darent: adeo ut Hippocrates si alio die febris desisset: recidivam timere sit solitus. Id Asclepiades in re ut uanū repudiavit. neque in ullo die ga par, imparue esset: his uel maius, uel minus periculum esse dixit. Interdū enim peiores dies pares fiunt: et oportunius post eorum accessiones cibus datur. Nonnunquam etiā in ipso morbo dierum ratio mutatur: sitque grauior, qui remissior esse consueuerat. atque ipse quartusdecimus par est: in quo esse magnā uim antiqui fatebantur. Qui cum octauum primi naturam habere contemderent, ut ab eo secundus septenarius numerus inciperet: ipsi sibi repugnabant non octauum, neque decimum, neque duodecimum diem sumendum, quasi potentiorē. Plus enim tribuebant nono, et undecimo. Quod cum fecissent sine ulla probabili ratione: ab undecimo non ad tertium decimum, sed ad quartumdecimum transibant. Est etiam apud Hippocratem ei, quem septimus dies liberaturus sit: quartum esse grauiissimum. Ita illo quoque authore in die pari et grauior febris esse potest: et certa futuri nota. Atque idem alio loco quartum queneque diem, ut in utrumque efficacissimum apprehendit: id est quartum, septimum, undecimum, quartumdecimum, decimum septimum, in quo et ab impari ad paris rationem transit. et ne hoc quidem propositum conseruauit, cum à septimo die undecimus non quartus sed quintus sit. adeo apparet quacunque ratione ad numerū respeximus: nihil rationis sub illo quidem authore reperiri. Verū in his quidē antiquos tunc celebres ad modum pythagorici numeri fefellerunt: cū hic quoque medicus non numerare dies debeat: sed ipsas accessiones intueri: et ex his coniectare quando dandus cibus sit. Illud autem magis ad rem pertinet scire: num oporteat dari cum iam bene uenæ conquieuerunt: aut etiā num manentibus reliquijs febris. Antiqui enim quā integerrimis corporibus alimētum offerebant. Asclepiades inclinata quidem febre, sed adhuc tamen inherente. in quo unam rationem secutus est: non quo non sit interdum maturius cibus dandus, si mature timetur altera accessio: sed quo scilicet quā sanissimo dari debeat. Minus enim corrumpitur quod integro corpori infertur. Neque tamen uanum est

In 2 feb. ab eo

quod Themisoni videbatur, si duabus horis integer futurus esset aeger: satius esse tunc dare: ut ab integro corpore potissimum diduceretur. Nam si diduci tam celeriter posset: id esset optimum. Sed cum hoc breue tempus non praestet: satius esse principia cibi a decedente febre, quam reliquias ab incipiente excipi. ita si longius tempus secundum est, quam integerrimo datus est: si breue, etiam antequam ex toto integer fiat. Quo loco uero integritas est, eodem est remissio: si qua maxime in febre continua potest esse. Atque hic quoque queritur utrum tot horae expectandae sint, quot febrem habuerunt: an satis sit primam partem earum praeteriri, ut aegris iocundius insidat, quibus interdum non ualet. Tutissimum est autem ante totius accessionis tempus praeterire. quantum ubi longa febris fuit: potest indulgeri aegro maturius: dum tamen ante minime pars dimidia praetereatur. Idque non in ea sola febre, de qua proxime dictum est: sed in omnibus ita seruandum est.

De febrium speciebus, et singularum curationibus, et primo quando abus febricitantibus dandus sit. Caput. V.

Aec magis per omnia genera febrium perpetua sunt: nunc ad singulas earum species descendam. Igitur si semel tantum accessit, deinde desit: eaque uel ex inguine, uel ex lassitudine, uel ex aestu, aliaue simili re fuit sic, ut interior nulla causa metum fecerit: postero die cum tempus accessionis ita transijt, ut nihil mouerit: abus dari potest. At si ex alto calor uenit: et grauitas uel capitis, uel praecordiorum secuta est: neque apparet quid corpus confuderit, quantum unam accessionem secuta integritas est: tamen quia tertiana timeri potest, expectandus est dies tertius: et ubi accessionis tempus praeterijt, abus dandus est, sed exiguus, quia quartana quoque timeri potest. Et die quarto demum: si corpus integrum est: eo cum fiducia utendum. Si uero postero, tertio uel, aut quarto die secuta febris est: scire licet morbum esse. Sed tertianarum, quartanarumque, quarum certus circuitus est: et finis integer: et quia liberaliter quietata tempora sunt: expeditior ratio est. De quibus suo loco dicam. Nunc uero eas explicabo, quae cotidie urgent. Igitur tertio quoque die abus aegro commodissime datur: ut alter febrem minuat: alter uiribus subueniat. sed his dari debet si quotidiana febris est, quae ex toto desinat: simul atque corpus integrum factum est: si, quantum non accessiones, febres tamen iunguntur: et cotidie quidem incrementum: sed sine integritate tamen remittunt: cum corpus ita se habet, ut maior

feb. et ca. r. h. a. n. d.

LIBER

remissio non expectetur. Si altero die grauior: altero leuior accessio est post grauiorem. ferè uero grauiorem accessionem leuior nox sequitur. quo fit ut grauiorem accessionem nox quoq; tristior antecedit. At si continuatur febris: neq; leuior unquam fit: & dari cibum necesse est: quando dari debeat, magna quidem dissensio est. Quidam, quia ferè remissius matutinum tempus ægris est: tunc putant dandū. quod si respondet, non quia mane est: sed quia remissior est æger: dari dabet. Si uero ne tunc quidem ulla requies ægris est: hoc ipso peius id tempus est: quod cum sua natura melius esse debeat: morbi uitio non est. simulq; insequitur tempus meridianū: à quo cum omnis æger ferè peior fiat: timeri potest ne ille magis etiam quàm ex consuetudine urgeatur. Igitur alij uespere tali ægro cibum dant. sed cum eo tempore ferè pessimi sint, qui ægrotant: uerendum est, ne si quid tunc mouerimus: fiat aliquid asperius. Ob hæc ad mediam noctem decurro: idest finito iam grauissimo tempore, eodemq; longissime distante: secuturus uero ante lucanis horis, quibus omnes ferè maxime dormiunt: deinde matutino tempore, quod natura sua leuissimum est. Si uero febres uagæ sunt: quia uerendum est: ne cibum statim subsequantur: quandoq; quis ex accessione leuatus est: hunc debet assumere. At si plures accessiones eodem die ueniunt: considerare oportet, pares ne per omnia sint: quod uix fieri potest: an impares. Si per omnia pares sunt: post eam potius accessionem cibus dari debet: quæ non inter meridiem, & uesperum desinit. Si impares sunt: considerandum est quo distent. Nam si altera grauior, altera leuior est: post grauiorem dari debet. si altera longior, altera breuior: post longiorem. si altera grauior, altera longior est: considerandum est utra magis affligat: illa ui, an hæc tempore: & post eam dandus est. Sed planè plurimum interest: quantæ: qualesq; inter eas remissiones sint. Nā si post alteram febrem motio manet: post alteram integrum corpus est: integro corpore cibo tempus aptius est. Si semper febricula manet: sed alterum tamen longius tempus remissionis est: id potius eligendum est: adeo ut ubi accessiones continuantur, protinus inclinata priore dāus cibus sit. Et enim perpetuū est, ad quod omne cōsiliū dirigi potest: cibum quàm maxime semper ab accessione futura reducere: & hoc saluo dare quàm integerrimo corpori. quod non inter duas tantum, sed etiam inter plures accessiones seruabitur. sed cū sit aptissimū tertio quoq; die cibum dare: tamē si corpus infirmum est, cotidie dandus est: multaq; magis si continentes febres sine remissione sunt: quanto magis corpus affligunt: aut si duæ, pluresue accessiones eodē die ueniunt. Quæ res effiat, ut & à primo die protinus

*ipsa autem
matutinum
noctem
meridiem*

hinc a

die protinus cibus dari cotidie debeat. Si protinus uenæ conciderunt: & sæpius eodem die, si inter plures accessiones subinde uis corpori deest. Illud tamen in his seruandū est: ut post eas febres minus cibi deatur, post quas, si per corpus liceret, omnino non daretur. Cum uero febris instet, incipiat, augeatur, consistat, decedat, deinde in decessione consistat, aut finiatur: scire licet optimum cibo tempus esse febre finita. deinde cum decessio eius consistit. tertium si necesse est, quandoque decedit, cætera omnia periculosa esse. Si tamen propter infirmitatem necessitas urget, satius esse consistere iam incremento febris aliquid offerre: quàm increscente. Satius esse instante, quàm incipiente: cum eo tamen ut nullo tempore is qui deficit, non sit sustinendus. Neque hercule satis est ipsas tantum febres medicum intueri: sed etiam totius corporis habitum: & ad eum dirigere curationem, seu super sunt uires, seu defunt: seu quidā mali affectus interueniunt. Cum uero semper aegros securos agere conueniat, ut corpore tantum, non etiam animo laborent: tum præcipue ubi cibum sumpserunt. Itaque si qua sunt quæ exasperatura eorum animos sunt: optimum est eadem ægotantium noticiæ subtrahere. si id fieri non potest: sustinere tamen post cibum usque somni tempus, & cum experfecti sunt, tunc exponere.

Spa febris

Quando potiones febricitantibus dari expediat. Caput. VI.

Ed de cibo facilior quidem cum aegris ratio est: quorum sæpe stomachus hunc respuit: et si mens concupiscit. De potione uero ingens pugna est: eoque magis, quo maior febris est. Hæc enim sitim accendit: & tum maxime aqua exigit, cū illa periculosissima est. Sed docendus æger est ubi febris conqueuerit, protinus sitim quoque quieturam: longioremque accessione fore, si quod ei datum fuerit alimentum. ita celerius eum desinere sitire qui non bibit. Necesse est tamen quanto facilius etiam sani famem, quàm sitim sustinent: tanto magis aegris in potione, quàm in cibo indulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet: nisi subito sic uenæ conciderunt, ut cibus quoque dari debeat. Secundo uero, cæterisque etiam quibus cibus non dabitur: tamen si magna sitis urgebit, potio dari potest. Ac ne illud quidē ab Heraclide Tarētino dictum ratione caret: ubi aut bilis ægrum, aut cruditas male habet: expedire quoque per modicas potiones misceri nouam materiam corruptæ. illud uidendum est, ut qualia tempora cibo leguntur: talia potioni quoque, ubi sine illo datur, delignantur: aut cum ægrum dormire cupimus. quod ferè sitis prohibet. Satis autem conuenit, cum omnibus febricitantibus

Aurelij Cor.

e

LIBER

nimus humor alienus sit: tum præcipue esse foeminis, quæ ex partu in febres inciderunt. Sed cū tempora cibo, potioniq; febris et remissio- nis ratio det: non est expeditissimū scire, quādo æger febricitet: quan- do melior sit: quando deficiat: sine quibus dispensari illa non possunt. Venis enim maxime credimus fallacissimæ rei: quia sæpe istæ lenio- res, celerioresue sunt & ætate, & sexu, & corporū natura. Et ple- runq; satis sano corpore si stomachus infirmus est: nonnunquam et incipiente febre subeunt, & quiescunt: ut imbecillus is uideri possit, cui facile laturo grauis instat accessio. Contra sæpe eas concitat, & re- soluit sol, balneum, & exercitatio, & motus, & ira, & quilibet alius animi affectus: adeo ut cum primum medicus uenit, sollicitudo ægri dubitantis quomodo ille se habere uideatur: eas moueat. ob quam cau- sam periti medici est, non protinus ut uenit apprehendere manu bra- chium. sed primum residere hilari uultu: percontariq; quemadmo- dum se habeat: & si quis eius metus est, eum probabili sermone leni- re. tum deinde eius corpori manum admoouere. quas uenas autem cōspectus medici mouet: quā facile mille res turbant. Altera res est, cui credimus: calor æque fallax. nā hic quoq; excitatur æstu, labore, somno, metu, sollicitudine. Igitur intueri quidē omnia etiam ista opor- tet. sed his non omnia credere: ac protinus quidem scire non febricitare eum, cuius uenæ naturaliter ordinatæ sunt: teporq; talis est, qua- lis esse sanis solet. Non protinus autem sub calore, motuq; febrem se se concipere: sed ita si summa quoq; arida inæqualiter cutis est: si calor & in fronte est: & ex imis præcordijs oritur. si spiritus ex naribus cum feruore prorumpit: si color aut rubore, aut pallore nouo muta- tus est: si oculi graues, & aut persici, aut subhumidi sunt: si sudor cū fit, inæqualis est: si uenæ non æquis interuallis mouentur. Ob quam causam medicus neq; in tenebris, neq; à capite ægri debet residere: sed illustri loco aduersus eum, ut omneis notis ex uultu quoq; cubantis perspiciat. Vbi uero febris fuit, atq; decreuit: expectari oportet num tempora, partesue corporis aliæ paulum madescant: quæ sudorē uen- turum esse testentur. ac si qua nota est, tunc demum dare potui cali- dam aquam: cuius salubris effectus est, si sudorē per omnia membra diffundit. Huius autem rei causa continere æger sub ueste satis multa manus debet: eademq; crura, pedesq; contegere: quæ male pleriq; ægros in ipso impetu febris, pessimeq; ubi ardens ea est, male habent. Si sudare corpus cœpit, lineum tepescere oportet: paulatimq; singu- la membra detergere. At ubi sudor omnis finitus est: aut si is non ue- nit: ubi quā maxime potuit: idoneus esse cibo æger uidetur: sub ueste leniter ungendus est: tum detergendus: deinde ei cibus dandus. Cibus

al. quidam hanc
deputat malit

autem febricitantius humidus est aptissimus, aut humori certe q̄ pro-
ximus: utiq; ex materia quā leuissima, maximēq; sorbitio. eaq; si
magnae febres fuerunt, quā tenuissima esse debet. Mel quoq; despu-
matum huic recte adiatur: quo corpus magis nutriatur: sed id, si sto-
machum offendit, superuacuum est: sicut ipsa quoq; sorbitio. Dari uero
in uicem eius potest, uel intrita ex aqua calida, uel alia elota. Si fir-
mus est stomachus, & compressa alius: ex aqua mulsā. si uel ille lan-
guet, uel haec profuit, ex posca. Et primo quidē cibo id satis est. secūdo
uero aliquid adici potest: ex eodem tamen genere materie, uel olus,
uel conchilium, uel pomum. Et dum febres quidē increscunt, hic solus
idoneus cibus est. Vbi uero aut desinunt, aut leuantur: semper quidē
incipiendum est ab aliquo ex materia leuissima: adijciendū uero ali-
quid ex media, ratione habita subinde & uirium hominis, & morbi.
Ponendi uero aegro uarij cibi sicut Asclepiades praecepit: tum de-
num sunt, ubi fastidio urgetur: neq; satis uires sufficiunt, ut paulum ex
singulis degustando famē uitet. At si neq; uis, neq; cupiditas deest, nul-
la uarietate sollicitandus aeger est: ne plus assumat, quā concoquat.
Neq; uerum est, quod ab eo dicitur: facilius concoqui cibos uarios. edū-
tur enim facilius. ad concoctionem aut materie genus, & modus per-
tinent. Neq; inter magnos dolores, ut neq; increscente morbo tutū est,
aegrū cibo impleri: sed ubi inclinata iam in melius ualeitudo est. sunt
aliae quoq; obseruationes in febribus necessariae. atq; id quoq; uidendū
est, quod quidam solum praecipunt: an astrictum corpus sit: an pro-
fluat. quorum alterum strangulat quod continet: alterum digerit.
nam si astrictum est, ducenda alius est: mouenda urina, eliciendus
omni modo sudor. in hoc genere morborum sanguinem etiam misisse,
concussisse uehementibus gestationibus, corpus in lumine habuisse, im-
perasse famem, sitim, uigiliam prodest. vtile est etiam ducere in bal-
neum: prius demittere in solium: tum ungere: iterum ad solium redi-
re: multaq; aqua fouere inguina: interdum etiam oleum in solio cum
aqua calida miscere: uti cibo rariū, & serius tenui, simplicia, molli, ca-
lido, exiguo, maximēq; oleribus, qualia sunt, lapatium, urtica, malua,
uel iure etiam concharum, musculorum ue, aut locustarum: neq; danda
cero nisi elixa est. At potio esse debet magis liberalis & ante cibum,
& post hunc: & cum hoc ultra quā sitis coget. Poteritq; à balneo ēē
pinguius, aut dulcius dari uinum. poterit semel, aut bis interponi grā-
cum salsum. Contra uero si corpus profluat, sudor coercendus: quies
adhibenda erit tenebris: somnoq; quandoq; uolet, utendum. non
nisi leui gestatione corpus agitandum: & pro genere mali subuenien-
dum. Nam si uenter fluit: aut si stomachus non continet, ubi febris

Probus febriant

*Probus febriant
abundant*

decreuit, liberaliter oportet aquam tepidā potui dare, & uomere co-
gere: nisi aut fauces, aut prae cordia, aut latus dolet: aut uetus morbus
est. Si uero sudor exercet, duranda cutis est uel nitro, uel sale: quæ cū
oleo miscentur. At si leuius id uitium est, oleo corpus ungendum est: si
uementius, rosa, uel melino, uel myrteo: cū uinum austerum sit adie-
ctum. Quisquis autem fluore æger est: cum uenit in balneum, prius
ungendus: deinde in solium demittendus est. Si in cute uitium est: fri-
gida quoq; quā calida aqua melius utetur. Vbi ad cibum uentum
est: dari debet is ualens, frigidus, siccus simplex, qui quam minime
corrupti possit: panis tostus, caro assa, uinum asperum, uel certe subau-
sterum: si uenter profluit, calidum: si sudores nocent, uomitusq; sunt,
frigidum.

Quomodo pestilentes febres curari debeant. Caput. VII.

d Esiderat etiam propriam animaduersionem in febribus
pestilentiae casus. In hac minime utile est, aut fame, aut me-
dicamentis uti: aut ducere aluum. Si uires sinunt, sangui-
nem mittere optimum est: præcipueq; si cum dolore fe-
bris est. Si id parum tutum est, ubi febris aut tenuata est, aut lenata
est: uomitu pectus purgare. Sed in hoc maturius, quā in alijs mor-
bis ducere in balneum opus est: uinum calidum, & meracius dare,
& omnia glutinosa. inter quæ quoq; carnem generis eiusdem. Nam
quo celerius eiusmodi tempestates corripunt: eo maturius auxilia, etiā
cum quadam temeritate rapienda sunt. Quod si puer est, qui labo-
rat: neq; tantum robur eius est, ut sanguis mitti possit: siti ei utendum
est: ducenda aluus, uel aqua, uel ptisanæ cremore: tum denum is leui-
bus cibis nutriendus. Et ex toto non sic pueri ut uiri curari debent.
Ergo, ut in alio quoq; genere morborum parcius in his agendum est.
Non facile sanguinem mittere, non facile ducere aluum, non cruciare
uigilia, fame uel, aut nimia siti, conuenit. Vomitus post febrem elicien-
dus est: deinde dandus cibus ex leuissimis: tum is dormiat: postero
quoq; die si febris manet, abstineatur. Tertio ad similem cibum re-
deat. Dandaq; opera est quantum fieri potest, ut inter oportunam ab-
stinentiam cibosq; oportunos, omissis cæteris, nutriatur. Si uero ardens
febris extorret: nulla medicamenti danda potio est: sed in ipsis acce-
sionibus oleo, & aqua refrigerandus est: quæ misenda manu sunt, do-
nec albesant: & conclauī tenendus, quo multum, & purum aërem
trahere possit: neq; multis uestimentis strangulandus, sed admodum le-
uibus tantum uelandus est. Possunt etiam super stomachum imponi
folia uitis

folia vitis in aqua frigida tincta. Ac ne siti quidem nimia vexandus est. alendus maturius est: id est à die tertio, & ante cibū. isdē perungendus. Si pituita in stomacho coit: inclinata iam accessione uomere cogendus est: & tunc dandum frigidum olus: aut pomum ex his, quæ stomacho conueniunt. si siccus manet stomachus, protinus uel ptisanæ, uel alicæ, uel orizæ cremor dandus est: cū quo recens adeps coctus sit. Cum uero in summo incremento morbus est: utiq; non ante diem quartum magna siti antecedente, frigida aqua copiose præstanda est, ut bibat et ultra satietatem: & cū iam uenter, & præcordia ultra modū repleta, satisq; refrigerata sunt: uomere debet. Quidā ne uomitū quidem exigunt: sed ipsa aqua frigida, tantū ad satietatem data, pro medicamento utuntur. Vbi utrunlibet factum est: multa ueste operiendus est: & collocandus ut dormiat. Fereq; post longam sitim, & uigiliā, post multam satietatem, post infractum calorem, plenus somnus uenit, per quem ingens sudor effunditur. idq; præsentissimum auxilium est. Sed in his tamen, in quibus præter ardorem nulli dolores, nullus præcordiorum tumor, nihil prohibēs uel in thorace, uel in pulmone, uel in faucibus, non ulcus, non deiectio, non profluium alui fuit. Si quis autem in eiusmodi febre leuiter tussit, is neq; uehementi siti conflictatur: neq; bibere aquam frigidam debet: sed eo modo curandus est quo in cæteris febribus præcipitur.

Curatio semitertianæ febris quæ hemitritæos dicitur. Caput. VIII.

T ubi id genus tertianæ est, quod à uirgatorum medici appellant: magna cura opus est, ne id fallat. Habet enim plerunq; frequentiores accessiones, deaccessionesq; ut aliud morbi genus uideri possit: porrigitq; febris inter horas uiginti quatuor et triginta sex, ut quod idem est: non idem esse uideatur. Et magnopere necessarium est, neq; dari cibum, nisi in ea remissione, quæ uera est: & ubi ea uenit, protinus dari: plurimiq; sub altera tro curantis errore subito moriuntur. ac nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet: tum dari cibum, qui neq; incitet febre: & tamen longum eius spatium sustineat.

Curatio lentarum febrium. Caput. IX.

Nonnunquam etiam lentæ febres sine ulla remissione corpus tenent: ac neq; cibo, neq; ulli remedio locus est. In hoc casu medicū cura esse debet, ut morbum mutet. Fortasse enim curationi

Aurelij Cor.

e iij

LIBER

oportunior fiet. Sæpe igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adiectū, corpus eius per tractandū est. quoniam interdum sic euenit, ut horror oriatur: et fiat initium quoddam noui motus: exq; eo cum magis corpus incaluit: sequatur et remissio. In his frictio quoq; ex oleo, et sale salubris uidetur. at si diu frigus est et torpor, et iactatio corporis, non alienum est in ipsa febre dare mulsi tres, aut quatuor cyathos: uel cum cibo uinum bene dilutum. Intenditur enim sæpe ex eo febris, et maior ortus calor, simul et priora mala tolli: et spem remissionis in ea curatione ostendit. Neq; hercule ista curatione noua est: qua nunc quidam traditos sibi ægros, qui sub ætioribus medicis trahebantur: interdum cōtrarijs remedijs sanant. si quidem apud antiquos quoq; ante Erophilum, et Erasistratum, maximeq; post Hippocratem fuit Petro quidam qui febricitantem hominem ubi acceperat, multis uestimentis operiebat: ut simul calorem ingentem, sitimq; excitaret. Deinde ubi paulum remitti cœperat febris, aquam frigida potui dabat: ac si mouerat sudorem, explicuisse se ægrum iudicabat. si non mouerat, plus etiam aque frigide ingererebat: et tum uomere cogebat. si alterutro modo febre liberauerat: protinus suilla assam, et uinum homini dabat. si non liberauerat: decoquebat aquam sale adiecto, eamq; bibere cogebat, ut mouendo uentrem purgaret. et intra hæc omnis eius medicina erat. eaq; non minus grata fuit his: quos Hippocratis successores non refecerant: quam nunc est his, quos Erophili, uel Erasistrati æmuli diu tractos non expedierunt. Neq; ideo tamen non est temeraria ista medicina: quia plures, si protinus a principijs excipit: intereunt. sed cum eadē omnibus conuenire non possint: fere quos ratio nō restituit: temeritas adiunat. Ideoq; eiusmodi medicini melius alienos ægros, quam suos nutriunt. Sed est circumspecti quoq; hominis et nouare interdū: et augere morbi: et febres accendere: ga curationē, ubi id quod est, nō recipit: potest recipere id, quod futurū est.

Remedia in febribus ad capitis dolorem, et præcordiorum inflammationem, et ariditatem, et siccitatem lingue. Caput. X.

Considerandum etiam est febres ne solæ sint: an alia his quoq; mala accedant. id est num caput doleat: num lingua aspera: num præcordia intēta sint. si capitis dolores sunt, rosam cum aceto miscere oportet, et in id ingerere: deinde habere duo pittacia, quæ latitudine frontis, longitudineq; æquet. Ex his inuicem alterū in aceto et rosa habere, alterum in fronte: aut intinctam hisdem lanam succidam imponere. si acētū offendit, pura

De Capite.

rosa utendum est. Si rosa ipsa laedit, oleo acerbo. si ista parum inuant: teri pōt uel iris arida, uel nuxes amaræ, uel quælibet herba ex refrigerantibus. Quorū quidlibet ex aceto impositum dolorē minuit: sed magis aliud in alio. Iuuat et panis cum papauere iniectus, uel cum rosa, cerussa, spuma uel argenti. Olfacere quoq; uel serpillum, uel anethum non alienum est. At si in præcordiis inflammatio, et dolor est: primo super imponenda sunt cataplasmata reprimentia, ne si calidiora fuerint: plus eò materiæ concurrat. Deinde ubi prima inflammatio se remisit: tunc demum ad calida, et humida ueniendū est: ut ea quæ remanserint, discurrant. Notæ uero inflammationis sunt quatuor, rubor, et tumor cum calore, et dolore. Quo magis errauit Erasistratus, qui febrē nullam sine hac esse dixit. Ergo si sine inflammatione dolor est: nihil imponendum est. Hunc enim statim ipsa febris soluit. At si neq; inflammatio, neq; febris, sed tantum præcordiorum dolor est: protinus calidis, et siccis fomentis uti licet. Si uero lingua siccæ est, et scabra: detergenda primum penicillo est ex aqua calida: deinde ungenda mixtis inter se rosa, et melle. Mel purgat: rosa reprimat: simulq; siccificare non sinit. At si scabra non est, sed arida, ubi penicillo detergata est: ungi rosa debet: cui ceræ sit paulum adiectum.

Remedia contra frigus, quod febrem præcedit. Caput. XI.

Olet et ante febres esse frigus, idq; uel molestissimū morbi genus est. Vbi id expectatur, omni potione prohibendus æger est. hæc enim paulo ante data multum mali adiicit. Item maturius ueste multa tegendus est. admonenda partibus his, pro quibus metumimus, siccæ et calida fomenta, sic, ne statim uehementissimi calores incipiant: sed paulatim accrescant. Perfricandæ quoq; eæ partes manibus unctis ex uetere oleo sunt: eiq; adiiciendum aliquid ex calefacientibus. Contentiq; medici quidam una frictione et ex quolibet oleo sunt. In harū febrū remissionibus nonnulli tres, aut quatuor sorbitionis cyathos etiam nam ultra manente febre dant. deinde ea bene finita reficiunt stomachum cibo frigido, et leni. Ego tum hoc puto tentandum, cum parū cibi semel et post febrem datus prodest. sed curiose perspicendū est, ne tempus remissionis decipiat. Sæpe enim in hoc quoq; genere ualetudinis iam minui febris uidetur: et rursus intenditur. itaq; ei remissioni credendum est: quæ etiam immoratur: et iactationem, factoremq; quendam oris, quem ὄζιν græci uocant, minuit. Illud satis auenit, si cotidie pares accessiones sunt: cotidie paruum cibum dandum. si impares, post grauiorem cibum: post leniorem, aquam mulsam.

ε ιιι

inflamatio

Polis

*lingua arida
et scabra.*

Frigus

LIBER
Curatio horroꝝ in febris. Caput. XII.

Horror
h Orroꝝ autem eas ferè febris antecedit: quæ certū habent circuitum, & ex toto remittuntur. Ideoq; tutissimæ sunt, maximeq; curationes admittunt. Nam ubi incerta tempora sunt: neq; alui ductio, neq; balneum, neq; uinum, neq; medicamentum aliud recte datur. incertū est enim quando febris uentura sit: ita fieri potest, ut si subito uenerit, summa in eo perniciēs sit: quod auxiliij causa sit inuentū. Nihilq; aliud fieri pōt, quā ut primis diebus bene abstineatur æger. deinde sub decessu febris eius, quæ grauissima est: cibūumat. at ubi certus circuitus est: facilius oīa illa tentantur: quia facilius proponere nobis et accessiōnū, & decessiōnū uices possumus. In his autem cum ueterauerunt: utilis famis non est. Primis tantummodo diebus ea pugnandum est: deinde diuidenda curatio est: & ante horroꝝ, tum febris discutienda. Igitur cum primum aliquis inhorruit, & ex horroꝝe incaluit: dare ei oportet potui tepidam aquam subsalsam, & uomere eum cogere. nam ferè talis horroꝝ ab his oritur, quæ biliosa in stomacho resederunt. idem faciendū est, si proximo quoq; circuitu æque cessit: sæpe enim sic discutitur. iamq; quod genus febris sit, scire licet. itaq; sub expectatione proxime accessiōis, quæ instare tertia potest: deducendus in balneum est: dādāq; opera est, ut per tempus horroꝝis in solio sit. si ibi quoq; senserit: nihilominus idem sub expectatione accessiōis quartæ faciat. si quidem eo quoq; modo sæpe id discutitur. si nec balneū quidem profuit: ante accessiōem allium edat: aut bibat calidā aquam cum pipere: si quidem ea quoq; assumpta calorem mouent, qui horroꝝem nō admittit. Deinde eo modo quo in frigore præceptū est: anteq̃ inhorrescere possit, opiatur. Fomentisq; protinus ualidioribus totum corpus circumdare conuenit, maximeq; inuolutis extinctis testis, & titiōibus. Si nihilominus horroꝝ perruperit, multo oleo calefacto inter ipsa uestimenta perfundatur: cui æque ex calefacientibus aliquid sit adiectum. adhibeturq; frictio quantam is sustinere poterit, maximeq; in manibus, & pedibus: & spiritum ipse contineat. neq; desistendum est etiam si horroꝝ est. Sæpe enim pertinacia iuuantis malum corporis uincit. Si quid euomuit, danda aqua tepida: iterumq; uomere cogendus est: utendumq; eiisdē est, donec horroꝝ finiatur. Sed præter hæc, ducenda aluus est, si tardius horroꝝ quiescit: si quidem id quoq; exonerato corpori prodest. Vltima quoq; post hæc auxilia sunt gestatio, & frictio. Cibus autem in eiusmodi morbis maxime dandus est: qui mollem alui præstet. Caro glutinosa, uinum cum dabitur, austerum.

Curatio

Curatio cotidiane febris. Caput. XIII.

h Aec ad omnes circuitus febrü pertinent. discernendæ tñ singulæ sunt: sicut ratione habent dissimilem. si cotidiana est, triduo primo magnopere abstinere oportet: tum cibis altero quoq; die uti. si res inueterauerit, post febrem experiri balneū, & uinum, magisq; si horrore sublato hæc superest.

Curatio tertiane febris. Caput. XIII.

f I tertiana uero, quæ ex toto intermittit, aut quartana est: medijs diebus & ambulationibus uti oportet, alijsq; exercitationibus, & unctionibus. quidam ex antiquioribus medicis Cleophrantus in hoc genere morborum multo ante accessionem caput ægri multa calida aqua perfundebat: deinde uinū dabat. quod quauis pleraq; eius uiri præcepta secutus est Asclepiades, recte tamen præterijt. Est enim anceps ipse, si tertiana febris est: tertio die post accessione dicit aluum duci oportere. quinto post horrorem uomitum elicere. deinde post febrem, sicuti illi mos erat, adhuc calidis dare cibum, & uinum. sexto die in lectulo detineri. sic enim fore ne septimo die febris accedat. Id sæpe fieri posse uerisimile est. Tutius tamen est, ut hoc ipso ordine utamur tria remedia, uomitus, alui ductionis, uini potus per triduum: id est die tertio, & quinto, & septimo tentare. nec uinum nisi post accessionem die septimo bibat. Si uero primis diebus discussus morbus non est: inciditq; in uetustatem, quo die febris expectabitur: in lectulo se contineat: post febrem perfricetur: tum cibo assumpto bibat aquā. postero die, quo cibo uacat, & ab exercitatione, unctioneq; aqua tantum contentus conquiescat. Et id quidem optimum est. Si uero imbecillitas urgebit: & post febrem uinum, & medio die paulum cibi debet assumere.

Curatio quartane febris. Caput. XV.

e Adem in quartana faciendæ sunt. Sed cum hæc tarde ad modum finiatur, nisi primis diebus discussa est: diligentius ab initio præcipiendū est, quid in ea debeat fieri. Igitur si cui cum horrore febris accessit, eaq; desijt: eodem die, & postero, tertioq; cōtinere se debet: & aquā tantūmodo calidam primo die post febrē sumere: biduo proximo quantū fieri pōt ne hanc quidē. si quarto die cum horrore febris reuertitur, uomere

LIBER

sicut ante præceptum est: deinde post febrem modicum cibum sumere, uini quadrantem. Postero, tertioq; die abstinere: aqua tantummodo calida, si sitiet, assumpta: septimo die balneo frigus præuenire: abstinere, continere se debet: et aqua tantummodo calida si sitiet: ac tum ita nono die balneo frigus præuenire: si febris redierit, ducere alium. ubi ex eo corpus conquiuerit, in unctione uehementer perfricari: eodem modo sumere cibum et uinum: biduo proximo se abstinere frictione seruata. decimo die rursus balneum experiri: et si postea febris accessit, æque perfricari. uinum copiosius bibere. ac si proximum est quies tot dierum, ut abstinentia cum cæteris quæ præcipiuntur, febrem tollant. Si uero nihilominus remanet: aliud ex toto sequendum est curationis genus: idq; agendum, ut quod diu sustinendum est, corpus facile sustineat. Quo minus etiam curatio probari Heraclidis Tarentini debet: qui primis diebus ducendâ alium: deinde abstinendû usq; in septimum diem dixit. Quod ut sustinere aliquis possit: tamen etiâ febre liberatus, uix refectio ualebit. adeo si febris sæpius accesserit: concidet. Igitur si tertio decimo die morbus remanebit: balneum neq; ante febrem, neq; post eam tentandum erit: nisi interdû iam horrore discusso. Horror ipse per cadē quæ supra præscripta sunt expugnandus. Deinde post febrem oportebit ungi: et uehementer perfricari: cibum et ualidum, et fortiter assumere. uino uti quantum libebit. postero die cum satis quiuerit, ambulare, exerceri, ungi, perfricari fortiter: cibum accipere sine uino: tertio die abstinere. quo die uero febrem expectabit: ante surgere, et exerceri, dareq; operam non oportet, ut in ipsam exercitationē tempus febris incurrat. sic. n. sæpe illa distulitur. At si in opere occupauit: tum demum se recipere. In eiusmodi ualitudine medicamenta sunt, oleum, frictio, exercitatio, cibus, uinum. Si uenter astrictus est, soluendus est. Sed hæc facile ualidiores faciunt. si imbecillitas occupauit: pro exercitatione gestatio est. Si ne hanc quidem sustinet: adhibenda tamen frictio est. si hæc quoq; uehemens onerat: intra quietem, et unctionem, et cibum sistendû est: dandaq; opera est, ne qua cruditas in cotidianam id malum uertat. Nam quartana ne minem inuolat. sed si ex ea facta cotidiana est: in malis æger est. Quod tamen nisi culpa uel ægri, uel curantis nunquam fit.

Curatio duarum quartanarum. Caput. XVI.

T si due quartanæ sunt: neq; hæ, quas proposui, exercitationes adhiberi possunt: aut ex toto quiescere opus est: aut si id difficile est, leniter ambulare: considerare diligenter in uino.

lulis pedibus, & capite. Quoties febris accessit, & desit, cibum modi-
cum sumere, & vinum. reliquo tempore nisi imbecillitas urget: absti-
nere. Aut si duæ febres penè iunguntur, post utrâq; cibum sumere. de-
inde uatuo tempore & moveri aliquid, & post unctionem cibo uti.
Cum uero uetus quartana raro, nisi uere solvatur: utiq; eo tempore
attendendum est ne quid fiat, quod ualeitudinem impediat. Prodestq;
in uetere quartana mutare subinde uictus genus: à uino ad aquam: ab
aqua ad uinum: à lenibus cibis ad acres: ab acris ad lenes transi-
re: esse radicem: deinde uomere: iure uel pulli gallinacei uentrem resol-
uere: oleum ad frictiones adijcere: aleficientia ante accessionem sorbe-
re, uel aceti cyathos duos, uel unū sinapis cum tribus græci uini falsi,
uel mixta paribus portionibus, & in aqua diluta, piper, castoreum, la-
ser, myrram. per hæc enim similiaq; corpus agendum est, ut mouea-
tur ex eo statu quo detinetur. Si febris quieuit, diu meminisse eius diei
cōuenit: eoq; uitare frigus, calorem, cruditatē, lassitudinē. Facile enim
reuertitur: nisi à sano quoq; aliquandiu timetur.

Polus mulatio

Curatio cotidiane febris, quæ ex quartana facta sit. Caput. XVII.

T si ex quartana cotidiana facta est: cum id uitio inade-
rit, per biduū abstinere oportet. frictione uti: aquam tan-
tummodo uesperis potui dare. tertio die sæpe fit ne febris
accedat. sed siue fuit, siue non fuit, cibus post accessionis
tempus est dandus. at si manet: per biduum abstinentia, quanta ma-
xime imperari corpori potest: frictione cotidie utendum est.

De tribus insanie generibus: & primo de eius curatione, quæ à græ-
cis phrenitis dicitur. Caput. XVIII.

T febrium quidem ratio exposita est. supersunt uero ali-
corporis affectus: qui huic superueniunt. ex quibus eos,
qui certis partibus assignari non possunt: protinus iun-
gam. Incipiam ab insanis: primamq; huius ipsius partē
agrediar: quæ et acuta, et in febre est: græci *ῥέβριτι* appellant. Illud
ante omnia scire oportet, interdū in accessione ægros desipere: et loqui
aliena. Quod nō quidē leue est: neq; incidere potest, nisi in febre ue-
hementi: non tamen æque pestiferum est. Nam plerunq; breue esse
conuenit: lenatq; accessionis impetu protinus mens redit. Neq; id ge-
nus morbi remedium aliud desiderat: quàm quod in curanda febre
præceptum est. Phrenitis uero tum demum est: cum continua demētia
esse incipit: aut cum æger quauis adhuc sapiat: tamen quasdā na-

Phrenitis

De huius

Phrenitis

LIBER

nas imagines accipit. perfecta est ubi mens illis imaginibus addicta est. Eius autem plura genera sunt: si quidem ex phreneticis alij bilares, alij tristes sunt: alij facilius continentur, et intra uerba desipiunt. alij consurgunt, & uiolenter quaedam manu faciunt. atq; ex his ipsis alij nihil nisi impetu peccant: alij etiam artes adhibent: summamq; spem sanitatis in captandis maiorum operum occasionibus præbent: sed exitu deprehenduntur. Ex his autem eos qui intra uerba desipiunt, aut leuiter etiam manu peccant: onerare asperioribus coercionibus superuacuum est. Eos uero qui uiolentius se gerunt uincire conuenit: ne uel alteri, uel sibi noceant. Neq; credendum est si uinctus aliquis dum leuari uinculis cupit: sanum iam se fingat, quamuis prudenter & miserabiliter loquatur: quoniam is dolus insaniens est. Ferè uero antiqui tales ægros in tenebris habebant: eo quod eis contrarium esse exterreri: & ad quietem animi tenebras ipsas conferre aliquid iudicabant. At Asclepiades tanquam tenebris ipsis terrentibus in lumine habendos esse dixit: neutrum tamen perpetuum est: alium enim lux, alium tenebræ magis turbant. reperiunturq; in quibus nullum discrimen deprehendi uel hoc, uel illo modo possit. Optimum itaq; est utrunq; ex periri: & habere eum, qui tenebras horret, in luce: eum q; lucem, in tenebris. At ubi nullum tale discrimen est, æger si uires habet, loco lucido: si non habet, obscuro continendus est. Remedia uero adhibere ubi maxime furor urget, superuacuum est. simul enim febris quoq; increscit. itaq; tunc nihil nisi continendus æger est. Vbi uero res patitur, festinanter subueniendum est. Asclepiades perinde esse dixit his sanguinem mitti, ac si trucidentur: rationem hanc secutus, quod neq; insania esset, nisi febre intenta: neq; sanguis nisi in remissione eius recte mitteretur. Sed ipse in his somnum multa frictione quæsiuit, cuius intentio febris somnum impediatur: & frictio non nisi in remissione eius utilis sit. Itaq; hoc quoq; auxilium debuit præterire. Quid igitur est? Multa in præcipiti periculo recte fiunt aliàs omittenda. & continuata quoq; febris habet tempora: quibus & si non remittit, non tamen crescit. Estq; hoc ut non optimum, sic tamen secundum remedium tempus. Quod si uires ægri patiuntur, sanguis quoq; mitti debet. Nec minus deliberari potest an alius ducenda sit. tum interposito die conuenit caput ad cutem tondere: deinde aqua fouere. in aqua uerbenæ aliquæ decoctæ sint, uel ex reprimentibus: aut prius fouere: deinde tondere: & iterum fouere: ac nouissime rosa caput, naresq; implere: offerre etiam naribus rutam ex aceto contritam: mouere sternutamenta medicamentis in id efficacibus. Quæ tamen facienda sunt in his, quibus uires non defunt. Si uero imbecillitas est,

Vincula

Tenebris

rosa tantum caput adiecto serpillio, similiq; aliquo madesaciendū est. Vtiles etiam in quibuscunq; uiribus herbae duae sunt, solanum, & muralis: simul ex utraq; succo expresso caput impleatur. cum se febris remiserit, frictione utendum est. partius tamen in his qui nimis hilares, quam in his qui nimis tristes sunt. Aduersus omnium autē sic insanientium animos, gerere se pro cuiusq; natura necessarium est. Quorundā enim uani metus leuandi sunt: sicut in homine praediuite famē timente incidit: cui subinde falsae hereditates nunciabatur. Quorūdam ad dacta coercenda est: sicut in his fit, in quibus continēdis plagae quoq; adhibentur. Quorundam etiā intempestiuus risus & obiurgatione, & minis prohibendus est. Quorundam discutiendae tristes cogitationes: ad quod symphoniae, & cymbala, strepitusq; proficiunt. Saepius tamen assentiendum, quam repugnandū est. paulatimq; & non euidenter ab his, quae stulte dicuntur, ad meliora mens eius abducenda est. Interdum etiā elicienda ipsius intentio, ut fit in hominibus studiosis literarum quibus liber legatur: aut recte si delectantur: aut perperam, si id ipsum eos offendit. emendando enim conuertere animum incipiunt. Quin etiam recitare si qua meminerunt cogendi sunt. Ad cibum quoq; quosdam non desiderantes reducere hi, qui inter epulantes eos collocauerunt. Omnibus uero sic affectis somnus & difficilis, & praecipue necessarius est. sub hoc enim pleriq; sanescunt. Prodest ad id, atq; etiam ad mentem ipsam componendam crocinum unguentum cum irino in caput datum. Si nihilominus uigilant hi, quidam somnum moliantur potui dando aquam, in qua papauer, aut uoscuus decocti sit: alij mandragorae mala puluino subijciunt: alij uel amonum, uel sicamini lachrymam fronti inducunt. hoc nomen apud medicos reperio. Sed cum graeci morū σινάμιον appellat: mori nulla lacrima est. sic uero significatur lacrima arboris in Aegypto nascētis: quā ibi μωπόσινον appellat. Plurimi decoctis papaueris corticibus, ex ea aqua subinde spongia os, & caput fouent. Aesclepiades ea superuacua esse dixit, quoniam in Lethargum saepe cōpellerent. Praecipit autē ut primo die à cibo, potione, somno abstineretur: uespere ei daretur potui aqua: tunc frictio admoueretur lenis, ita ut ne manum quidem qui fricaret, uehementer imprimeret. postero deinde die hisdē omnibus factis, uespere ei daretur sorbitio, et aqua: rursusq; frictio adhiberetur. Per hanc enim nos consecuturos, ut somnus accedat. Id interdum fit, & quidem adeo, ut illo confitente nimirum: frictio etiam lethargi periculum afferat. Sed si sic somnus non accessit, tum demum illis medicamentis accersendus est, habita scilicet eadem moderatione, quae hic quoq; necessaria est: ne quem obdormire uolumus;

Somnus periculus

excitare postea non possimus. Confert etiam aliquid ad somnum sila-
 nus iuxta addens: uel gestatio post cibum et noctu, maximèq; suspen-
 si lecti motus. Neque alienum est, si neque sanguis ante missus est:
 neque mens constat: neque somnus accedit: occipitio inciso cucurbitu-
 lam admonere. quæ quia leuat morbum, potest etiam somnum fa-
 cere. Moderatio autem in cibo quoq; adhibenda est. Nam neq; implen-
 dus æger est, ne insaniat. neq; ieiunio utiq; uexandus est, ne imbecilli-
 tate in cardiacum incidat. Opus est autem cibo infirmo, maximèq;
 forbitione, potione aquæ mulsæ: cuius ternos cyathos bis hyem: quater
 æstate dedisse satis est. *Alterum* genus insanie est: quod spatium lon-
 gius recipit: quia ferè sine febre incipit: leues deinde febriculas exci-
 tat: et consistit in tristitia, quam uidetur bilis atra contrahere. in hac
 utilis detractio sanguinis est. Si quid hanc prohibet, prima est absti-
 nentia: secunda per album ueratrum, uomitumq; purgatio. post utrū-
 libet adhibenda bis die frictio est. si magis ualet, frequens etiā exer-
 citatio. In ieiunio uomitus: cibus sine uino dandus ex media materia
 est. Quam quotiens posuero, scire licet etiam ex infirmissima dari
 posse: dum ne ea sola quis utatur: ualentissima tantummodo esse remo-
 uenda. præter hæc seruanda aliud est quàm tenerrima. remouendi
 terrores, et potius bona spes afferenda. querenda delectatio ex fabu-
 lis, ludisq; quibus maxime capi sanus assueuerat. Laudanda si qua
 sunt ipsius opera: et ante oculos eius ponenda. Leuiter obiurganda
 uana tristitia. Subinde admonendus in his ipsis rebus, quæ sollicitant:
 cur non potius letitiæ, q̃ solitudinis causa sit. Si febris quoq; accessit,
 sicut aliæ febres curanda est. *Tertium* insanie genus est ex his lon-
 gissimum, adeo ut uitam ipsam non impediat: quod rotum corporis
 esse consuevit. huius autem ipsius species duæ sunt. Nam quidam ima-
 ginibus, non mente falluntur: qualem insanientem Aiacem, uel Ore-
 stem poetarum fabulæ ferunt. quidam animo desipiunt. Si imagines
 fallunt: ante omnia uidendum est, tristes, an hilares sint. In tristitia ni-
 grum ueratrum deiectionis causa: in hilaritate album ad uomitum
 excitandum dari debet. idq; si in potione non accipit: pani adijcien-
 dum est, quo facilius fallat. nam si bene se purgauerit: ex magna par-
 te morbum leuabit. Ergo etiam si semel datum ueratrum parum pro-
 fecerit: interposito tempore iterum dari debet. Neq; ignorare oportet, le-
 uiozem esse morbum cum risu, quàm serio insanientium. Illud quoq;
 perpetuum est in omnibus morbis: ubi ab inferiore parte purgandus
 aliquis est, uentrem eius ante soluendum esse: ubi à superiore, compri-
 mendum. Si uero consilium insanientem fallit: tormentis quibusdam
 optime curatur. Vbi perperam aliquid dixit, aut fecit, se me, uincit.

lis, plagis coercendus est. Cogendus est et attendere, et ediscere aliquid, et meminisse. sic enim fiet ut paulatim motu cogatur considerare quid faciat. subito etiam terreri, et expauescere in hoc morbo prodest. Et ferè quicquid animum uehementè perturbat. Potest enim quedam fieri mutatio: cum ab eo statu mens in quo fuerat, abducta est. Interest etiam si ipse sine causa subinde rideat: an mestus, demissusq; sit. nam demens hilaritas terroribus his, de quibus supra dixi: melius curatur. si nimia tristitia est: prodest lenis, sed multa bis die frictio. Itè per caput aqua frigida infusa: demissumq; corpus in aqua, et oleum. Illa communia sunt, insanientes uehementer exerceri debere: multa frictione uti: neq; pinguem carnè, neq; uinum assumere: abis uti post purgationem ex leui materia quàm leuissimis. non oportere esse uel solos, uel inter ignotos, uel inter eos quos aut contemnunt: aut negligunt. mutare debere regiones: et si mens redit, annua peregrinatione esse iactandos. Raro, sed aliquando tamen ex metu delirium nascitur. Quod genus insanientium specie, similiq; uictus genere curandum est: præterquàm quod in hoc insanie genere solo recte uinum datur.

Cardiacæ morbi curatio. Caput. XIX.

h Vic morbo præcipue contrarium est id genus, quod *καρδιακὸν* à grecis nominatur: quæ sæpe ad eum phrenitici transeunt. si quidem mens in illis labat: in hoc constat. Id autem nihil aliud est, quàm nimia imbecillitas corporis: quod stomacho languente immo dico sudore digeritur. Licetq; protinus scire id esse, ubi uenarum exigui, imbecilliq; pulsus sunt. Sudor autem supra cōsuetudinem et modo, et tempore ex toto thorace, et cernicibus, atq; etiam capite prorūpit: pedibus tantummodo et cruribus siccioribus, atq; frigentibus. At ubi id morbi genus est: curatio prima ē, supra præcordia imponere quæ reprimant cataplasmata. secunda, sudorē prohibere. id præstat acerbum oleum, uel rosa, uel melinum, aut myrtum. quorum aliquo corpus leuiter perungendum: ceratumq; ex aliquo horum tum imponendum est. Si sudor uincat, delinendus homo est uel gypso, uel argenti spuma, uel cinolia creta: uel etiam subinde horum puluere respergendus. Idem præstat puluis ex contritis aridi myrti, uel rubi folijs: aut ex austeri, et boni uini arida feces. Pluraq; similia sunt: quæ si desunt, satis utilis est quilibet ex uia puluis iniectus. Sup hæc uero quo minus corpus insudet: leui ueste debet esse cōtectus, loco nō calido, fenestris patentibus

lib. 4. c. 5.

lib. 4. c. 5.

lib.

lib.

lib.

Grand Shallows

Protuberans *Sp.*

Stephen & a few friends

Lebanon.

Tho.
Dymer Sir

Ex paropitibus et
fortibus.

fic, ut per flatu quoq; aliquis accedat. Tertium auxilium est imbecillitati iacentis uino, ciboq; succurrere. Cibus nō multus quidē, sed sæpe tamen nocte, ac die dandus est, ut nutriat: neq; oneret. is esse debet ex infirmissima materia: & stomacho aptus. nisi autem necesse est, ad uinum festinare non oportet. si uerendum est ne deficiat, tum & in trita ex hoc, et hoc ipsum austerum quidem, sed tamen tenuemuracū. Egelidum subinde & liberaliter dandū est adiecta polenta: si modo is æger parum cibi assumit. idq; uinū esse debet neq; nullarum uiriuū, neq; ingentium: recteq; tota die, ac nocte uel treis heminas æger bibet. si uastius corpus est: plus etiam. Si abum nō accipit, perunctum ante perfundere aqua frigida conuenit: & tum dare. Quod si stomachus resolutus parum continet, & ante cibum, & post eum: sponte uomere oportet: rursumq; post uomitum cibum sumere. si ne id quidem manserit, sorbere uini cyathum: interpositaq; hora sumere alterum. si id, quoq; stomachus reddiderit: totum corpus bulbis contritis super illinendum est. qui ubi inaruerunt, efficiunt, ut uinum in stomacho contineatur: exq; eo toti corpori calor, uenisq; uis redeat. Vltimum auxilium est, in alium p̄fusa, uel alia cremorem ex inferioribus partibus inijcere, si quidem id quoq; uires tuetur. Neq; alienum est naribus quoq; estuantis admonere quod reficiat: id est rosam, & uinum. Et si qua in extremis partibus frigent: unctis, & calidis manibus fovere. per quæ si consequi potuimus, ut & sudoris impetus minuat: & uita prorogetur: incipit iam tēpus ipsum esse praesidio. Vbi in tuto esse uidetur: uerendum est tamen ne ad eandem imbecillitatem cito recadat. Itaq; uino tantum remoto, cotidie ualidiorem abum debet assumere: donec satis uirium corpori redeat.

De lethargo, & eius curatione. Caput. XX.

Iter quoq; morbus est aliter phrenitico contrarius. In illo
 a difficilis somnus, prompta ad omnem audaciam mēs est.
 At in hoc marcor & inexpugnabilis penē dormiendi
 necessitas, αἰέσις γὰρ γράει nominant. atq; id quoq; genus
 acutū est: & nisi succurratur, celeriter iugulat. Hos agros quidā sub-
 inde exatire nituntur admotis his, quæ per sternutamenta euocan-
 tur: & his, quæ odore foedo mouent, qualis est pix cruda, lana suci-
 da, piper, ueratum, castoreum, acetum, allium, cēpa, iuxta etiam gal-
 banum incendunt, aut pilos, aut cornu ceruinum. si id non est, quod li-
 bet aliud. Hæc enim cum comburuntur, odorem foedū mouent. Thar-
 rias uero quidam accessiois esse id malum dixit: leuariq; cum ea de-
 cessit. Itaq;

cessit. Itaq; eos qui subinde excitant, sine usu male habere. Interest aut in decessione expergiscatur aeger: an cum febris non leuetur: aut leuata quoq; ea somnus urgeat. Nam si expergiscatur, adhibere ei ut sopito superuacuum est: neq; enim uigilando melior fit: sed per se, si melior est: uigilat. Si uero continens ei somnus est: utiq; excitandus est. sed his temporibus quibus febris leuissima est, ut et exarnat aliqd, & sumat. Excitat aut ualidissime repente aqua frigida infusa post remissionem. Itaq; perunctum oleo multo corpus tribus, aut quatuor amphoris totum per caput persundendum est. Sed hoc utemur, si equalis agro spiritus erit: si mollia praecordia. Sin aliter haec erunt: ea potiora, quae supra comprehensa sunt. Et quod ad somnum quidem pertinet, commodissima haec ratio est. Medendi autem causa caput radendum: deinde postea fouendum est aqua: in qua laurus, aut ruta decocta sit. Altero die imponendum castoreum, aut ruta ex aceto contrita, aut lauri baccæ, aut hederæ cum rosa, et aceto. Praecipueq; proficit, & ad excitandum hominem naribus admotum, & ad morbum ipsum depellendum capiti, fronti uel impositum sinapi. Gestatio etiam in hoc morbo prodest, maximeq; oportune cibus datus: id est in remissione quanta maxima inueniri poterit: aptissima autem sorbitio est, donec morbus decrescere incipiat: sic ut si cotidie grauis accessio est: haec cotidie detur. Si alternis, post grauiorem, sorbitio: post leuiorem, mulsæ aqua. Vinum quoq; cum tempestiuo cibo datum, non mediocriter adiuuat. quod si post longas febres eiusmodi torpor corpori accessit: cætera eadem seruanda sunt. Ante accessionem aut tribus, quattuor uel horis castoreum, si uenter astrictus est: mixtum cum scamonea: si non est, per se ipsum cum aqua dandum est. Si praecordia mollia sunt, cibus utendum est plenioribus. Si dura, in hisdem sorbitionibus subsistendum: imponendūq; est praecordijs, quod sinul et reprimat, et emolliat.

De aqua inter cutem, hoc est hydropico morbo. Caput. XXI.

Ed hic quidem acutus est morbus. Longus uero fieri potest eorum, quos aqua inter cutem male habet: nisi primis diebus diffusus est: ὕδρωπας graeci uocant. Atq; eius tres species sunt. Nam modo uentre uehementer intento creber intus ex motu spiritus sonus est. modo corpus inaequale est: tumoribus aliter, aliterq; per totum id orientibus. modo intus in unum aqua contrahitur: & moto corpore ita mouetur, ut impetus eius conspici possit. Primum τιμπανίτην, secundum ἀσκηνοειδῆ, uel ὁ πόνος, tertium ὀγκιτήν graeci nominant. Communis tamen omnium est huius-

Aurelij Cor.

f

Cassius

Cassius

Hydrops.

X

fin

LIBER

Causa.

Prognose.

Curaçao

about 2000

ris nimia abundantia: ob quam ne ulcera quidē in his agris facile sa-
 nescent. Sæpe uero hoc malū per se incipit. Sæpe alteri uetusto mor-
 bo, maximēq; quartanæ superuenit. Facilius in seruis, quā in li-
 beris tollitur. quia cum desideret famem, sitim, mille alia tedia, lon-
 gamq; patientiam: promptius his succurritur, qui facile cōuincuntur: quā
 quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem, qui sub alio sunt: si ex
 toto sibi temperare non possunt: ad salutem perducuntur. Ideoq; non
 ignobilis medicus Chrysippi discipulus apud Antigoniū regem am-
 cum: quendam eius notæ intemperantiæ mediocriter eo morbo impli-
 citum, negauit posse sanari. Cumq; alter medicus epirotes Philippus se
 sanaturum polliceretur: respondit illum ad morbum ægri respicere: se
 ad animum. neq; eum res fefellit. Ille. n. cum summa diligentia non
 medici tantummodo, sed etiam regis custodiretur: tamen malagmata
 sua deuorando, bibendoq; suam urinam, in exitium se præcipitauit.
 Inter initia tamen non difficillima curatio est: si imperata sunt corpo-
 ri quies, sitis, inedia. At si malum inueterauerit: non sine magna mo-
 lesta discutitur. Metrodorum tamen Epicuri discipulum referunt: cum
 hoc morbo tentaretur, neq; æquo animo ferret necessariam sitim: ubi
 diu abstinerat: bibere solitum, deinde euomere. Quod si redditur
 qui: quid receptum est: multum tedio demit. si à stomacho retentum
 est, morbum auget. Ideoq; in quolibet tentandum nō est. Sed si febris
 quoq; est: hæc in primis submouenda est per eas rationes: per quas
 huic succurri posse propositum est. Si sine febre æger est: tum demū ad
 ea ueniendum est, quæ ipsi morbo mederi solent. atq; hic quoq; quæ-
 cunq; species est, si nondum nimis occupauit: hisdem auxilijs opus est.
 multum ambulandum. currendum aliquid est. superiores maxime
 partes sic perfricandæ, ut spiritum ipse contineat. euocandus est su-
 dor non exercitatione tantummodo, sed etiam in harena calida, uel laco-
 nico, uel clibano, similibusq; alijs: maximēq; utiles naturales, et siccæ
 sudationes sunt: quales super baias habemus in myrtetis. balneu, atq;
 omnis humor alienus est. Ieiunio recte catapotia dantur facta ex ab-
 sinthij duabus: myrrhæ uel tertia parte. Cibis esse debet ex media qui-
 dem materia: sed tamen generis durioris. Potio non ultra danda est,
 quā ut uitam sustineat. optimaq; est, quæ urinā mouet. Sed id ipsum
 tamen molliri cibo, quā medicamento melius est. Si tamen res coget ut
 ex his aliquid detur: præstanter id decoquendū, eaq; aqua potui dan-
 da. Videntur autem hanc facultatem habere, iris, nardum, crocum, cin-
 namum, amomum, cassia, myrra, balsamum, galbanum, ladanum, oe-
 nante, panace, cardamomum, hebenus, cyressi semen, uua timinia, quæ
 ἄβροτον, ἀππύρι, græci nomināt: abrotanum, rosæ folia, acorum, ama-

re nuce, tragoriganum, storax, costum, iunci quadrati & rotundi
 semen: illud $\nu\sigma\tau\sigma\sigma\sigma$, $\chi\sigma\iota\sigma\sigma\sigma$ hoc græci vocant. Quæ quotiens posuero,
 non quæ hic nascuntur, sed quæ inter aromata afferuntur, signifi-
 cabo. Primo tamen quæ leuissima ex his sunt: idest rosæ folia, uel nar-
 di spica tentanda sunt. Vinum quoq; utile est, & austerum: sed quàm
 tenuissimum. Commodum est etiam lino cotidie ventrem mectiri: &
 qua comprehendit aluum, notam imponere. postero die uidere si ple-
 nius corpus sit: an extenuetur. Id enim quod ienuatur, medicinam sen-
 tit. Neq; alienum est mectiri & potionem eius, et urinam. Nam si plus
 humoris excernitur, quàm assumitur: ita demum secundæ ualitudi-
 nis spes est. Asclepiades in eo qui ex quartana in hydropa deade-
 rat: se abstinentia bidui & frictione usum. tertio die iam et febre,
 & aqua liberato cibum, & uinum dedisse, memorie prodit. Hacte-
 nus communiter de omni specie dici potest. Si uehementius malum est,
 diducenda ratio curadi est. Ergo si inflammatio, et ex ea dolor creber
 est: utilis quotidianus aut alterno quoq; die post cibum, uomitus est. Fo-
 mentis siccis, calidisq; utendum est. Si per hæc dolor non finitur, ne-
 cessariæ sunt sine ferro cucurbitulæ. Si ne per has quidem tormentum
 tollitur: incidenda cutis est: & tum his utendum. Vltimum auxilium
 est: si cucurbitulæ nihil profuerunt: per aluum infundere copiose
 aquam calidam, eamq; recipere. Quàm etiam cotidie ter, quater ue-
 opus est uti frictione uehementi cum oleo, & quibusdam calefacienti-
 bus. Sed in hac frictione à uentre abstinendum est. Imponendum uero
 in eum crebrius sinapi, donec cutem erodat: ferramentisq; cadētibz
 pluribus locis uenter exulcerandus est: & seruanda ulcera diutius.
 Vtiliter etiam scylla cocta delinitur cutis: sed diu post has inflamma-
 tiones abstinendum est ab omnibus instantibus. At si id uitium est, cui
 $\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha\alpha$ nomen est: eas partes quæ tumunt, subijcere soli oportet:
 sed non nimium, ne febricula incidat. Si is uehementior est, caput
 uelandum est: utendumq; frictione madefactis tantum manibus aqua;
 cui sal, & nitrum, & olei paulū sit adiectum sic, ut aut pueriles, aut
 muliebres manus adhibeantur: quo melior earum tactus sit. Idq; si
 uires patiuntur, ante meridiem tota hora: post meridiē semel hora fieri
 oportet. Valia etiam sunt cataplasmata quæ reprimunt: maximeq; si
 corpora teneriora sunt. Incidendum quoq; est super talum quattuor
 fere digitis ex parte interiore: qua p aliquot dies frequens humor fe-
 ratur: atq; ipsos tumores incidere altis plagis oportet. Concutiendūq;
 multa gestatione corpus est: atq; ubi induræ uulneribus cicatrices sunt,
 adiucendū & exercitationibus est, & cibus, donec corpus ad pristinum
 habitum reuertatur. Cibus ualens esse debet, & glutinosus, maximeq;

f ij

*oia dnt qd in hris
morbantur*

inflammatio

Hyposarcarum.

LIBER

Ascius
 caro. Vinum, si per stomachum licet: dulcius. sed ita ut inuicē biduo, triduo uel modo aqua, modo id bibatur. Prodest et lactuca marinæ quæ grandis iuxta mare nascitur, semen cum aqua potui datum. Si ualens est qui id accipit: ei scylla cocta sicut supra dixi, delinitur. Asthoresq; multi sunt: inflatis uesticis pulsandos tumores esse. Si uero id morbi genus est, quo in uterum multa aqua contrahitur: ambulare, sed magis modice oportet. malagma quod digerat impositum habere: idq; ipsum super imposito triplici panno fascia, non nimium tamen uehementer astringere. quod à Tharria profectum, seruatum esse à pluribus uideo. Si iecur aut lienem affectum esse manifestum est: ficum pinguem contusam adiecto melle superponere. Si per talia auxilia uenter non siccatur: sed humor nihilominus abundat: celeriore uia succurrere, ut is per uentrē ipsum emittatur. Neq; ignoro Erastrato dissipluisse hanc curandi uiam. Morbum enim hunc iocineris putauit. Ideoq; ita illum esse sanandum: frustra q; aquam emitti: quæ uitiato illo subinde nascitur. sed primum non huius uisceris unius hoc uitium est. Nam splene affecto, et in totius corporis malo habitu fit: deinde ut inde coeperit: tamen aqua nisi emittitur, quæ contra naturam ibi subsistit: et iocineri, et cæteris interioribus partibus nocet. conuenitq; corpus nihilominus esse curandum. neq; enim sanat emissus humor: sed medicinæ locum facit, quam intus inclusus impedit. *Quia ne inuicem morbo sic curari possint: sed iuuenes robusti, qui uel ex toto carent febre: uel certe satis liberales intermissiones habent. Nam quorum stomachus corruptus est, qui uel ex atra bile huc deciderunt: quiq; malum corporis habitum habent: idonei huic curationi non sunt. Cibus autē quo die primum humor emissus est, superuacuuus est: nisi si uires desunt. Insequentibus diebus et his uinum meracius quidem, sed non ita multum dari debet, paulatimq; euocandus æger est ad exercitationes, frictiones, solem, sudationes, nauigationes, et idoneos cibos: donec ex toto conualescat. Balneum rarum res amat: frequentiore in ieiunio uomitum. Si æstas est, in mare nature commodum est. ubi conualuit aliquis, diu tamen alienus ei ueneris usus est.*

tabes.
 De tabe, et eius speciebus, et curationibus. Caput. XXII.

Quia
 Intius sæpe et periculosius tabes eos male habet, quos in uasit. Atq; huius quoq; plures species sunt. Vna est qua corpus non alitur: et naturaliter semper aliquibus decedentibus, nullis uero in eorū locum subeuntibus, summa

diu est, sed paulatim cotidieq; pluribus diebus cū eo, ut cetera quoq;
 eodem modo seruētur. Quod si mali plus est, & uera pōis est: in-
 ter initia protinus occurrere necessarium est. neq; enim facile is mor-
 bus cum inueterauerit, euincitur. Opus est si uires patiuntur longa na-
 uigatione, coeli mutatione sic, ut densius quā id est, ex quo discedit
 aeger: petatur. Ideoq; aptissime Alexadriam ex Italia itur. Ferēq; id
 posse inter principia corpus pati debet: cum hic morbus etate firmis-
 sima maxime oriatur: id est ab anno duodecimo, ad annum quintū,
 & trigessimū. Si id imbecillitas non sinit, naue tñ non longe gestari
 cōmodissimum est. Si nauigationē aliqua res prohibet: lectica uel alio
 modo corpus dimouendum est. Tum a negocijs abstinendum est: omni-
 busq; rebus, quae sollicitare animum possunt. somno indulgendum: ca-
 uende defillationes, ne si quid cura leuauerit: exasperetur: & ob id ui-
 tanda cruditas: simulq; sol, & frigus. Os obtegendum: fauces uelandae:
 tussicula suis remedijs finiēda. et quādiu quidem febricula in cur-
 sat, huic interdum abstinentia, interdum etiam tempestiuis cibis meden-
 dum. Eoq; tempore bibenda aqua. Lac quoq; quod in capitis dolori-
 bus, & in acutis febribus, & per eas facta nimia sitis, siue praecor-
 dia tument, siue biliosa urina est, siue sanguis fluxit, pro ueneno est.
 in phthisi tamen sicut in omnibus longis, difficilibusq; febriculis recte
 dari potest. Quod si febris aut nondum incurSAT, aut iam remisit:
 decurrendum est ad modicas exercitationes, maximeq; ambulationes:
 item lenes frictiones. Balneum alienū est. Cibus esse debet primo acer,
 ut alliū, porrum, idq; ipsum ex aceto. uel ex eodē intubus, ocyum, la-
 ctuca. Deī lenis ut sorbitio ex ptisana, uel ex alia, uel ex amylo la-
 cte adiecto. Idem oriza quoq; et si nihil aliud est: far praestat. Tū in-
 uicem modo his cibis, modo illis utendum est. adiiciendāq; quaedam ex
 media materia, praecipueq; uel ex apruna, cerebellū, uel pisciculus, &
 his similia. Farina ē cum seuo ouillo, caprino uel mixta, deīde inco-
 cta pro medicamēto est. uinum assumi debet lene, austerum. Hactenus
 non magna mole pugnatur. Si uehementior noxa est, ac neq; febricu-
 la, neq; tussis quiescit: tenuariq; corpus apparet: ualidioribus auxilijs
 opus est. Exulcerandus est ferro candenti uno loco sub mento, altero in
 gutture: duobus ad mammam utraq; item sub imis ossibus scapula-
 rum, quas uo μακρὰς γράει uocant: sic ne sanescere ultra sinamus, nisi
 tussi finita: cui per se quoq; medendum esse manifestū est. Tunc ter,
 quaterq; die uehementer extremae partes perfricandae. thorax leui
 manu perfractandus. post cibum intermittenda hora: & perfricanda
 crura, brachiaq;. Interpositis denis diebus demittendus est aeger in so-
 lium: in quo sit aqua calida, & oleum. ceteris diebus bibenda aqua:

phthisis

cap. 27.

quā a lenis abstinet

tum & uinum: si tussis non est, potui frigidum dandum: si aestas est, egelidum. Vtile est etiam cibos in remissionibus cotidie dari: frictiones, gestationesq; similiter adhiberi. eadem acria quarto, aut quinto die sumere. Interdum herbam sanguinali ex aceto, uel plantaginem esse. Medicamentum etiam est uel plantaginis succus per se, uel marribium ex melle concoctum, ita ut illius cyathus sorbillo sumatur: huius cochleare plenum paulatim delingatur: uel inter se mixta, & incocta resinae terebinthinae pars dimidia: butyri, et mellis pars altera. Praecipua tamen ex his omnibus sunt uictus, uehiculum, & nauis, & sorbitio. Aluus cito utiq; uitanda est: Vomitus in hoc morbo si frequens est, periculosus est, maximeq; sanguinis. Qui meliusculus esse capit, addicere debet exercitationes, frictiones, cibos: deinde ipse se suppresso spiritu perfricare: diu abstinere a uino, balneo, uenere.

De comitialis morbi curationibus. Caput. XXIII.

Inter notissimos morbos est et is, qui comitialis, uel maior nominatur. Homo subito concidit: ex ore spumæ mouentur: deinde interposito tempore ad se redit: & per se ipsum consurgit. Id genus saepius uiros quam foeminas occupat. ac solet quidem et longum esse, usq; ad mortis diem: & uitae non periculosum. Interdum tamen cum recens est hominem consumit: & saepe cum si remedia non sustulerunt, in pueris ueneris, in puelis menstruum initium tollit. modo cum distentione membrorum, aut neruorum prolabitur aliquis: modo sine illa quidem. Hos quoque hisdem quibus lethargicos excitare conantur, quod admodum superuacuum est: & quia ne lethargicus quidem is sanatur: & quia cum possit ille nunquam expergescere, acq; ita fame interire: hic ad se utiq; reuertitur. Vbi concidit aliquis, si nulla neruorum distentio accessit, utiq; sanguis mitti debet: si accessit, non utiq; mittendus est, nisi alia quoque hortantur. necessarium autem est ducere aluum: uel nigro ueratro purgare: uel utrunq; facere si uires patiuntur. tunc caput tondere: olcoq; & aceto pun gere: cibum post diem tertium simul cum transit hora, qua concidit, dare. Neq; sorbitiones autem his, aliq; molles, & faciles cibi, neq; caro, minimeq; suilla conuenit: sed mediae materiae. Nam et uiribus opus est: & cruditates cauendae sunt, cum quibus fugere oportet solem: balneum, ignem, omniaq; calefacientia. item frigus, uinum, uenerem; loci praecipitis conspectum, omniumq; terrentium, uomitum, lassitudinem, solitudines, negocia omnia. Vbi tertio die cibus datus est, intermittere quartum, & inuicem alterum quinq; eadem hora cibi seruata: donec quatuordecim dies transeant. quos ubi morbus exisset: acuti uino

f. iij

X
Epilepsia

Signa

Prognost.

Cumulo

Sept 18

Gul.^o x fimp. mod.
c. de sang. mto
infraguj.

De regij morbi curatione. Caput. XXIIII.

X

Signum
 lor autem eum morbum detegit maxime oculorum: in quibus quod album esse debet, fit luteum. Soletq; accedere & sitis, & dolor capitis, & frequens singultus, & præcordiorum dextra parte durities: & ubi corporis uehemēs motus est, spiritus difficultas, membrorumq; resolutio. atq; ubi diutius manet morbus, totum corpus cum pallore quodam inalbescit. Primo die abstinere ægrum oportet: secundo dicere alium: tum si febris est, eam uictus genere discutere. si non est, scamoneam potui dare: uel cum aqua betam albam contritam, uel cū aqua mulsā nices amaras, absinthium, anesum sic, ut pars huius minima sit. Asclepiades aquam quoq; salsam, & quidem per biduum purgationis causa bibere cogebat ijs, quæ urinam mouent: reiectis. Quidam superioribus omissis, per hæc et p̄ eos cibos, qui extenuant: idē se consequi dicunt. Ego ubiq; si satis uirum est, ualidiora: si parum, imbecillia auxilia præfero. Si purgatio fuit, post eam triduo: primo modice cibum oportet assumere ex media materia: & uinum bibere græcum salsum, ut resolutio uentris maneat. tum altero triduo ualidiores cibos, & carnis quoq; aliquid esse. intra aquā manere. deinde ad superius genus uictus reuerti cū eo, ut magis satietur omissō græco uino bibere integrum austerū: atq; ita per hæc uariare, ut interdum acres quoq; cibos interponat: interdum ad salsum uinum redeat. Per omne uero tempus utendum est exercitatione, frictione: si hyems est, balneo: si æstas, frigidis natationibus: lecto ē, & conclauī cultiore. clauso loco uti ludis, lasciuia: per quæ mens exhilaretur. ob quæ regius morbus dictus uidetur. Malagma quoq; quod digerat, super præcordia datū, prodest: uel arida ibi ficus imposita, si iecur, aut lienis affectus est.

De elephantie curatione. Caput. XXV.

i Notus autem penē in italia, frequentissimus in quibusdam regionibus is morbus est, quem ἐλεφαντία græcā uocant. isq; longis annumeretur. Totum corpus afficitur, ita ut ossa quoq; uitiari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas, crebrosq; tumores habet. Rubor harum paulatim in atrum colorem conuertitur. Summa cutis inæquabiliter crassa, tenuis, dura, mollisq; quasi squamis quibusdam exasperatur: corpus emacrescit: os suræ: pedes intumescunt. Vbi uetus morbus est, digiti in manibus, pedibusq; sub tumore conduntur: febricula oritur, quæ facile tot malis obrutum hominem consumit. protinus ergo inter initia sanguis per biduum mitti debet: aut nigro ueratro uenter solui: adhibenda tū quanta sustineri potest, inedia est. paulum deinde uires reficiendæ: &

Elephantia

Signum

Cura

ducenda alius. post hæc, ubi corpus leuatum est, utendum est exercita-
tione, præcipueq; cursu. sudor primum labore ipsius corporis, deinde
etiam siccis sudationibus euocandus. frictio adhibenda: moderatimq;
inter hæc, ut vires conferuentur: balneum rarum esse debet. Cibus
sine pinguibus, sine glutinosis, sine instantibus. Vinum, præterquam
primis diebus, recte datur. Corpus contrita plantago, & illita tueri
optime uidetur.

De attonitis, & eorum curatione. Caput. XXVI.

Attonitos quoq; raro uidemus: quorum & corpus, & mens
stupet. Fit interdum ictu fulminis: interdum morbo: ἀπο-
πληξίαν hūc græci appellant. His sanguis mittendus est.
ueratro quoq; albo, uel alui ductione utendum. Tum adhibendæ fri-
ctiones: & ex media materia minime pingues cibi. quidam et acres;
& à uino abstinendum.

De resolutione neruorum: quæ apoplezia, uel paralysis dicitur.
Caput. XXVII.

Resolutio neruorum frequens ubiq; morbus est. Sed in-
terdum tota corpora, interdum partes infestat. Veteres
authores illud ἀποπληξίαν, hoc παράλυσιν nominaue-
runt. Nunc utrumq; paralyzin appellari uideo. Solent
autem qui per omnia membra uehementer resoluti sunt, celeriter rapi.
ac si correcti non sunt, diutius quidem uiuunt: sed raro tamē ad sa-
nitatem perueniunt: & plerumq; miserum spiritum trahunt, memoria
quoq; amissa. In partibus uero nunquam acutus, sæpe longus, ferè sa-
nabilis morbus est. Si omnia membra uehementer resoluta sunt, sangui-
nis detractio uel occidit, uel liberat. Aliud curationis genus uix un-
quam sanitatem restituit: sæpe mortem. tantum differt uitam: interim
infestat. Post sanguinis missionem si non redit & motus, & mens: ni-
hil spei superest. Si rediit: sanitas quoq; prospicitur. At ubi pars reso-
luta est, prouidet malo corporis, uel sanguis missus, uel alius ducta.
Cætera eadem in utroq; casu facienda sunt. Si quidem uitare præcipue
conuenit frigus: paulatimq; ad exercitationes reuertendum est sic, ut
ingrediatur ipse protinus, si potest. Si id crurum imbecillitas probi-
bet: uel gestetur, uel motu lecti concutitur: tum id membrum quod de-
ficiet si potest, per se, si minus, per alium moueatur: & ut quadam ad
consuetudinem suam redeat. Prodest et torpentibus mēbris summam

apoplezia
morbosus
morbosus

apoplezia

apoplezia
morbosus
morbosus

Paralysis

Paralysis

Paralysis

Paralysis

Paralysis

cutem exasperasse, uel urticis caesam, uel imposito sinapi sic, ut ubi rubere coeperit corpus: hæc remoueantur. Scylla quoq; contrita, bulbiq; contriti cum thure recte imponuntur. Neq; alienum est resina cutem tertio quoq; die diutius uellere: pluribus et locis aliquando sine ferro incurbitulas ad mouere. Vnctioni uero aptissimum est uetus oleum, uel nitrum aceto, et oleo mixtum. Quin etiam fouere aqua calida marina: uel si ea non est, tamen salsa, magno opere necessarium est. At si quo loco uel naturales, uel etiam manu factæ tales natationes sunt, iis potissimum utendum est: præcipueq; in his agitata membra, quæ maxime deficiunt. Si id non est, balneum tamen prodest. Cibus esse debet ex media materia, maximeq; ex uenatione. potio sine uino aqua calida. Si tamen uetus morbus est, interponi quarto, uel quinto die purgationis causa uinum græcum salsum prodest. Post coenam utilis uomitus est. Interdum uero etiam neruorum dolor oriri solet. In hoc casu non oportet uomere: non medicamentis urinam mouere: non sine exercitatione sudores, ut quidam præcipiunt, expedit. Bibenda aqua est bis die. in lectulo leniter satis diu corpus perficiendum est. deinde reposito spiritu ab ipsa exercitatione potius superiores partes mouendæ. balneo raro utendum: mutadum subinde peregrinationibus cælum. Si dolor est, ea ipsa pars sine oleo nitro ex aqua perungenda est: deinde inuoluenda, et subiicienda pruna lenis, et sulphur. atq; ita id suffumigandum: idq; aliquandiu faciendum. sed ieiunio cum bene iam concoxerit, incurbitulæ quoq; sæpe dolenti parti ad mouendæ sunt: pulsandusq; leniter inflatis uescis bubulis is locus est. Vtile est et seuum misce cum uosnuæ, et urticæ contritis similibus sic, ut omnium par modus sit: idq; imponere: fouere aqua, in qua sulphur decoctum sit. Vtriusq; quoq; recte imponuntur aqua calida repleti: aut bitumen cum ordeacea farina mixtum: atq; in ipso potissimum dolore utendum gestatione uehementi est. quod in alijs doloribus pessimum est. Tremor aut neruorum æque uomitu, medicamentisq; urinam mouentibus impeditur. Inimica etiam habet balnea, assasq; sudationes. bibenda aqua est. acris ambulatione utendum. item unctionibus, frictionibusq; maxime per seipsum. pila, similibusq; superiores partes dimouendæ. cibo quolibet utendum, dummodo concoctioni utiq; studeatur. secundum cibum curis abstinendum. rarissima uenere utendum est. si quando quis in eâ prolapsus est: tum oleo leniter, diuq; in lectulo perficari manibus puerilibus, potius quam uirilibus debet. suppurationes autem quæ in aliqua interiori parte oriuntur, ubi notæ fuerint: primum id agere oportet p ea cataplasmata, quæ reprimunt: ne coitus inutilis materiæ fiat. deinde si hæc uicta sunt, p ea malagmata quæ digerunt: diffi-

Cibus

Nervorum dolor

Tremor nervorum

Suppuratio

LIBER. III.

pentur. Quod si consecuti non sumus, sequitur, ut euocetur: deinde ut mature scat: omnis tunc uomicae finis est, ut rumpatur. Inditiumq; est, pus uel aluo, uel ore redditum. sed nihil facere oportet quo minus quicquid est puris, excedat. Utendum maxime sorbitionibus est: Et aqua calida: Vbi pus ferri desyt, transeundum ad faciles quidem, se d tamen ualidiores, Et frigidos cibos, frigidamq; aquam sic, ut ab egeli dis tamen initium fiat. primoq; cum melle quedam edenda, ut nuc lei pinei, uel graecae nuges, uel auellanae. Postea submouendum id ip sum, quo maturius induci cicatrix possit. Medicamentum eo tempore ulceri est, succus assumptus uel porri, uel marrubij: Et omni cibo por rum ipsum adiectum. Oportebit autem uti in his partibus quae non afficientur, frictionibus: item ambulationibus lenibus. Vitandumq; erit, ne uel luctando, uel currendo, uel alia ratione sanescientia ulcera exasperentur. In hoc enim morbo perniciosus, ideoq; omnimodo ca uendus sanguinis uomitus est.

De humani corporis interioribus sedibus. Caput. I.

h Actenus reperiuntur ea genera morborū: quā
 in totis corporibus ita sunt, ut ijs certae sedes
 assignari non possint. Nunc de his dicam, quae
 sunt in partibus. Facilius autem omnium inte-
 riorum morbi, curationesq; in noticiam ueni-
 ent: si prius eorum sedes breuiter ostendero.
 Caput igitur, eaq; quae in ore sunt, non lin-
 gua tantummodo, palatoq; terminantur: sed etiam quatenus oculis no-
 stris exposita sunt. In dextra, sinistraq; circa guttur uenae grandes,
 quae *σπασμωδικοί* nominantur: itemq; arteriae, quas *παρσπασμωδικοί* uocant:
 sursum procedentes ultra aures feruntur. atq; in ipsis ceruicibus glan-
 dulae posita sunt: quae interdum cum dolore intumescunt. Deinde duo
 itinera incipiunt. alterum asperam arteriam nominant: alterum sto-
 machum. arteria exterior ad pulmonem: stomachus interior ad uen-
 triculum fertur. illa spiritum, hic cibum recipit: quibus cum diuersae
 uiae sint: quae coeunt exigua in arteria sub ipsis faucibus lingua est.
 quae cum spiramus, attollitur: cum cibum, potionemq; assumimus, arte-
 riam claudit. Ipsa autem arteria dura, & cartilaginosa in gutture
 assurgit: ceteris partibus residet. Constat ex arcibus quibusdam com-
 positis ad imaginem earum uertebrae, quae in spina sunt: ita tñ, ut
 ex parte exteriori aspera, ex interiore stomachi modo leuis sit. eaq;
 descendens ad praecordia, cum pulmone committitur. Is spongiosus,
 ideoq; spiritus capax, et à tergo spinae ipsi iunctus in duas fibras un-
 gulae bubulae modo diuiditur. huic cor annexum est natura musculosum,
 in pectore sub sinistro mēbra situm: duosq; quasi uentriculos ha-
 bet. at sub corde, atq; pulmone transuersum, ex ualida membrana se-
 ptum est: quod à praecordijs uterum diducit aequae neruosum. Multis
 etiam uenis per id discurrentibus à superiore parte non solum inte-
 stina, sed iecur quoq; lienemq; discernit. Haec uiscera proxima: sed in-
 fra tamē posita dextra, sinistraq; sunt. Iecur à dextra parte sub praec-
 ordijs ab ipso septo ortum intrinsecus cauum: extrinsecus gibbum:
 quod prominens leuiter uentriculo insidet: & in quattuor fiores di-
 uiditur. Ex inferiore uero parte ei fel inhaeret. at lienis sinistra non
 eidē septo, sed intestino innexus est: natura mollis, & rarus longitu-
 dinis, crassitudinisq; modica: isq; paulum à costarum regione in ute-
 rum excedens, ex maxima parte sub his conditur. atq; haec quidem

in Lib.

Caput

arteria in aspera
stomachum

pulmonem

cor

superius in fiores

ex

lin

LIBER

iuncta sunt. Renes uero diuersi, qui lumbis sub imis costis inhaerent à parte earum resimi, ab altera rotundi: qui & uenosi sunt: & uentriculos habent: & tunicis super conteguntur: ac uiscerum quidem haec sedes sunt. Stomachus uero qui intestinorum principium est, nervosus à septimae spinæ uertebra incipit: ac circa præcordia cum uentriculo committitur. Venter autem qui receptaculum cibi est: constat ex duobus tergoribus. isq; inter lienem, & iecur positus est: utroq; ex his paulum super eum ingrediente. suntq; etiam membranulae tenues, per quas inter se omnia ista connectuntur: iungunturq; ei septo, quod transuersum esse supra posui. Inde ima uentriculi pars paulum in dexteriolem partem conuersa, in summum intestinum coartatur. Hanc iuncturam πύλονες graeci uocant: quoniam portæ modo in inferiores partes ea quæ excretari sumus, emittit. ab ea ieiunum intestinum incipit non ita implicitum, cui tale uocabulum est: quia nunquam quod accipit, continet: sed protinus in inferiores partes transmittit. Inde tenue intestinum est in sinus uehementer implicitum. Orbes uero eius per membranulas singuli cum inferioribus connectuntur, qui in dexteriolem partem conuersi, & è regione dexterioris coxæ finiti, superiores tamen partes magis complent. Deinde id intestinum cum crassiore altero transuerso committitur: quod à dextra parte incipiens, in sinisteriolem peruium, & longum est: in dexteriori non est. Ideoq; cæcum nominatur. At id quod peruium est, late fusum, atq; sinuatum: minusq; quam superiora intestina nervosum: ab utraq; parte huc, atq; illuc uolutum: magis tamen sinisteriores, inferioresq; partes tenens: contingit iecur, atq; uentriculum. Deinde cum quibusdam membranulis à sinistro rene uenientibus iungitur: atq; hinc dextra recuruatim in imo dirigitur, qua excernit. ideoq; id ibi rectum intestinum nominatur. Contegit uero uniuersa hæc omnia ex interiore parte læue, & strictum: ex superiore mollius. Cui adeps quoq; innascitur: quæ sensu sicut cerebrum quoq; & medulla caret. At à renibus singulae uenæ calore albæ ad uesicam feruntur: où πύλονες graeci uocant: quod per eas inde descendentem urinam in uesicam distillare concipiunt. Vesica autem in ipso sinu nervosa, & duplex ceruice plena, atq; carnosissima iungitur per uenas cum intestino, eoq; osse, quod pubi subest. Ipsa soluta, atque liberior est: aliter in uiris, atq; in foeminis posita. Nam in uiris iuxta rectum intestinum est, potius in sinistra partem inclinata. In foeminis super genitale earum posita est: superq; elapsa ab ipsa uulua susinetur. Tum in masculis iter urinae spaciosius, & compressius à ceruice huius descendit ad colen. In foeminis breuius, & plenius super uulua ceruicem

Renes

Stomachus

Venter

Intestina

Uesica

Adeps

Uulua

se ostendit. Vulua autem in uirginibus quidem admodum exigua est. In mulieribus uero nisi ubi grauidæ sunt, non multo maior: quàm ut manus comprehendatur. Ea recta continuatq; ceruice, quæ analem uocant: contra mediam aluum orsa: inde paulum ad dexterio-rem coxam cõuertitur: deinde super rectum intestinum progressa, ilij foeminae latera sua innectit. Ipsa autem ilia inter coxas, & pubem imo uentre posita sunt: à quibus ac pube abdomen sursum uersus ad præcordia peruenit: ab exteriori parte euidenti cute, ab interiori leui membrana inclusum: quæ omento iungitur: tripitóreos autem à græcis nominatur.

De curationibus morborum, qui nascuntur à capite: & primo de eius dolore: deinde de morbo qui circa faciem nascitur: tum de linguae resolutione: postremo de destillatione, ac grauedine. Caput. II.

h

Is ueluti in conspectum quendam quatenus scire curanti necessarium est adductis, remedia singulariū laborantium partium exequar, orsus à capite. sub quo nomine nunc significo eam partem, quæ capillo tegitur. Nam oculorum, aurium, dentium dolor, & si q

similis est: alijs erit explicandus. In capite autem interdum acutus, & pestifer morbus est: quem *νεφελία* græci uocant. Cuius notæ sunt horror calidus, neruorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, uomitus: sic ut uox supprimatur, uel sanguinis ex naribus cursus: sic ut corpus frigescat, anima deficiat. Præter hæc dolor intolerabilis maxime circa tempora, uel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas: sed neq; grauis, neq; periculosa per hominis ætatem est. Interdum grauior dolor, sed breuis, neq; tamen mortiferus: qui uel uino, uel cruditate uel frigore, uel igne, aut sole contrahitur. Niq; omnes dolores modo in febre, modo sine hac sunt: modo in toto capite, modo in parte interdum, sic ut oris quoq; proximam partem excrucient. Præter hæc est unum inuenitur genus, quod potest longum esse. ubi humor cutē inflat, eaq; intumescit, et prementi digito cedit, *ὀφθαλμοειδὴς* græci appellant. Ex his, id quod secundo loco positum est, dum leue est: quasi ratione curandum, dixi: cum persequer ea, quæ sani homines in imbecillitate partis aliauius facere deberent. Quæ uero auxilia sunt capitis, ubi cum febre dolor est: eo loco explicatū est, quo febrim curatio exposita est. Nunc de cæteris dicendum: ex quibus id quod acutum est, et id quod supra consuetudinem intenditur: idq; quod ex subiecta causa, & si non pestiferum, tamen uehemens est: primâ curationem

l. l.

Affectus Capitis

Capitulum

Signo

Hydromela

LIBER

habet, quā sanguis mittatur. Sed id, nisi intolerabilis est dolor, sup̄ uā
 1 cum est. Satiūsq; est abstinere à cibo: si fieri potest, etiam à potione:
 2 si non potest, aquam bibere. si postero die dolor remanet, aluum du
 3 cere: sternutamenta euocare: nihil assumere, nisi aquā. sæpe enim dies
 unus, aut alter totum dolorē hac ratione discutit. utiq; si ex uino, uel
 cruditate origo est. si uero in his auxiliij parum est: tonderi oportet ad
 cutem. deinde considerandū est: quæ causa dolorem excitauit. si calor,
 aqua frigida multa perfundere caput expedit: spongiā concuā im
 ponere, subinde in aqua frigida expressā: ungere rosa, et aceto, uel
 potius his tinctā lanā succidā imponere: aliāq; refrigerantia
 cataplasmata. At si frigus nocuit: caput oportet perfundere aqua ca
 lida marina, uel certe salsa, aut in qua laurus decocta sit: tum caput
 uehementer perfricare: deinde calido oleo implere: ueste uelare. qui
 dam ē id deuinciunt. Alij cervicalibus uestimentisq; onerant: et sic le
 uantur. alios calida cataplasmata adiunant. Ergo ē ubi causa inco
 gnita est, uidere oportet refrigerantia magis, an calefacientia leniant:
 Et his uti, quæ experimentum approbarit. At si parum causa discer
 nitur: perfundere caput primū aqua calida, sicut supra præceptum
 est: uel salsa, uel ex lauro decocta. tum frigida posca. Illa in omni ue
 rusto capitis dolore communia sunt: sternutamenta excitare, inferiores
 partes uehementer perfricare: gargarizare his, quæ salinam mouent:
 cucurbitulas temporibus et occipitio ad mouere: sanguinem ex nari
 bus detrabere: resina subinde tempora peruellere: et imposito sinapi
 exulcerare ea, quæ male habent, ante linteolo subiecto, ne uehemen
 ter arrodāt: cidentibus feramentis ubi dolor est, ulcera excitare: cibū
 per modicum cum aqua sumere. ubi leuatus est dolor, in balneum ire:
 ibi multa aqua prius calida, deinde frigida per caput perfundi. Si
 discussus ex toto dolor est, etiam ad uinum reuerti: sed postea semper
 antequam quicquam aliud, aquam bibere. dissimile est id genus quod
 humorem in caput contrahit. In hoc tondere ad cutem necessarium
 est. deinde imponere sinapi, sic ut exulceret. si id parū profuit: scal
 pello utendum est. Illa cum hydropicis communia sunt, ut exerceatur:
 insudet: uehementer perfricatur: cibis, potionibusq; utatur, urinā præ
 cipue mouentibus.

De morbo, qui circa faciem nascitur: quem græci cynicum spasmodum uo
 cant.

Ita faciem uero morbus innascitur: quem græci uuvindor
 σπασμὸν nominant. Is cum acuta fere febre oritur. Os cū
 motu

*in uisguis in
 24. in 24. in 24.*

Con.

motu quodam peruertitur. ideoq; nihil aliud est, quàm distentio oris. Accedit crebra coloris in facie, totoq; corpore mutatio. somnus in promptu est. in hoc sanguinem mittere optimum est. Si finitum eo malum non est: ducere aluum. si ne sic quidem discussum est: albo ueratro uomitum mouere. præter hæc necessarium est uitare solem, lassitudinē, uinum. sed si discussum his non est: utendum est cursu, frictione in eo quod læsum est leni, & multa in reliquis partibus breuiore, sed uehementi. prodest etiam mouere sternutamenta: caput radere: idq; perfundere aqua calida, uel marina, uel certe salsa sic, ut ei quoq; sulphur adiiciatur. post perfusionem iterum perfricari: sinapi manducare: eo demq; tempore affectis oris partibus ceratum: integris idem sinapi, donec arrodat, imponere. Cibus aptissimus ex media materia est.

ay. salsa & sulphur

De resolutione lingue.

T si lingua resoluta est: quod interdum per se, interdum ex morbo aliquo fit sic, ut sermo hominis non explicetur: oportet gargarizare ex aqua: in qua uel thymum, uel hyssopū, uel nepeta decocta sit: aquam bibere: caput, et os, & ea quæ submento sunt, & ceruicem uehementer perfricare: laesere linguam ipsam: linere: manducare quæ sunt acerrima, idest sinapi, allium, cepam: magna ui luctari, ut uerba exprimantur: exerceri re tento spiritu: caput sæpe aqua frigida perfundere: nonnunquam multam esse radicula: deinde uomere.

De destillatione, ac grauedine.

Est illat autem humor ex capite interdum in nares: quod leue est. interdum in fauces: quod peius est. interdum et in pulmonem: quod pessimum est. Si in nares destillat: tenuis per has pituita profluit: caput leuiter dolet: grauitas eius sentitur: frequentia sternutamenta sunt. Si in fauces: has exasperat: tussiculam mouet. si in pulmonem: præter sternutamenta, & tussim, est etiam capitis grauitas, lassitudo, sitis, æstus, biliosa urina. Aliud autem quantum non multum distans malum grauedo est. hæc nares claudit: uocem obtundit: tussim siccam mouet: sub eadem salsa est salina: sonant aures: uenæ mouentur in capite: turbida urina est. Hæc omnia uox Hippocrates nominat. Nunc uideo apud grecos in grauedine hoc nomen seruari: destillationem uocant, uous appellari. Hæc autem & breuia, & si neglecta sunt, longa esse consue-

ingru

Gruuedo

Destillatio

Aurelij Cor.

g

runt. Nihil pestiferum est: nisi quod pulmonem exulcerauit. Vbi ali-
 quid eiusmodi sensimus: protinus abstinere à sole, balneo, uino, uenere
 debemus. Inter quæ unctione, & assueto cibo nihilominus uti licet. am-
 bulatione tantum acris: sed tecta utendum est: & post eam caput, atq;
 os supra quinquagies. perficiendum. Raroq; fit, ut si biduo, uel certe
 triduo nobis temperauimus: id uitium non leuetur. Quo leuato, si in
 desillatione crassa facta pituita est: uel in grauedine nares magis
 patent: balneo utendum est: multaq; aqua prius calida, post egelida so-
 uendum os, caputq;. deinde cum cibo pleniore uinum bibendum. At si
 æque tenuis die quarto pituita est: uel nares æque clausæ uidentur:
 assumendum est uinum amineu austerum: deinde rursus biduo aqua:
 post quæ ad balneum, & ad consuetudinem reuertendum est. Neq;
 tamen illis ipsis diebus, quibus aliqua omittenda sunt: expedit tan-
 quam egros agere. sed cætera omnia quasi sanis facienda sunt: præ-
 terquam si diutius aliquem, & uehementius ista sollicitare consueuerunt.
 Huic enim quædam curiosior obseruatio necessaria est. Igitur huic si
 in nares, uel in fauces desillauit: præterea quæ supra retuli: protinus
 primis diebus multum ambulandum est: perficienda uehementer in-
 feriores partes: leuior frictio adhibenda thoraci erit: leuior capiti. de-
 menda assueto cibo pars dimidia: sumenda oua, amyrum: similiaq;
 quæ pituitam faciunt crassiorem. Siti quanta maxime sustineri potest,
 pugnandum est. Vbi per hæc idoneus aliquis balneo factus, eoq; usus
 est: adiiciendus est cibo pisciculus, aut atro: sic tamen ne protinus iu-
 stus modus cibi sumatur. uino meraco copiosius utendum est. At si in
 pulmonem quoq; desillat: multoq; magis & ambulatione, & frictio-
 ne opus est. eademq; adhibita ratione in cibus, si non satis illi profi-
 ciunt: acrioribus utendum est. magis somno indulgendum: abstin-
 dumq; à negocijs omnibus. aliquando sed serius & balneum tentan-
 dum. In grauedine autem primo die quiescere: neq; esse: neq; bibere:
 caput uelare: fauces lana circumdare. postero die surgere. diu abstinere
 à potione, aut si res coegerit: non ultra heminam aquæ assumere. Ter-
 tio die panis non tam multum ex parte interiore cum pisciculo, uel
 leni carne sumere: aqua bibere. Si quis sibi temperare non potuerit,
 quo minus pleniore uictu utatur: uomere. Vbi in balneum uentum
 est, multa aqua calida caput, & os fouere usq; ad sudorem. tum ad ui-
 num redire post quæ uix fieri potest, ut idem incommodum maneat.
 sed si manserit, utendum erit cibus frigidus, aridis, leuibus, humore q;
 minimo: seruatis frictionibus, exercitationibusq;: quæ in omni tali ge-
 nere ualitudinis necessariae sunt.

Humi in:
culanda

Capite transitus ad cernicem est: quæ grauibus admodum morbis obnoxia est. neq; tamen alius importunior, acutiorq; morbus est: quam is qui quodam rigore nervorum, modo caput scapulis: modo mentu pectori annectit: modo rectam, et immobilem cernicem intendit. Priorè græci ὀπίσθ' ὀτορον, insequentem ἑμπόσθ' ὀτορον, ultimū τέταρον appellant. quamvis minus subtiliter quidam indiscretis his nominibus utuntur. ea sæpe intra quartū diem tollunt. Si hunc euaserunt: sine periculo sunt. Omnia eadem ratione curantur: idq; conuenit. Sed Asclepiades utiq; mittendum sanguinem credidit. Quod quidam uitandum esse dixerunt: eo quod maxime tum corpus calore egeret: isq; esset in sanguine. Verum hoc quidem falsum est. Neq; enim natura sanguinis est, ut utiq; caleat: sed ex his, quæ in homine sunt: hic celerrime uel calefcit: uel refrigescit. Mitti uero nec ne debeat, ex his intelligi potest: quæ de sanguinis missione præcepta sunt. Vtiq; autem recte datur castoreum: & cum hoc piper, uel laser. Deinde opus est fomento humido, & calido. Itaq; pleriq; aqua calida multa cernices subinde perfundunt. id in præsentia leuat. sed oportuniore nervos frigori reddit. quod utiq; uitandum est. Vtilius igitur est cerato liquido primum cernicem perungere: deinde admonere uestias, bubulas, uel utriculos oleo calido repletos, uel ex farina calidum cataplasma, uel piper rotundum cum fico contusum. Vtilissimum tamen est humido sale fouere. quod quomodo fieret, iam ostendi. Vbi eorum aliquid factum est, admonere ad ignem: uel si æstas est, in sole ægrum oportet, maximūq; oleo uetere: si id nō est, syriaco: si ne id quidem est, adipe quā uetustissima cernicem, & scapulas, & spinam perfricare. Frictio cum omnibus in homine uertebis utilis sit: cum is præcipue quæ in collo sunt. Ergo die, nocteq; interpositis tamen quibusdam temporibus hoc remedio utendum est. Dum id intermittitur, imponendum malagma aliquod ex calefcientibus. cauendum uero præcipue frigus. Ideoq; in eo conclauis, quocubabit æger: ignis continuus esse debet: maximūq; tempore ante hiæmno: quo præcipue frigus intenditur. Neq; inutile erit caput attonsum habere: idq; irino, uel cyprino calido madefacere: & super imposito pilleo uelare. nonnunquam et in calidum oleū totum desandere: uel in aquam calidam: in qua foenum græcum decoctum sit: & adiecta olei pars tertia. Alius quoq; dicta sæpe superiores partes resoluit. Si uero etiam uehementius dolor creuit: admonendæ cernicis acurbitulæ sunt sic, ut cutis incidatur: eadem aut feramentis, aut

ad hunc finem =
humidum.

Cum hoc

per frictum
multa opus

sinapi adurendæ. Vbi leuatus est dolor, moueriq; ceruix cœpit, scire licet cedere remedijs morbum. Sed diu uitandus cibus, quisquis mandendus est. Sorbitionibus utendum: itemq; ouis sorbilibus: aut à pullis mollibus ius aliquod assumendum. id si bene processerit: iamq; ex toto recte se habere ceruices uidebuntur: incipiendum erit à pulticulâ, uel intrita bene madidâ. Celerius tamen etiâ panis mandendus, quàm uinum gustandum. si quidem huius usus præcipue periculosus: ideoq; in longum tempus differendus est.

De faucium morbis, ac curationibus: Et primum de angina, deinde de difficultate spirandi: ultimo de tussi. Caput. IIII.

Angina

T hoc autem morbi genus circa totam ceruicem, sic alterius æque pestiferum, acutumq; in faucibus esse consuevit: nâseri anginam uocant. apud græcos nomen prout species est. Interdû enim neq; rubor, neq; tumor ullus apparet: sed corpus aridum est: uix spiritus trahitur: membra soluantur. id ουράχιν uocant. Interdum lingua, faucesq; cum rubore intumescunt: uox nihil significat. oculi uertuntur. facies pallet. singultusq; ē: id ουράχιν uocatur. Illa communia sunt, æger non cibum deuorare: nō potionem potest: spiritus eius includitur. Lenius est ubi tumor tantummodo et rubor est: cetera non sequuntur: id πρᾶουράχιν appellant. Quicquid est, si uires patiuntur, sanguis mittendus est. si non abundat: secundum est ducere aluum. Cucurbitula quoq; recte sub mento, et circa fauces admoetur: ut id quod strangulat, euocet. Opus est deinde fomentis humidis. nam sicca spiritum elidunt. Ergo admonere spongias oportet: quæ melius in calidum oleum: quàm in calidam aquam subinde demittuntur. Efficacissimusq; est hic quoq; salis calidi succus. Tum commodum est hyssopum, uel nepeta, uel thymum, uel absinthium, uel etiam furfures, aut ficus aridas, aut mulsam aquam decoquere: eaq; gargarizare. post hæc palatum ungere uel felle taurino, uel eo medicamento, quod ex moris est. polline etiam piperis id recte respergitur. si per hæc parum proficitur, ultimum est incidere satis altis plagis sub ipsis maxillis supra collum, et in palato citra unam uel eas uenas, quæ sub lingua sunt: ut per ea uulnera morbus erumpat. quibus si non fuerit æger adiutus: scire licet malo uictum esse. si uero his morbus leuatus est: iamq; fauces, et cibus, et spiritum capiunt: facili ad bonā ualeitudinē recursus est. Atq; interdum natura quoq; adiuvat: si ex angustiore sede uitium transit in latiore. Itaq; rubore, et tumore in præcordijs orto, scire licet fauces liberari.

Quicquid



Quicquid autem eas leuabit, incipiendum est ab humidis, maximèq;
 aqua mulsæ decocta: deinde assumendi molles, et nō acres cibi sunt: do-
 nec fauces ad pristinū habitum reuertantur. Vulgo audio si quis pul-
 lum hirundinis ederit: angina toto anno non periclitari. seruatumq;
 eum ex sale cum is morbus urget: comburi, carbonemq; eius contritū
 in aquam mulsam: quæ potui datur: in fricari, et prodesse. Id cum ido-
 neos authores ex populo habeat: neq; habere quicquam periculi possit,
 quanuis in monumentis medicorum non legerim: tamen inferendum
 huic operi meo credidi.

De difficultate spirandi.

St etiā circa fauces malum, quod apud græcos aliud, atq;
 aliud nomen habet: prout se intendit. Omne in difficul-
 tate spirandi cōsistit. Sed hæc dum modica est, neq; ex toto
 strangulat: *σπασμο* appellatur. Cum uehementior est, ut
 spirare æger sine sono, et anelatione non possit, *σπασμα*. Cū accessit id
 quoq; ne nisi recta cernice spiritus trahatur, *σπασμο*. Ex quibus id,
 quod primum est, potest diutius trahi. Duo in se quentia acuta esse con-
 suerunt. His communia sunt, quod propter angustias, per quas spiri-
 tus euadit: sibilum elidit: dolor in pectore, præcordijsq; est: interdum
 etiam scapulis: isq; modo decedit: modo reuertitur. ad hæc iussicula
 accedit. Auxilium est, nisi aliquid prohibet: in sanguinis detractio-
 ne. Neq; id satis est: sed tacte quoq; ueter soluedus est. Liquanda alius: in-
 terdum etiā ducenda. quibus extenuatum corpus incipit spiritum tra-
 here commodius. Caput autem et in lecto sublime habendum est. tho-
 rax fomentis, cataplasmatib; calidis, aut siccis, aut etiam humidis ad-
 iuuandus est: et postea uel malagma super imponendū: uel certe cera-
 tum ex cyprino, uel irino unguento. Sumenda deinde ieiuno potui
 mulsæ aqua: cum qua uel hyssopus cocta, uel contrita capparis radix
 sit. Datur et utiliter aut nitrum, aut nasturciū, frictum alliu, deinde
 contritū, et cum melle mixtum: simulq; coquatur mel, galbanū, resina
 terebinthina: et ubi coierunt ex his quod fabæ magnitudinē habet,
 cottidie sub lingua liquatur. aut sulphuris ignem nō experti, pondo et
 quadrans abrotani pondo in uini cyatho teruntur: idq; tepesfactum
 sorbetur. Est et non uana opinio uulpinū iecur, ubi sicum et aridum
 factum est: contundi oportere: polentamq; ex eo potioni aspergi: uel
 eiusdem pulmonē quā recentissimum assum, sed sine ferro coctum,
 edendū esse. Præter hæc sorbitionibus, et lenibus cibis utendū est. in-
 terdum uino tenui austero: nonnunquā homitu. Prosunt et quæcunq;

Aurelij Cor.

g iiij

LIBER

urinam augent. sed nihil magis quam ambulatio lenta penè usq; ad lassitudinem, frictio multa præcipue inferiorum partium uel in sole, uel ad ignem, & per se ipsum, & per alios usq; ad sudorem. In interiore uero faucium parte interdum exulceratio esse consuevit. In hac pleriq; extrinsecus cataplasmatibus calidis, fomentisq; humidis utuntur. Volunt etiam uaporem calidum ore recipi: per quæ molliores alij partes eas fieri dicunt: oportunioresq; uitio iam hærenti. sed si bene scuitari morbus potest: tuta illa præsidia. si metus eius est, supernuacua sunt. Vtiq; autem perfricare fauces periculosum est. exulcerat enim, neq; utilia sunt quæ urinae mouendæ sunt apta: quia possunt, dum transeunt, ibi quoq; pituitam extenuare: quam suppressi melius est. Asclepiades multarum rerum, quas ipsi quoq; secuti sumus: auctor bonus, acutum ait quàm acerrimum esse sorbendum. Hoc enim sine ulla noxa comprimit ulcera sed id suppressere sanguinem potest: ulcera ipsa sanare non potest. Melius huic rei licitum est: quod idem quoq; æque probat, uel porri, uel marrubij succus, uel nuxes græcæ cum trachanto contritæ, & cum passo mixtæ, uel lini semen contritum, & cum dulci uino mixtum. exercitatio quoq; ambulandi, currendiq; necessaria est. Frictio à pectore uehemens toti inferiori parti adhibenda. Cibi uero esse debent neq; nimium acres, neq; asperi: mel, lenticula, tragum, lac, ptisana, pinguis quoq; citro, præcipueq; porri, et quicquid cum hoc mixtum est. Potionis quàm minimum esse conuenit. A qua dari potest, uel pura, uel in qua malum cydoneum, palmulæ uel decoctæ sunt. Gargarizationes quoq; lenes. sin hæ parum proficiunt, reprimentes utiles sunt. Hoc genus neq; acutum est: & potest esse non longum. curationem tamen maturam, ne uehementer, & diu lædat: desiderat.

De tussi.

Vssis uero ferè propter faucium exulcerationem molestus est: quæ multis modis contrahitur. Itaq; illis restitutis ipsa finitur. Solet tamen interdum per se quoq; male habere: & nix cum uetus facta est, eliditur. ac modo arida est: modo pituitam citat. Oportet hyssopum altero quoq; die bibere. spiritum retento currere: sed minime in puluere, ac lectione uti uehementi. quæ primo impeditur à tussi, post eam uincit. tum ambulare: deinde per manus quoq; exerceri: & pectus diu perfricare. Post hæc quàm pinguisimæ ficius uncias tres supra prunas incoctas esse. Præter hæc si humida est, prosunt frictiones ualidæ cum quibusdam calefacientibus sic, ut arput quoq; sicutum uehementer perfricetur. Item cu-

*Asclepiades
multam omnem
aut per bonum.*

curbitulae pectori admotae. sinapi ex parte exteriori faucibus impositum: donec leuiter exulceret. potio ex menta, nucibusq; graecis, & amylo: primoq; assumptus panis aridus: deinde aliquis cibus lenis. At si sicca tussis est, cum ea uehementissime urget: adiuuat uini austeri cyathus assumptus: dum ne amplius id interposito tempore aliquo, quam ter, aut quater fiat. Item laseris quam optimi paulum deuorare opus est: porri, uel marrubij succum assumere: scylla delingere: acetum ex ea uel certe acre sorbere: aut cum spica alij contriti duos uini cyathos. Vtilis etiam in omni tussi est peregrinatio, navigatio longa, loca maritima, natationes. Cibus interdum mollis, ut malua, ut urtica. interdum acer, ut lac cum allio coctum. sorbitiones quibus laser sit adiectum: aut in quibus porrum incoctum tabuerit: omnium sorbile sulphure adiecto: potui primum aqua calida, deinde inuicem alijs diebus haec, alijs uinum. Magis terreri potest aliquis cum sanguine expuit. sed id modo minus, modo plus periculi habet. Exit enim modo ex ginguis, modo ex ore. & quidem ex hoc interdum etiam copiose, sed sine tussi, sine ulcere sine gingivarum ullo uitio: ita ut nihil excreetur. Verum ut ex naribus, sic ex ore aliquando prorumpit. Atq; interdum sanguis profluit: interdum simile aquae quiddam, in qua caro recens lota est. Nonnunquam autem is a summis faucibus fertur: modo exulcerata ea pte, modo non exulcerata: sed aut ore uenae alicuius ad aperto, aut tuberculis quibusdam natis ex his sanguine erumpente. quod ubi incidit, neq; laedit potio aut cibus: neq; quicquam aut ex ulcere excreatur. aliquando gutture, & arterijs exulceratis, frequens tussis sanguinem quoq; extundit. Interdum etiam fieri solet, ut aut ex pulmone, aut ex pectore, aut ex latere, aut ex iocinere feratur. Saepem foeminae quibus sanguis per menstrua non respondet: hunc expiunt: authoresq; medici fuerunt, uel ex ea parte aliqua sanguinem exire: uel rupta, uel ore alicuius uene patefacto. Prima διαβρωσις, secundam πρώτη αιμορροια, tertiam αιμασις μοιρα appellat. ultima minime nocet. prima grauissima. Ac saepe quidem euenit, uti sanguinem pus sequatur. interdum autem qui sanguinem ipsum suppressit, satis ad ualitudinem profuit. Sed si secuta ulcera sunt: si pus, si tussis est, pro ut sedes ipsa est: ita uaria, et periculosa genera morborum sunt. Si uero sanguis tantum fluit: expeditius, & remedium, & finis est. Neq; ignorari oportet eis, quibus fluere sanguis solet, aut quibus spina dolet, coxae uel, aut post cursum uehementem, uel ambulationem: dum febris absit: non esse inutile sanguinis mediocre profluuium. idq; per urinam redditum ipsam quoq; lassitudinem soluere. Ac ne in eo quidem terribile esse, qui ex superiore loco decedit. si tamen in eius urina nihil ponabit. Neq;

uomitum huius afferre periculum etiā cum repetit, si ante confir-
 re & implere corpus licuit: & ex toto nullū nocere: qui in corpore
 robusto neq; nimius est: neq; tussim, aut calorem mouet. Hæc pertinent
 ad uniuersum. Nunc ad ea loca, quæ proposui, ueniam. Si ex gingiuis
 exit, portulacam manducasse satis est. si ex ore, continuisse eo merum
 uinum. si parum id proficit, acetum. si inter hæc quoq; grauiter erum-
 pit, quia consumere hominem potest: commodissimum est: impetum eius
 admota occipitio cucurbitula sic, ut cutis quoq; incidatur: auertere. Si
 id mulieri cui menstrua non feruntur, euenit: eandem cucurbitulam
 inasis inguinibus eius admoere. At si ex faucibus, interioribusue
 partibus processit, & metus maior est: et cura maior adhibenda. San-
 guis mittendus est: & si nihilominus ex ore processit, iterum, tertioq;
 & cotidie paulum aliquid: protinus autem debet sorbere uel acetum,
 uel etiam cum thure plantaginis, aut porri succum. imponendaq; ex-
 trinsecus supra id quod dolet, lana succida ex aceto est: & id spongia
 subinde refrigerandum. Erasistratus horum crura quoq; et femora,
 brachiaq; pluribus locis deligabat. Id Asclepiades adeo nō prodesse,
 ut etiam inimicum esset: proposuit. Sed id sæpe commode respondere
 experimenta testantur. Neq; tamen pluribus locis deligari necesse est.
 sed sat est infra inguina, & super talos, summosq; humeros, etiam
 brachia. Tum si febris urget, danda est sorbitio et potui aqua: in qua
 aliquid ex his, quæ aluum astringunt: decoctum sit. at si abest febris,
 uel elota alicui, uel panis ex aqua frigida, & mole quoq; ouum dari
 potest potui: uel idem quod supra scriptum est: uel uinum dulce, uel
 aqua frigida: sed sic bibendum erit, ut sciamus huic morbo sitim pro-
 desse. præter hæc necessaria sunt quies, securitas, silentium. Caput hu-
 ius quoq; cubātus sublime esse debet: recteq; tondetur. Facies sæpe aqua
 frigida fouenda est. At inimici sunt uinum, balneum, uenus. in cibo
 oleum, acris omnia. item calida fomenta. conclaue calidum, & inclu-
 sum. multa uestimenta corpori iniecta. etiam frictiones ubi bene etiā
 sanguis conquieuit. Tum uero incipiendum est à brachijs, cruribusq;
 à thorace abstinendum. In hoc casu per hyemem locis maritimis, per
 æstatem mediterraneis opus est.

De stomachi morbis, & curationibus. Caput. V.

f Auibus subest stomachus: in quo plura longa uitia inci-
 dere consueverunt. Nam modo ingens calor, modo inflatio
 hunc, modo inflammatio, modo exulceratio afficit. Inter-
 dum pituita, interdum bilis oritur. frequentissimumq;
 est eius

est eius malum quo resoluitur: neq; ulla re magis aut afficitur: aut corpus afficit. Vt diuersa autem uitia eius, sic etiā remedia sunt. Vbi ex-
aestuat, aceto cū rosa extrinsecus subinde fouendus est. imponendusq;
puluis cum oleo, & ea cataplasmata, quæ simul & reprimunt: &
moliunt. Potui, nisi quid obstat: gelida aqua praestanda. Si inflatio est,
pro sunt admotæ cucurbitulæ: neq; incidere cutem necesse est. pro sunt
siccæ, & calida fomenta, sed non uehementissima. Interponenda absta-
nentia est. Vtilis in ieiunio potio est absinthij, aut hyssopi, aut rutæ.
Exercitatio primo lenis, deinde maior adhibenda est: maximeq; quæ
superiores partes moueat. quod genus in omnibus stomachi uitij
apertissimum est. Post exercitationem opus est unctione, frictione: balneo
quoq; nonnunquam, sed rarius: interdum alui ductione. Cibis deinde
calidis, neq; inflatibus. eodemq; modo calidis potionibus: primo aquæ:
post ubi resedit inflatio: uini austeri. Illud quoq; in omnibus stomachi
uitij præcipiendum est, ut quo modo se quisq; aeger refecerit: eo ut sa-
nus utatur. Nam redit huic imbecillitas sua: nisi hīdem defendatur
bona ualeitudo, quibus reddita est. At si inflatio aliqua est: quæ ferè
tumor, & dolor sequitur: prima sunt quies, & abstinentia. Lana sul-
phurata circumdata: in ieiunio absinthium. si ardor stomachum ur-
get, aceto cum rosa subinde fouendus est: deinde cibis quidem utendū
est modicis. Imponenda uero extrinsecus quæ simul & reprimunt: et
moliunt. deinde his detractis utendum calidis ex farina cataplasma-
tis: quæ reliquas digerant. Interdum alui ducenda. Adhibenda exer-
citatio, & abusus plenior. At si exulceratio stomachum infestat, eadem
ferè facienda sunt, quæ in faucibus exulceratis præcepta sunt. Exer-
citatio, frictio inferiorum partium adhibenda. Adhibendi leues, &
glutinosi cibi, sed citra sacietatem. Omnia acria, atq; acida remouen-
da. Vino, si febris nō est, dulci: aut si id inflat, certe leni utendum, sed
neq; præfrigido, neq; nimis calido. Si uero pituita stomachus impletur:
necessarius modo in ieiunio, modo post cibum uomitus est. Vtilis exer-
citatio, gestatio, nauigatio, frictio. Nihil edendum, bibendumq; nisi cali-
dum: uitatis tantum his, quæ pituitam contrahere consueverunt. Mole-
stus est: si stomachus bile uitiosus est. Solent autem hi qui sic tentan-
tur: interpositis quibusdam diebus hanc, & quidem quod pessimum
est, atram mouere. His recte alui ducitur. potiones absinthio dan-
tur. necessaria gestatio nauigatio est, si fieri potest ex nausea uomitus.
uitenda cruditas. sumendi cibi faciles, & stomacho non alieni. uini
austerum. Vulgarissimum uero, pessimumq; stomachi uitium est resolu-
tio: id est cum cibi non tenax est: soletq; desinere ali corpus: ac sic tabe
consumi. Huic generi inutilissimum balneum est. Lectiones exercitatio-

Exulceratio

Inflatio

Inflatio

Exulceratio

Abusus ciborum

Bilis abusus

Resolutio

LIBER

ionesq; superioris partis necessariae. Itē unctiones, frictionesq; his perfundi frigida, atq; in eadem natate: canalibus eiusdem subycere etiam stomachū ipsum, & magis etiam à scapulis, id quod contra stomachū est. Consistere in frigidis, medijs capitisq; fontibus quales cutiliarū, symbruinarumq; sunt: salutare est. Cibi quoq; assumendi sunt frigidi: qui potius difficulter coquuntur: quàm facile uitiuntur. Ergo pleriq; qui nihil aliud concoquere possunt: bubulam coquunt. Ex quo colligi potest, neq; auem, neq; uenationem, neq; piscem dari debere: nisi generis durioris. Potui quidem aptissimum est uinum frigidum, uel certe bene calidum meracum: potissimum rheticum, uel allobrogicum: aliud uel, quod & austerum, & resina conditum est. si id non est: quàm asperum, maximèq; signinum. Si cibus non continetur, danda aqua: & eliciendus plenior uomitus est: iterumq; dandus cibus, & tum admodum duobus intra stomachum digitis cucurbitula: ibiq; duabus, aut tribus horis continendae sunt. Si simul & uomitus, & dolor est, imponenda supra stomachum est lana succida, uel spongia ex aceto, uel cataplasma, quod refrigeret. Perfricanda uero non diu, sed uehementer brachia, & crura: & calefacienda. Si plus doloris est, infra praecordia quatuor digitis cucurbitula utendum est: protinus dandus panis ex posca frigida. Si non continuit: post uomitum lene aliquid ex his, quae non aliena stomacho sint. Si ne id quidem tenuit: singuli cyathi uini, singulis interpositis horis, donec stomachus consistat. Valens etiam medicamentum est radicle si. atus, ualencius acidi punici mali compari modo succi, qui ex dulci punice malo est: adiecto etiam intubi succo, & menta: sed huius minima parte: quibus tantundem quantum in his omnibus est aquae frigidae, quàm optime miscetur. Id enim plus quàm uinum ad comprimendum stomachum potest. Supprimendus autem uomitus est, qui per se uenit sic, si nausea est. Sed si coacuit intus, cibus aut computruit: quorum utrumlibet ructus estendit: eijciendus est: protinusq; cibus assumptis hisdem, quos proxime posui: stomachus restituendus. Vbi sublatus est praesens metus, ad ea redeundum est: quae supra praeccepta sunt.

De laterum doloribus. Caput. VI.

Plurises.

Stomachus lateribus cingitur: atq; in his quoq; uehementes dolores esse consueverunt. & initium uel ex frigore, uel ex ictu, uel ex nimio cursu, uel ex morbo est. Sed interdum ne malum intra dolorem est: usq; modo tarde, modo celeriter soluitur. interdum ad perniciem quoq; procedit. oriturq; acu-

ius morbus, qui *καταπνιγος* à græcis nominatur. Huic dolori lateris febris, & tussis accedit. & per hanc excreatur: si tolerabilis morbus est: pituita si grauis sanguis. Interdum etiam sicca tussis est: quæ nihil emollitur. idq; primo uitio grauius: secundo tolerabilius est. Remediũ uero est magni, & recentis doloris sanguis missus. At siue lenior, siue uetustior casus est: uel superuacuum, uel serum id auxilium est. confugiendũq; ad cucurbitulas est, ante summa cute incisa. Recte et sinapi ex aceto super pectus imponitur: donec ulcera, pustulasq; excitet: & tum medicamentum, quod humorem illuc citet. Præter hæc circundare primum oportet latus absolantæ sulphurata. deinde cum paulum inflammatio se remittit: siccis, & calidis fomentis uti. Ab his trã situs ad malagmata est. Si uetustior dolor remanet: nouissime resinas imposita discutitur. Utendum cibis, potionibusq; calidis. uitandum frigus. Inter hæc tamen non alienum & extremas partes oleo, & sulphure perfricare. Si leuata tussis est: leni lectione uti. iamq; & acres cibos, & uinum meracius assumere. quæ à medicis præcipiuntur: ut tamen sine his rusticos nostros epota ex aqua herba trixago satis adiuuet. Hæc in omni lateris dolore communia sunt. plus negotij est, si acutus quoq; morbus is factus est. In hoc præter ea quæ supra posita sunt, hæc animaduertenda sunt, ut cibus sit quàm maxime tenuis, & lenis. præcipueq; sorbitio: eaq; ex pituita potissimum, aut ius in quo porrus cum pullo gallinaceo coctus sit. Idq; non nisi tertio quoq; die detur: si tamen per uires licebit. potui uero aquamulsa, in qua hyssopum, aut ruta decocta sit. quæ quibus temporibus danda sint: ex ratione uel adiectæ, uel leuata febris apparebit sic, ut in remissione quàm maxima dent: cum eo tamen, ut sciamus non esse eius generis tussi aridas fauces committendas. sæpe enim ubi nihil est quod excreatur: continuatur, & strangulat. Ob quam causam dixi etiam prius id genus esse tussis: quod nihil, quàm quod pituitam moueret. Sed hic uinum sorbere, ut supra præcepimus: morbus ipse non patitur. inuicem eius cremor pituitæ sumendus est. Ut his autem in ipso morbi feruore sustinendus æger est: sic ubi paulum is se remittit: alimenta pleniora, & uini quoq; aliquid dari potest. dum nihil detur, quod aut refrigeret corpus, aut fauces asperet. Si in refectione quoq; manserit tussis, intermittere oportebit uno die: posteroq; cum cibo uini paulo plus assumere. atq; incipiente quoq; tussi tum non erit alienum, ut supra quoq; positum est: uini cyathos sorbere. Sed in hoc genere ualentudinis dulce, uel certe lene commodius est. Si malum inueterauit, athletico uictu corpus firmandum est.

Canisio.

*Trippago f.
C. S. S. S.*

LIBER.

De uiscerum morbis: & primo de pulmone, deinde de iocinere, tum de liene, postremo de renibus. Caput. VII.

Pulmo

Compagine uero corporis ad uiscera transeundū est: & in primis ad pulmonem ueniendum: ex quo uehemens & acutus morbus oritur, quem *πνεύμων* uocant. græci uocant. eius hæc conditio est: Pulmo totus afficitur. hunc eius casum subsequitur tussis: bilem, uel pus trahens: præcordiorū totiusq; pectoris grauitas: spiritus difficultas, magna febres, continua uigilia, cibi fistidium, tabes. Id genus morbi plus periculi, quàm doloris habet. Oportet si satis ualida uires sunt, sanguinem mittere: si minores, cucurbitulas sine ferro præcordijs admoouere. Tum si satis ualet, gestando ægrum digerere: si parum, intra domum tamen dimouere. Potionem autem hyssopi dare, cui ficus arida sit incocta: aut aquam mulsam, in qua uel hyssopum, uel ruta decocta sit. Frictione uti diutissime in scapulis: proxime ab his in brachijs, & pedibus, & cruribus, leuiter contra pulmonem. idq; bis cotidie facere. Quod ad cibum uero pertinet: huic nec salsis opus est, neq; acribus, neq; amaris, neq; aluum astringentibus: sed paulo lenioribus. Ergo primis diebus danda est sorbitio ptisanæ, uel alicæ, uel orizæ: cum qua recens adeps cocta sit. Cū hac sorbile ouum, nuclei pinei ex melle. panis, uel elota alicæ ex aqua mulsa. potui deinde non solum pura aqua, sed etiam mulsa egelida, aut si æstas est, etiam frigida: nisi quid obstat. hæc autem altero quoq; die incrementum morbo dare satis est. Vbi incrementum constitit quantum res patitur, ab omnibus abstinendum est: præterquam aqua egelida. Si uires defunt, adiuuandæ sunt aqua mulsa. profuntq; aduersus dolores imposita calida fomenta, uel ea quæ simul & reprimunt, & emolliunt. Prodest impositus super pectus sal bene contritus, cum cerato mixtus, quia leuiter cutem erodit: coq; impetum materiæ, quo pulmo uexatur: euocat. Vtile etiam aliquod magma est ex his, quæ materiam trahunt. Neq; alienum est dum premit morbus, clausis fenestris ægrum continere. Vbi paulum leuatus est, ter, aut quater die fenestris aliquanto apertis paruum ærem recipere. Deinde in refectioe pluribus diebus à uino abstinere. gestatione, frictione uti. sorbitionibus, & prioribus cibis adijcere ex oleribus porrum, ex carne ungulas, & summa trunculorum, atq; pisciculos sic, ut diu nihil molle, & lene sumatur.

Lecur

Lterius quoq; uisceris morbus idest iocineris æque modo
 longus, modo acutus esse consuevit: h̄ t̄at̄i n̄d̄v gr̄aci uocāt.
 Dextra parte sub præcordijs uehemens dolor est. idemq;
 ad latus dextrum, & ad iugulum, humerumq; partis
 eiusdem peruenit. nonnuq; manus quoq; dextra torquetur. horror
 calidus est. Vbi male est, bilis euomitur. interdū singultus propē stran-
 gulat. & hæc quidem acuti morbi sunt. Lōgioris uero ubi suppuratio
 in iocinere est: dolorq; modo finitur: modo intenditur: dextra parte
 præcordia dura sunt: & tument. post cibum maior difficultas est. acci-
 dit maxillarum quædam resolutio. ubi inueterauit malum, uenter et
 crura, pedesq; intumescunt: pectus, atq; humeri, circaq; iugulū utrunq;
 extenuatur. Initio sanguinem mittere optimum est. tum uenter soluens
 est: si non potest aliter, per nigrum ueratrum imponenda extrin-
 secus cataplasmata, primum quæ reprimant: deinde calida, quæ de-
 ducant. q̄bus recte iris, uel absinthium adiçitur: post hæc malagma.
 Danda uero sorbitiones sunt: omnesq; cibi, & calidi, & qui non mul-
 tum alant: & ferē qui pulmonis quoq; dolori conueniunt: præterq;
 eos, qui urinam mouent: potionesq; ad id efficaces. Vtilia in hoc mor-
 bo sunt thymum, satyria, hyssopum, nepeta, amyllum, sisamum, lauri
 bacca, pini flos, herba sanguinalis, menta, ex malo cotoneo medium, co-
 lumbæ iecur recens, & crudum. Ex quibus quædam per se esse, quæ-
 dam adijcere uel sorbitioni, uel potioni licet: sic tamen ut parce assu-
 mantur. Neq; alienum est absinthium contritum ex melle, et pipere:
 eiusq; catapotium cotidie deuorare. abstinendum utiq; est, ab omni-
 bus frigidis: neq; enim res ulla magis iecur lædit. Frictionibus uten-
 dum in extremis partibus. uitandus omnis labor: omnis uehementior
 motus. ne spiritus quidem diutius continendus est. Ira, trepidatio, pon-
 dus, ictus, cursus inimici sunt. Perfusio corporis multa prodest ex
 aqua: si hyems est, calida: si æstas, tepida. Item liberalis unctio: & in
 balneo sudor. Si uero iecur uomica laborat, eadem facienda sunt, quæ
 in cæteris interioribus suppurationibus. Quidam etiam contra id
 scapello aperiunt: ipsam uomicam adurunt.

lecur columba

*frigidus lecur
lædit.*

Lien

T lienis ubi affectus est, intumescit: simulq; cum eo pars si-
 nistra, eaq; dura est: & prementi renititur: uenter intentus
 est: aliquis etiam cruribus tumor est. Vlcera aut omnino nō

LIBER

sanescunt: aut certe cicatricem uix recipiunt. In intentā ambulatione, cur suq; dolor, et quādam difficultas est. hoc uitium quies auget. Itaq; exeratione, et labore opus est: habita tamen ratione ne febre mixta si nimium prociesserit, excitetur. Vnctiones, frictionesq; et sudores necessarij sunt. Dulcia omnia inimica sunt. item lac, et caseus. Acida autem maxime conueniunt. Ergo acetum acre per se sorbere, et magis etiam quod scylla conditum est: expedit. Edenda sunt salsamenta, uel olea ex muria dura: tincta in aceto lactuca, intubiq; et betia ex eodem. ex sinapi asparagus, armoracia, pastinaca, unguis, rostra, aues marie, eiusdem generis uenatio. Potui uero ieiunio dari debet ab sinthium incoctum. at post cibum aqua à ferrario fabro: in qua candens ferrum subinde tinctum sit. Hæc enim uel præcipue lienem coerycet: quod animaduersum est in his animalibus: quæ apud hos fabros educata, exiguos lienes habent. potest etiam dari uinum tenue, austerrum: omniaq; in cibis, et potionibus, quæ urinae mouenda sunt: præcipueq; ad id ualet uel trifolij semem, uel cuminum, uel apium, uel serpillum, uel citisus, uel portulaca, uel nepeta, uel thymum, uel hyssopum, uel satureia. hæc enim inde commodissime uidentur humorem deducere. Lienis quoq; bubulus utiliter esui datur: præcipueq; eructa, et nasturcium lienem extenuant. Imponenda quoq; extrinsecus sunt quæ leuent. Fit ex unguento, et palmulis, quod $\mu\rho\rho\beta\alpha\lambda\alpha\nu\omicron\rho$ graeci uocant. Fit ex lini, et nasturcij semine, quo uinum, et oleum adiicitur. fit ex cupresso uiride, et arida ficu. fit ex sinapi, cui seui hirquini à renibus quarta pars ponderis adiicitur: teriturq; in sale, et protinus imponitur. Multisq; modis huic rei apparari aptum est. Nam et ipsum cum cibo assumere, et muriam eius cum aceto sorbere, commodum est. Quin et extrinsecus radicem contritam, uel corticem eius cum furfuribus, aut ipsum apparari cum melle contritum imponere expedit. Malagmata quoq; huic rei aptantur.

De renum morbis, et curationibus. Caput. X.

Renes ubi affecti sunt: diu male habent. Peius est si frequens biliosus uomitus accedit. Oportet conuiescere: cubare molliter: soluere aluum si aliter non respondet, etiam ducere. Sæpe desiderare in aqua calida: neq; cibum, neq; potionem frigidam assumere. abstinere ab omnibus salsis, acerbis, acidis pomis: bibere liberaliter: adijcere modo cibo, modo potioni piper, porrum, ferulā, album papauer: quæ maxime inde urinam mouere conserunt. Auxilio quoq; his exulceratis sunt, si adhuc ulcera purganda

sunt: cucumeris semina detractis corticibus sexaginta, nuclei ex pinis siluestri duodecim, anesi quod tribus digitis sumi possit: croci paulū, cōtrita et in duas mulsū potiones diuisa. si uero dolor tantū lenādus est: eiusdē cucumeris semina triginta, ijdē nuclei uiginti, noces græce quiq; croci paululū, contrita, et cū lacte potui data. At sup quoq; recte quædā malagmata inijciuntur: maximeq; ea quæ humori extrahendo sunt.

De intestinorum morbis, et primo de cholera. Caput. XI.

Visceribus ad intestina ueniē dum est: quæ sunt et acutis, et longis morbis obnoxia. Primo æque facienda mentio est cholera: quia cōe id stomachi, atq; intestinorum uitii uideri potest. Nam simul et deiectio, et uomitus est: præterq; hæc inflatio est: intestina torquentur: bilis supra, infraq; erumpit: primum aquæ similis: deinde ut in ea recens atro lota esse uideatur: interdum alba: nonnunquam nigra, uel uaria. Ergo eo nomine morbi hunc *Χολέρα* græci nominarunt. præter ea uero, quæ supra cōprehensa sunt: sepe et crura, manusq; contrahuntur: urget sitis: anima deficit: quibus concurrentibus non mirū est, si subito quis moritur: neq; tamen ulli morbo minori momento succurritur. Protinus ergo ubi ista coeperunt: aquæ tepidæ quā plurimum bibere oportet: et uomere. Vix unquam sine uomitu sequitur: sed et si non incidit: misuisse tamē nouam materiā corruptæ prodest: parsq; sanitatis est uomitum esse suppressum. si id incidit: protinus ab omni potione abstinendum est. si uero tormina sunt: oportet frigidis, et humidis fomentis stomachum fouere: uel si uenter dolet: hisdem egelidis sic, ut uenter ipse mediocriter calentibus inuuetur. Quod si uehementer et uomitus, et deiectio, et sitis uexant: et adhuc subcruda sunt, quæ uomuntur: nondū uino maturum tempus est. Aqua, neq; ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est. admoendūq; naribus est puleiū ex aceto: uel polenta uino aspersa: uel menta secundū naturam est. At cū diffusæ cruditates est: tum magis uerendū est, ne anima deficiat. Ergo tum confugiendum est ad uinū: id esse oportet tenuē, odoratū, cū aqua frigida mixtum: uel polenta adiecta, uel melle quoq; assumere expedit: quotiensq; aliquid aut stomachus, aut uenter effudit: totiens p hæc uires restituere. Et a sinistra primo tribus uini guttis, aut quinīs aspergendā potionem esse dixit: deinde paulatim merū adiiciendū. Is si et ab initio uinū dedit: et merū cruduitatis secutus est: non sine causa fecit. si uehementē infirmitatē adiunari posse tribus guttis putauit: errauit. At si inanis est homo: et crura eius contrahuntur: interponēda potio absintij est.

Dolor

Intestinum

cholera

LIBER:

Si extremæ partes corporis frigent, ungenda sunt calido oleo: cui ceræ paulum sit adiectum: calidusq; fomentis nutriendæ. Si ne sub his quidem quies facta est, extrinsecus contra uentriculum ipsum cucurbitula admouenda est: aut sinapi super imponendum. Vbi is constitit, dormire oportet. postero die utiq; à potione abstinere. die tertio in balneis ire. paulatim se cibo reficere: somno: quisquis facile acquiescit. itemq; lassitudine, & frigore. Si post suppressam choleram febricula manet, aluum duci necessarium est. tum cibus, uinoq; utendum est. sed hic quidem morbus & acutus est: & inter intestina, stomachumq; uersatur sic, ut cuius potissimum partis sit: non facile dici possit.

De cœliaco uentriculi morbo. Caput. XII.

Ni ipsius uero uentriculi porta consistit is, qui & longus
esse consuevit: νοστικὸς à græcis nominatur. Sub hoc uen-
ter indurecit: dolorq; eius est. Aluus nihil reddit: ac ne
spiritum quidem transmittit. extremæ partes frigescunt.
difficiliter spiritus redditur. Commodissimum est inter initia calida
cataplasmata toto uentri imponere, ut dolorem leniant. post cibum uo-
mere: atq; ita uentrem exinanire. Proximis deinde diebus cucurbitu-
las sine ferro uentri, et coxis admouere. Ventrem ipsum liquare da-
to lacte, & uino salso, frigido. Si tempus anni patitur, etiam uiridibus
ficis: sic tamen ne quis aut cibus, aut humor uniuersus detur: sed pau-
latim. Ergo per intervalla temporis sat est cyathos binos, ternos uel su-
mere: et cibum pro portione huius. commodèq; facit cyathos lactis, cya-
thus aquæ mixtus, et sic datus. Cibiq; instantes, & acres utiliores
sunt: adeo ut lacti quoq; recte contritum allium adiciatur. Procedente
uero tempore opus est gestari: maximèq; nauigare: perfricari ter, aut
quater die sic, ut nitrum oleo misceatur: perfundi aqua calida post ci-
bum: deinde sinapi imponere per omnia membra excepto capite, do-
nec arrodat: & rubeat: maximèq; si corpus durum, & uirile est.
paulatim deinde faciendus est transitus ad ea, quæ uentrem compri-
munt. Assa cæro danda, ualens, & quæ non facile corrumpatur. potui
uero pluvialis aqua decocta: sed quæ per binos, ternos uel cyathos bi-
batur. Si uetus uitium est, oportet laser quàm optimum ad piperis
magnitudinem denotare. altero quoq; die uinum, uel aquam bibere:
interdum interposito cibo singulos uini cyathos sorbere: ex inferiori
parte infundere pluvialem gelidam aquam: maximèq; si dolor in-
imis partibus remanet.

De tenuioris

De tenuioris intestini morbo. Caput. XIII.

i Nter ipsa uero intestina consistunt duo morbi: quoru alter in tenuiore, alter in pleniore intestino est. Prior acutus est. insequens esse locus potest. Diocles Cargythus tenuioris intestini morbum $\chi\omicron\rho\sigma\alpha\tau\omicron\nu$, plenioris $\epsilon\lambda\epsilon\omicron\nu$ nominauit.

A plerisque uideo nunc illu priorem $\epsilon\lambda\epsilon\omicron\nu$, huc $\kappa\omega\lambda\iota\upsilon\omicron\nu$ nominari. Sed prior modo supra umbilicum, modo sub umbilico dolorem mouet. Fit ex alterutro loco inflammatiō: nec alius, nec spiritus infra trāsmittitur. si superior pars affecta est, abus: si inferior stercus per os redditur. si utrunlibet uetus est, adiātur periculo uomitus bilisus mali odoris, aut uariis, aut niger. Remedium est sanguinem mittere: uel cucurbitulas pluribus locis admoūere, non ubiq; cute incisa. Id enim duobus, aut tribus locis satis est. Ex ceteris spiritum euocare abunde est. Tum animaduētere oportet, quo loco malum sit. solet enim contra id tuere. Et si supra umbilicum est, alui ductio utilis non est. Si infra est: aluum ducere, ut Erasistrato placuit: optimum est. Et sepe id auxiliū satis est. Ducitur autem percolato ptisanæ cremore cum oleo, et melle sic, ut præter ea nihil adiātur. Si nihil timet, duas manus imponere oportet supra summum uentrem: paulatimq; deducere. Inuenietur enim mali locus, qui necesse est, renitatur: Et ex eodem deliberrari poterit ducenda nec ne alius sit. Illa communia sunt, calida cataplasmata admoūere: eaq; imponere à mammis usq; ad inguina et spinam: ac sepe mutare: brachia, cruraq; perfricare: demittere totum hominem in calido oleo. Si dolor nō quiescit, etiam in aluum ex parte inferiore tres, aut quattuor cyathos calidi olei dare. Vbi per hæc consecuti sumus ut iam ex inferiore parte spiritus transmittatur: offerre potui mulsū tepidum non multum. nam ante magna cura uitandum est, ne quid bibat. si id commodè cessit: adiācere sorbitionem. Vbi dolor, et febricula quierunt: tum demum uti cibo pleniore: sed neq; instante, neq; duro, neq; ualido: ne intestina adhuc imbecilla ledantur. potui uero nihil præterquam puram aquam. nam siue quid uinolentum, siue acidū est: id huic morbo alienum est. Ac postea quoq; uitare oportet balneum, ambulationem, gestationem, ceterosq; corporis motus. Nam facile id malum redire consuevit: Et siue cum frigus subit: siue aliqua iactatio, nisi bene iam confirmatis intestinis, reuertitur.

Aurelij Cor.

h

Hron

clyster

LIBER

De morbo intestini plenioris. Caput. XIII.

Colica

I S autem morbus, qui in intestino pleniore est: in ea maxi-
me parte est: quam certum esse proposui. Vehemens infla-
tio, uehementes dolores dextra magis parte, intestinum
quod uerti uidetur, propè spiritum elidit. In plerisq; post
frigora, cruditatesq; oritur: deinde quiescit: & per ætatem sæpe repe-
tens sic cruciat, ut uitæ spacio nihil demat. Vbi is dolor cœpit, admo-
uere siat, & calida fomenta oportet: sed primo lenta, deinde uali-
diora: simulq; frictiones. ad extremas partes id est crura, brachiaq;
materiam reuocare. Si discussum non est: qua dolet cucurbitulas sine
ferro defigere. Est etiam medicamentum eius rei causa comparatum,
quod κωλιον nominatur. id se repperisse Cassius gloriabatur. Ma-
gis prodest potui datum. sed impositum quoq; extrinsecus digerendo
spiritum, dolorē leuat. nisi finito uero tormento, recte neq; abus, neq; po-
tio assumitur. Quo uictu sit utendum qui hoc genere tentantur: iam
mihi dictum est. Confectio medicamenti, quod κωλιον nominatur: ex
his constat. Costi, anesi, castorei singulorū Pondo denariorū triū. petro-
selini. P. denariorum. III. piperis longi, et rotundi singulorū. P. .II.
papaueris lachrymæ, iunci rotundi, myrræ, nardi singulorū. P. VI.
quæ melle excipiuntur. id autem & deuorari potest: & ex aqua ca-
lida sumi.

De torminibus, id est dysenteria. Caput. XV.

Dysenteria

Proxima his inter intestinorū mala, tormina esse consue-
uerunt: δυσεντερία græce uocatur. intus intestina exul-
cerantur. ex his cruor manat. Isq; modo cum stercore
aliquo semper liquido, modo cum quibusdā quasi muc-
cosis excernitur. interdum simul quædam carnosæ descendunt. Fre-
quens deiiciendi cupiditas, dolorq; in ano est. Cum eodem dolore exi-
guum aliquid emittitur. atq; eo quoq; tormentum intenditur. idq; post
tempus aliquod leuatur. exiguaq; requies est. somnus interpellatur. fe-
bricula oritur. longorq; tempore id malū cum inueterauerit, aut tollit
hominem: aut etiam si finitur, excruciat. Oportet in primis conque-
sere. si quidem omnis agitatio exulcerat. deinde ieiunū sorbere uini
cyathum: cui contrita radix quinq; folij sit adiecta. imponere cata-
plasmata super uentrem, quæ reprimunt. quod in superioribus uen-
tris morbis non expedit. quotiensq; desidit, subluere aqua calida: in
qua decoctæ uerbænæ sint. portulacam uel coctam, uel ex dura muria
edisse. cibos, potionesq; eas, quæ astringūt aliū. Si uetustior morbus est,

ex inferioribus ptibus tepidū infundere uel ptisanæ cremorē, uel lac, uel adipem liquatam, uel medullā ceruinam, uel oleum, uel cum rosa buthirum, uel cum eadē album crudum ex ouis, uel aquam: in qua lini semen decoctum sit: uel si somnus non accedit, uitellos cum aqua, in qua rosæ floris folia cocta sint. Leuant enim dolorē hæc, & mitiora ulcera efficiunt: maximeq; utilia sunt, si cibi quoq; secutiū fastidiū est. Themison muria dura quā asperrima sic utendū memorie prodidit. Cibi uero esse debent, qui leniter uentrem destringant: & ea quæ urinam mouent. Si ea consecuta sunt, in aliā partem humorē auertendo prosunt. si non sunt cōsecuta, noxam augent. Itaq; nisi in quibus prompte id facere consuerunt, non sunt adhibenda. Potui, si febricula est: aqua pura calida, uel ea, quæ ipsa quoq; astringat: dari debet. si non est: uinum lene austerū. Si pluribus diebus nihil remedia alia inuerunt, uetusq; iam uitium est: aquæ bene frigide potio assumpta ulcera astringit: & initium secundæ uoletudinis facit. Sed ubi uenter suppressus est, protinus ad calidam potionem reuertendum est. Solet autem interdum etiam putris sanies, pessimiq; odoris descendere. solet purus sanguis profluere. si superius uitium est, aluus aqua mulsā duci debet: tunc deinde eadem infundi, quæ supra cōprehensa sunt. Valensq; est etiam aduersus ulcera intestinorum minij gleba, cum salis hemina contrita. si minus, mixta his aqua in aluum datur. Ac si sanguis profluit, ubi, potionesq; esse debent, quæ astringant.

De leuitate intestinorum. Caput. XVI.

X torminibus interdum intestinorū leuitas oritur: quæ continere nihil possunt: & quicquid assumptum est, imperfectū protinus reddunt. id interdum ægros trahit: interdum præcipitat. In hoc utiq; adhibere oportet comprimētia: quo facilius tenendi aliquid intestinis uis sit. Ergo et super pectus ponatur sinapi: exulcerataq; cute malagma, quod humorē euocat: & ex uerbis decoctis aqua desidat: & abos, potionesq; assumat, quæ aluum astringunt: & frigidis utetur perfusionibus. Oportet tamen prospicere ne simul his omnibus admotis, uitium contrariū per immodicas inflationes oriat. Iaculatim ergo firmari intestina debebunt, aliquibus cotidie adiectis. Et cum in omni fluore uentris, tum in hoc præcipue necessarium est: non quoties libet desiderare, sed quotiens necesse est: ut hæc ipsa mora in consuetudinem ferendi oneris intestina deducat. Alterum quoq; quod æque ad omnes similes affectus ptinet, in hoc maxime seruandum est, ut cum pleraq; utilia insuauia sint, qualis est plantago, et rubi,

Aurelij Cor.

h ij

LIBER

et quicquid mali corio mixtum est: ea potissimum ex his dentur, quæ maxime æger uolet. Deinde si omnia ista fastidiet ad excitandam cibi cupiditatem, interponatur aliquid minus utile: sed magis gratum. Exercitationes, frictiones huic quoque morbo necessariae sunt: Et cum his sol, ignis, balneum, uomitus ut Hippocrati uisum est: etiam albo ueratro, si cætera parum proficiunt: euocatus.

De lumbricis aluum occupantibus. Caput. XVII.

Nonnunquam autem lumbrici quoque occupant aluum: hi quoque modo ex inferioribus partibus: modo foedius ore redduntur. Atque interdum latos eos, qui peiores sunt: interdum teretes uidemus. si lati sunt, aqua potui dari debet: in qua lupinum, aut cortex mori decoctus sit: aut cui adiectum sit cotinum uel hyssopum, uel piperis acetabulum, uel scamoneæ paulum. uel etiam pridie cum multum allium ediderit: uomat. Posteroque die mali punici tenues radicales colligit, quantum manu comprehendit: easque contusas, in aquæ tribus sextarijs decoquat, donec tertia pars supersit. Huc adijciat uetri paulum, et ieiunus bibat. Interpositis deinde tribus horis, duas potionesumat: aut aquæ, uel muriæ duræ sic adiectæ. tum desidat subiecta calida aqua in pelue. si uero teretes sunt, qui pueros maxime exercent: et eadem dari possunt, et quædam leuiora, ut contritum semen urticæ, aut brassicæ, aut cumini cum aqua, uel menta cum eadem, uel absinthium decoctum, uel hyssopum ex aqua mulsæ, uel nasturcij semen cum aceto contritum. Edisse etiam et lupinum, et allium prodest: uel in aluum oleum subter dedisse.

De tenasmo intestinorum morbo. Caput. XVIII.

Tenasmus

St autem aliud leuius omnibus proximis, de quibus super dictum est: quod τεναςμος græci uocant. id neque acutis, neque longis morbis annumerari debet: cum et facile tollatur: neque unquam per se ingulet. in hoc aquæ, atque in torminibus frequens, desidendi cupiditas est: æque dolor ubi aliquid excernitur. descendunt autem pituitæ, mucusque similia: interdum etiam leniter subruentia. sed his interponuntur nonnunquam ex cibo quoque recte coacta. desiderere oportet in aqua calida: sæpiusque ipsum manum nutrire: cui plura medicamenta idonea sunt, butyrum cum rosa, aqua ex aceto liquata, emplastrum id, quod τετραπύριον græci uocant: rosa liquatum, alumen lana circumdatum, et ita appositum: eademque ex inferiore

ex inferiore parte indita, quæ torminum auxilia sunt, eadem uerbenæ decoctæ, ut inferiores partes foueantur: alternis uero diebus aqua, alternis leue, & austerum uinum bibendum est. Potio esse debet egelida, & frigida. proprior ratio uictus talis, qualem in tormina supra præcepimus.

De uentris fluxu, & curatione. Caput. XIX.

1 Euior etiam dum recens deiectio est, ubi & liquida aluus, & sæpius, quàm ex consuetudine fertur. atq; interdum tolerabilis dolor est: interdum grauissimus: idq; peius est. sed uno die fluere aluum sæpe pro ualitudine est, atq; etiam pluribus: dum febris absit, & intra septimum diem id conquiescat. purgatur enim corpus: & quod intus læsurum erat, utiliter effunditur. uerum spatium periculosum est. Interdum enim tormina, ac febriculas excitat: uiresq; consumit. primo die quiescere satis est: neq; impetum uentris prohibere: si per se desit, balneo uti: paulum cibi capere. si mansit, abstinere non solum à cibo, sed etiam à potione. Postero die, si nihilominus liquida aluus est, æque conquiescere: paulum astringentis cibi sumere: tertio die in balneum ire: uehementer omnia præter uentrem perfricere: ad ignem lumbos, scapulasq; admouere: cibi uti, sed uentrem contrahentibus: uino non multum meraco. Si postero quoq; die fluat, plus edisse: sed uomere etiam ex toto, donec conquiescat. Cōtra sitim, fame, uomitu niti. uix enim fieri potest ut post hanc animaduersionē aluus nō contrahatur. Alia uia est, ubi uelis suppressere: cenare: deinde uomere: postero die in lecto conquiescere. uespere ungi sed leniter. deinde panis circā sēlibrā ex uino amineo uero sumere. tum assū aliquid, maximeq; auem, & postea uinum idē bibere aqua pluuiali mixtum: idq; usq; quintum diē facere: iterumq; uomere. Frigidam autem assidue potione esse debere contra priores auctores Asclepiades affirmauit, & quidem q̄ frigidissimam. Ego experimentis quenq; in se credere debere existimo calida potius, an frigida utatur. Interdum autem euenit, ut id pluribus diebus neglectū, curari difficilius possit. à uomitu oportet incipere: deinde postero die uespere tepido oleo ungi. cibū modicum assumere: uinum meracum quàm asperrium: impositā super uentrem habere cum cærato rutam. In hoc autē affectu corporis neq; ambulatione, neq; frictione opus est. uehiculo sedisse, uel magis ēt equo prodest. neq; enim ulla res magis intestina cōfirmat. Si uero etiam medicamentis utendum est: aptissimum est id quod ex pomis fit. Vindemiæ tēpore in grande uas coniicienda sunt pira, atq;

Aurelij Cor.

h iij

Musci & pomis

mala siluestria. si ea non sunt, pira tarentina uiridia, uel signina, ma-
 la satrdiana uel amerina, myrapia: hisq; adicienda sunt cotonea, &
 cum ipsis corticibus suis punica, sorba: & quibus magis utimur etiā
 torminalia sic, ut hæc tertiam ollæ partem teneant. tum deinde ea
 musto implenda est: coquendumq; id donec omnia quæ indita sunt, li-
 quata in unitatem quadam coeant. Id gustui non insuauē est: & quā-
 documq; opus est, assumptum leuiter sine ulla stomachi noxa uentrē
 tenet. duo, aut tria cochlearia uno die sumpsisse satis est. Alterum ua-
 lentius genus est, myrti bacas legere: ex his uinū exprimere: id deco-
 quere ut decima pars remaneat: eiusq; cyathū sorbere. tertium quod
 quādoq; fieri potest, malum punicum excoquere: exemptisq; omnibus
 seminibus, membranas quæ inter ea fuerunt iterum conijcere. tū in-
 fundere cruda oia, rudiculaq; miscere: deinde malum ipsum super
 prunam imponere. quod dum humor intus est, non aduritur. Vbi sic-
 cum esse cœpit, remouere oportet: extractumq; cochleari, quod intus
 est, edisse. aliquibus adiectis maius momentum habet. Itaq; etiam in
 piperatum conijcitur: misceturq; cum sale, & pipere. est quid ex his
 edendum. est pulicula etiā, cum qua paulum est fano uetere co-
 ctum sit, & lenticula cū malicorio cocta, rubiq; acumina in aqua
 decocta, & ex oleo, atq; aceto assumpta, efficacia sunt. atq; ea aqua,
 in qua uel palmulæ, uel malum cotoneum, uel arida sorba, uel rubi
 decocti sunt, potata. quod genus significo, quotiens potionē dandam
 esse dico: quæ astringit. Tritici quoq; hemina in uino amineo austero
 decoquitur: idq; triticū ieiuno, ac sitienti datur. superq; id, uinū id sor-
 betur. quod iure ualentissimis medicamentis annumerari potest. atq; etiā
 potū datur uinū signinum, uel resinatum austerū, uel quodlibet au-
 sterum. Cōtunditurq; cum corticibus, seminibusq; suis punicū malum;
 uinoq; tali miscetur. idq; uel merum sorbet aliquis, uel bibit mixtum.
 sed medicamentis uti nisi in uehementibus malis supernacuum est.

De uulue morbo, & curationibus. Caput. XX.

X uulua quoq; foeminis uehemens malum nascitur: proxi-
 miq; ab stomacho uel afficitur hæc: uel corpus afficit. Inter-
 dum etiam sic exanimat: ut tanquam comitali morbo pro-
 sternat. Distat tamen hic casus, eo quod neq; oculi uertuntur: nec spu-
 ma profluit: nec nerui distenduntur. sopor tantū est: idq; quibusdā
 foeminis crebro reuertens perpetuū est. ubi incidit, si satis uirium est:
 sanguis missus adiuvat. si parum est, cucurbitulæ tamen defigendæ
 sunt in inguinibus. si diutius aut iacet, aut aliqui iacere consuevit:
 admonere oportet naribus extinctum ex lucerna linamentum, uel

De uulua morbo
 & curationibus

De uulua morbo
 & curationibus

aliud ex his, quæ foedioris esse odoris vetuli: quod mulierem excitet. Idemq; aquæ frigide perfusio effiat. adiunatq; ruta contrita cū melle, uel ex cyprino ceratum, uel quodlibet callidum, & humidum cataplasma naturalibus pubetenus impositum. Inter hæc est perfricare coxas, & poplites oportet. deinde ubi ad se redit, circūcadendum uirū est in totum annum: et si casus idē non reuertitur. Frictione quotidie utendū totius quidem corporis: præcipue uero uentris, & poplitum. cibus ex media materia dandus. sinapi super inuē uentrem tertio quoq; aut quarto die imponendum, donec corpus rubeat. si durities manet, mollire cōmode uidetur solanum in lac demissum: deinde contritum, & cera alba, atq; medulla ceruina cum irino, aut seuum taurinum, uel caprinum cum rosa mixtum. dandum potui etiam uel castoreum est, uel git, uel anetum. Si parum pura est, purgatur iunco quadrato. si uero uulua exulcerata est, ceratum ex rosa fiet: & recēs suilla adeps, & ex ouis albū misceatur, idq; apponatur: uel album ex ouo cum rosa mixtum, adiecto: quo facilius consistat, contritæ rosæ puluere. dolens uero ea sulphure suffumigari debet. At si purgatio nimia mulieri nocet, remedio sunt cucurbitulæ cute incisa in quibus uel etiam sub mammis admotæ. si maligna purgatio est, subiicienda sunt, ^{*} coeuntia. Id faciunt etiam albæ oliuæ, & nigrum papauer cum melle assumptū, & gummi cū trito semine apij liquatum, & cum cyatho passi datum. Præter hæc in omnibus uescicæ doloribus idoneæ potiones sunt, quæ ex odoribus fiunt: id est spica nardi, croco, annamomo, cassia, similibusq;. Idemq; et decocta lentiscus præstat. si tamen intolerabilis dolor est, & sanguis profluit, etiam sanguinis detractio apta est: aut certe coxis admotæ cucurbitulæ cute incisa. At cum urina super potionum modū etiam sine dolore profluēs, maciem, & periculum facit, si tenuis est, opus est exercitatione, & frictione, maximèq; in sole, uel ad ignem. Balneum rarum esse debet: neq; longa in eo mora cibus comprimens. Vinum austerrum mcracum, per æstatem frigidum, per hyemem egolidum, sed tantum quantum minimum sit. Infirma, alius quoq; uel duanda, uel late purganda est. Si crassa urina est, uehementior esse debet & exercitatio, & frictio: longior in balneo mora: cibus opus est teneri: uirum idē. In utroq; morbo uitanda oīa sunt, quæ urinam mouere consueuerūt.

De nimia profusione seminis ex naturalibus. Caput. XXI

St etia circa naturalia uitū, nimia profusio seminis. quod si ne uenere, sine nocturnis imaginibus sic fertur, ut interposito spatio tabe hominē consumat. In hoc affectu salutare sunt

h iij

*Purgatio modica**Deu bolus*

LIBER

uehementes frictiones, perfusiones, natationesq; quam frigidissimæ. neq; cibi, nec potio nisi frigida assumpta. Vitare autem oportet cruditates: omnia instantia. nihil ex his assumere, quæ contrahere semen uidentur: qualia sunt, siligo, simila, oua, alia, amyllum, omnis caro glutinosa, piper, eructa, bulbi, nuclei pinei. Neq; alienum est fouere inferiores partes, aqua decocta ex uerbenis compimentibus. ex hisdem aliqua cataplasmata imo ueneri, inguinibusq; circundare: præcipueq; ex aceto rutam uitare: et ne supinus obdormiat.

De coxarum morbis, et curationibus. Caput. XXII.

Vperest ut ad extremas partes corporis ueniam: quæ articulis inter se conferuntur. initium à coxis faciam. Harum ingens dolor esse consuevit. isq; hominem sæpe debilitat: et quosdā non dimittit. Eoq; id genus difficillime curatur: quod fere post longos morbos his pestifera huc se inclināt. quæ ut illas partes liberat: sic hanc ipsam quoq; affectam præhendit. Fouendum primum aqua calida est: deinde utendum calidis cataplasmatibus. Maxime prodesse uidetur aut cum hordeacea farina, aut cum ficu ex aqua decocta mixtus capparum cortex concisus, uel lolij farina ex uino diluto cocta, et mixta cum acida fece: quæq; refrigescunt, imponere noctu malignitati commodius est. Inulæ quoq; radix contusa, et ex uino austero postea cocta, et late super coxam imposita, inter ualentissima auxilia est: si ista non soluerunt, sale calido, et humido utendum est. Si ne sic quidem finitus dolor est, aut tumor ei accedit, incisa cute admouendæ sunt cucurbitulæ: mouenda urina. Alius si compressa est, duccenda. Vltimum est, et in ueteribus quoq; morbis efficacissimum, tribus, aut quatuor locis super coxam cutem candentibus, feramentis exulcerare. Sed frictione quoq; utendum est, maxime in sole, et eodem die sæpius: quo facilius ea quæ coeundo nocuerunt, dirigantur. Eaq; si nulla exulceratio est, etiā ipsis coxis, sicut et cæteris partibus adhibenda est. Cum uero sæpe aliquid exulcerandum candenti ferramento sit, ut materia inutilis euocetur: illud perpetuum est, non ut primum fieri potest, huius generis ulcera sanare: sed ea trahere, donec id uitiū, cui per hæc opitulantur, conquiescat.

De genuum doloribus, et cura. Caput. XXIII.

Oxis proxima genera sunt: in quibus ipsis nonnunquā dolor esse consuevit. In hisdem autem cataplasmatibus, cucurbitulisq; præsidium est: sicut etiam cum in humeris, alijsue cõ-

missurijs dolor aliquis exortus est. Equitare ei, cui genua dolent: inimicissimum omnium est. Omnes autem eiusmodi dolores ibi inueterauerunt: uix citra uestionem finiuntur.

De articularum doloribus in manibus, pedibusq; Cap. XXIII.

i N manibus, pedibusq; articularum uitia frequentiora, longioraq; sunt. quæ in podagris, chiragris'ue esse consuerunt. Ea raro uel castratos, uel pueros ante foeminae coitum, uel mulieres, nisi quibus menstrua suppressa sunt: tentant. ubi sentiri coeperunt, sanguis mittendus est. Id enim inter initia statim factum saepe annuam: nonnunquam perpetuam ualitudinem tota praestat. Quidam etiam cum asinino lotio epoto se eluissent: in perpetuum hoc malum euaserunt. Quidam cum toto anno a uino, mulso, uenere, sibi temperassent: securitatem totius uitae consecuti sunt. Idq; utiq; post primum dolorem seruandū est: etiam si quieuit. Quod si iam consuetudo eius facta est: potest quidem aliquis esse securior his temporibus: quibus dolor se remisit. Maiorem uero curam adhibere debent hi, quibus id reuertitur. quod fere uere, autumno'ue fieri solet. Cum uero dolor urget, manu gestari debet: deinde ferri. in ambulatione leui se dimouere. Et si podagra est, interpositis temporibus exiguis, inuicem modo sedere: modo ingredi. tum antequam cibum capiat, sine balneo loco calido leuiter perfricari: sudare: perfundi aqua egelida: deinde cibum sumere ex media materia, interpositis rebus urinā mouentibus: quotiensq; plenior est, euomere. Vbi dolor uehemens urget: interest sine timore is sit: an tumor cum calore, an tumor iam etiam obcaluerit. Nam si tumor nullus est: calidis fomētis opus est. A quam marinam, uel muriam duram feruefacere oportet: deinde in peluem conijcere: Et cum iam homo pati potest, pedes demittere: superq; palam dare: Et uestimento tegere: paulatim deinde iuxta labrum ipsum ex eadē aqua leuiter infundere, ne calor intus destituat: ac deinde noctu cataplasmata caleficientia imponere, maximeq; ibi scā radicem ex uino coctam. Sin uero tumor, calorq; est, utiliora sunt refrigeratia: rectoq; in aqua quam frigidissima articuli continentur. sed neq; quotidie, neq; diu sit: ne nerui laedantur. imponendum uero est cataplasma, quod refrigeret. Neq; tamen in hoc cotidie permanendum: sed ad ea transiendum quæ sic reprimunt, ut emolliant. Si maior est dolor, papaueris cortices in uino coquendi: miscendiq; cum cerato sunt: quod ex rosa factum sit. Vel ceræ, Et adipis suillæ tantundem unā liquandum, deinde his uinum miscendum: atq; ubi quod ex eo impositum est, in cal-

Articularis

Lotium asininum

Ips dolor

Podagra

LIBER

luit, detrahendū, & subinde imponendum aliud est. Si uero tumores etiam obcaluerunt, & dolent, leuat spongia: quæ imposita subinde ex oleo, uel aceto, uel aqua frigida exprimitur: aut pari portione inter se mixta, pix, cera, alumen. sunt etiā plura idonea manibus, pedibusq; malagmata. Quod si nihil superimponi patitur, id quod sine tumore est, fouere oportet spongia: quæ in aquam calidam demittatur: in qua, uel papaueris corticis, uel cucumeris siluestris radix decocta sit. tum inducere articulis crocū cum succo papaueris, & ouillo lacte. at si tumor est, foueri qdē debet aqua egelida: in qua lentiscus, alia uerberna ex reprimentibus decocta sit. induci uero medicamentum ex nucibus amaris, cum aceto tritis: aut ex cerusa, cui contrituæ herbæ muralis succus sit adiectus. Lapis etiam, qui carnem exedū: quē οαυό- πορορ græci uocant: excisus sic ut pedes capiat: demissos eos, cum dolēt, retentosq; ibi lenare consuevit. ex quo in Asia lapidi asio gratia est. Vbi dolor, & inflammatiō se remiserunt, quod intra dies quadraginta fit: nisi uitium hominis accessit: modicis exercitationibus, abstinentia, unctionibus lenibus utendum est sic, ut etiam acopo, uel liquido cerato cyprino articuli perfricentur. Equitare podagricis quoq; alienum est. Quibus uero articulorum dolor certis temporibus reuertitur: hos ante, & curioso uictu cauere oportet, ne inutilis materia corpori supersit: & crebriore uomitu, & si quis ex corpore metus est, uel alui ductione uti: uel lacte purgari. quod Erasistratus in podagricis expulit: ne in inferiores partes factus cursus pedes replet: cum euident sit omni purgatione, non superiora tantummodo, sed etiam inferiora exinaniri. Ex quocumq; autem morbo quis inualescit, si tarde confirmatur: uigilare prima luce debet. nihilominus in lecto conuiescere. circa tertiam horam leniter unctis manibus corpus permulcere. deinde delectationis causa quantum inuat, ambulare circumcisa omni negotiosa cogitatione, uel actione. tum gestari diu. multa frictione uti. loca, cœlum, cibos sæpe mutare. Vbi triduo, quadri duo uel uinum bibit: uno, aut etiam altero die interponere aquam. per hæc enim fiet, ne in uitia tabē inferenti incidat: & ut mature uires suas recipiat. Cum ex toto uero conualuerit, periculose uitæ genus subito mutabit: & inordinate aget. Paulatim ergo debet, commissis his legibus eō transferre: ut arbitrio suo uiuat.

LIBER QUINTVS.

Ixi de his malis corporis, quibus uictus ratio maxime subuenit. Nunc traſeundum eſt ad eā medicinae partem: quæ magis medicamenti pugnāt. Hiſ multum antiqui auctores tribuerunt: & Eraſiſtratus, & hi, qui ſe præſcriptiuos nominauerunt: præcipue tamen Erophiſus, deducitq; ab illo uiri adeo, ut nullum morbi genus

ſine hiſ curarent. Multaq; etiam de facultatibus medicamentorum memoriae prodiderunt. qualia ſunt, uel Zenonis, uel Andriæ, uel Apolloniij. qui Myſ cognominatus eſt. Horum autem uſum ex magna parte Aſclepiades non ſine cauſa ſuſtulit: & cum omni ferè medicamento ſtomachū ledant, maliq; ſucci ſint: ad ipſius uictus rationem potius omnem curam ſuam tranſtulit. Verū ut illud in pleriq; morbis utiliſ eſt, ſic multa admodum corporibus noſtris incidere conſuerunt: quæ ſine medicamenti ad ſanitatē peruenire non poſſunt. Illud ante omnia ſcīre conuenit, quod omnes medicinae partes ita innexæ ſint, ut ex toto ſeparari non poſſint: ſed ab eo nomen trahant, a quo plurimū petunt. Ergo ut illa, quæ uictu curat, aliquando medicamentum adhibet: & illa, quæ præcipue medicamenti pugnāt, adhibere etiam rationem uictus debet: quæ multum admodum in omnibus malis corporis proſicit. ſed cum omnia medicamenta proprias facultates habeant: ac ſæpe ſimplicia opitulentur, ſæpe mixta: non alienum uidetur ante proponere & nomina, & uires, & mixturas eorum: quo minor ipſius curationis ex ſequentibus mora ſit.

De ſimplicibus facultatibus quarūcūq; rerum, ex quibus medicamenta ſiunt: & primo de hiſ, quæ ſanguinem ſupprimunt. Caput. I.

Anguinem ſupprimunt atramentum ſutorium, quod græci χαλκού اردορ appellant: chalcitis, acacia, & ex aqua licium, thus, aloë, gummi, plumbum combuſtum, porrum, herba ſanguinalis, creta uel amolia, uel figularis, miſy, frigida aqua, uinū, acetum, alumen, melinum, ſquama & ferri, & æriſ. atq; huius quoq; diuæ ſpecies ſunt, alia tantum æriſ, alia rubri æriſ.

Quæ uulnuſ glutinant. Caput. II.

Glutinant uulnuſ, myrra, thus, gummi, præcipueq; acanthinum, pſyllēū, tragaantha, cardamomon, bulbi, lini ſemen, naſturtium, ouī album, gluten, icthyocolla, uitis alba, conuſa

LIBER

testis suis cochleæ, mel coctum, spongia, uel ex aqua frigida, uel ex uino, uel ex aceto expressa. ex hisdem lana succida, si leuis plagi est: etiam araneū reprimunt, alumen & scissile, quod σχιδὸν uocatur: & liquidum, melinu, auripigmentum, ærugo, chalcitis, atramentū sutoriū.

Quæ concoquunt, & mouent pus. Caput. III.

Concoquunt, & mouent pus, nardum, myrrha, costus, balsamum, galbanum, propolis, styrax, thuris, & fuligo, & cortex, bitumen, pix, sulphur, resina, seuum, adeps, oleum.

Quæ aperiunt uulnera. Caput. IIII.

Uulnera aperiunt tanquam ora in corporibus, quod σόμα græce dicitur: cinnamomum, balsamum, panacis, iuncus quadratus, puleium, flos albæ uiolæ, bdella, galbanum, resina terebinthina, & pinea, propolis, oleum uetus, piper, pyretrum, chamæpytis, uua aminia, sulphur, alumen, rutæ semen.

Quæ purgant. Caput. V.

Purgant, erugo, auripigmentum, quod ἀποεινὸν à græcis nominatur. Huic autem & sandaracæ in omnia eadē uis: sed ualidior est squama æris, pumex, iris, balsamū, styrax, thus, thuris cortex, resina, & pinea, & terebinthina liquida, cœnāthe, lacertis sterus, sanguis columbæ, & palumbi, & hirundinis, ammoniacum, bdellium, quod in omnia idem quod ammoniacū potest: sed ualentius est abrotanum, ficus arida, coccum gnidium, scabis eboris, omphaciū, radícula, coagulum, sed maxime leporinū: cui eadem quæ cæteris coagulibus facultas, sed ubiq; ualidior est: fel, uitellus crudus, cornu ceruinū, gluten taurinum, mel crudum, misyos, chalcitis, crocum, uua aminia, abrotanum, spuma argenti, galla, squama æris, lapis hæmatites, minium, costum, sulphur, pix cruda, seuum, adeps, oleum, ruta, porrum, lenticula, erui.

Quæ rodunt. Caput. VI.

Rodunt alumen liquidum, sed magis rotundum: ærugo, chalcitis, mysi, squama æris, sed magis rubri, æs combustum, sandaraca, minium synopicum, galla, balsamum, myrra, thuris cortex, galbanū, resina terebinthina humida, piper utrunq; sed rotundum magis, cardamomum, auripigmentum, calx, nitrum, & spuma eius, apij semen, narossi radix, omphacium, alcyonium, oleum ex amaris nucibus, allium, mel crudum, uinum, lentiscus, squama ferri, fel taurinum, scamonea, uua aminia, cinnamomum, styrax, cicutæ semen, resina, narossi semen, fel, nuxes amaræ, oleumq; earum, atramentum sutorium, chrysocolle, ueratrum, cinis.

Quæ exedunt corpus. Caput. VII.

Exedunt corpus acaciæ succus, hebenus, ærugo, squama æris,
e chryso colla, cinis cyprius, nitrum, cadmia, spuma argenti, hy-
pocistis, diphyges, sal, auripigmentum, sulphur, acuta, san-
daract, salamandra, alcyonium, æris flos, chalcitis, atramentum suto-
rium, ochra, calx, acetum, galla, alumen, lac caprifici, uel lactucæ ma-
rine, quæ τὸς μάλlos à græcis nominatur: alcyonium, fel, turturis fu-
ligo, spodium, lenticula, mel, oleæ folia, marrubium, lapis hæmatites
et phrygius, et asius, et scissilis, mysi, uinum, acetum.

Quæ adurunt. Caput. VIII.

a Durunt auripigmentum, atramentum sutorium, chalcitis, mysi,
æugo, calx, arcta combusta, sal, squama æris, fex combusta,
myrra, sterus et lacerti, et columbæ, et palumbi, et hirundinis, pi-
per, coctum gnidium, allium, diphyges, lac utrunq; quod proximo ca-
pite supra comprehensum est: ueratrum et album, et nigrum, can-
tharides, corallium, piretrum, thus, salamandra, eruca, sandaract, uua
aminia, chryso colla, ochra, alumen scissile, ouillum sterus, oenanthe.

Quæ crustas ulceribus inducunt. Caput. IX.

Adem ferè crustas ulceribus tanquã igne adustis inducunt:
e sed præcipue chalcitis utiq; si cocta est: flos æris, æugo, au-
ripigmentum, mysi, et id quo magis coctum.

Quæ crustas ulceribus resolvunt. Caput. X.

c Rustas uero has resoluit, farina triticea cum ruta, uel porro, aut
lenticula, cui mellis aliquid adiectum est.

Quæ discutiat ea, quæ in aliqua pte corporis coierunt. Caput. XI.

D discutieda uero ea, quæ in corporis parte aliqua coierunt:

a maxime possunt abrotanum, helenium, amaracus, alba ui-
ola, mel, liliū, sampsius, cyprius, lac, fertula campana, fer-
pillum, cupressus, cedrus, iris, uiola purpurea, narcissus, rosa, crocum,
passum, iuncus quadratus, nardum, cinamomum, cassia, ammoniacum,
cera, resina, uua aminia, spuma argenti, styrax, ficus arida, tragori-
ganus, lini, et narcissi semen, bitumen, sordes ex gymnasio, pyrites la-
pis aut molaris: crudus uitellus, amaræ nucs, sulphur.

Quæ euocant, et educunt. Caput. XII.

Vocat, et educit iadanium, alumē rotūdū, hebenus, lini semē,
e omphacium, fel, chalcitis, bdeliū, resina terebinthina, et pi-
nea, propolis, ficus arida decocta, sterus columbæ, pumex,
farina lolij, grossi in aqua cocti, elaterium, lauri baccæ, nitrum, sal.

LIBER

Quæ exasperata leuent. Caput. XIII.

l Enat id quod exasperatum est, spodium, hebenas, gummi, onni album, lac, tragacanthum.

Quæ carnem nutriunt, et ulcus implent. Cap. XIII.

c Arnem alit, et ulcus implet resina pinea, ochra actia, uel asterica, cera, butyrum.

Quæ molliunt. Caput. XV.

m Olliunt æs combustum, terra ereithria, nitrum, papaueris lacryma, ammoniacum, bdellium, cera, seuum, adeps, oleum, ficus arida, sesamum, sertula campana, narcissi et radix, et semen, rosæ folia, coagulum, vitellus crudus, amara nuges, medulla omnis, stibi, pix, cholea acta, cicuta semen, plumbi recrementum, σκαπίον, μομφόου græci uocant: panacis, cardamomum, galbanum, resina, uua aminia, styrax, iris, balsamum, sordes ex gymnasio, sulphur, butyrum, ruta.

Quæ cutem purgant. Caput. XVI.

i Tem cutē purgat mel: sed magis si est cum galla, uel eruo, uel lenticula, uel marrubio, uel iride, uel ruta, uel nitro, uel ærugine.

De mixturis simplicium rerum, et de ratione ponderum, et quid malagma, et emplastrum, et pastillus inter se differant. Caput. XVII.

Xpositis simplicibus facultatibus dicendum est quemadmodum misceantur, quæ ex his fiant. Miscentur autem uarie: neque huius ullus modus est, cum ex simplicibus alia demantur: alia adiçantur: iisdemque seruatis, ponderum ratio mutetur. Ita cum facultatum materia non ita multiplex sit: innumerabilia mixturarum genera sunt: quæ comprehendere si possent, tamen esset superuacuum. Nam et iisdem affectus intra paucas compositiones sunt: et mutare eas cuilibet cognitis facultatibus facile est. itaque contentus his ero quas accepi uelut nobilissimas. In hoc autem uoluerim eas explicabo: quæ uel desiderari in prioribus potuerunt: uel ad eas curationes pertinent: quas protinus hic comprehendam sic: ut tamē quæ magis cōia sunt, simul iungam. Si qua singulis, uel et paruis ac commodata sunt, in ipsorum locum differam. Sed et antea sciri uolo, in uncia pondus denariorum septem esse. Vnus deinde denarii pondus diuidi à me in sex partes idest sex uncias: ut idem in uncia denarii habeam, quod græci habent in eo, quem ὀβολόν appellant. id ad nostra pondera relatum, paulo plus dimidio scrupulo facit. Malagmata uero, atque emplastra, pastilli, quos μομφόου græci uocant: cum plurima eadem habeant: differunt eo, quod malagmata maxime ex floribus, eorumque etiam surculis, Emplastra, pastilli: magis ex quilibet

Sc

dam metallicis fiunt. deinde malagmata confusa abunde mollescunt. nam super integram cutem iniunguntur. Laboriose uero conteruntur ea, ex quibus emplastra pastilliq; fiunt: ne lædant uulnera cum imposita sunt. Inter emplastrum autem, & pastillum hoc interest: quod emplastrum utiq; liquati aliquid accipit. in pastillo tantum arida medicamenta aliquo humore iunguntur. Tum emplastrum hoc modo fit. arida medicamenta per se teruntur. deinde mixtis his instillatur aut acetum: aut si quis alius non pinguis humor accessurus est. & ea rursum ex eo teruntur. Ea uero quæ liquari possunt ad ignem simul liquantur: & si quid olei misceri debet: tum infunditur. Interdum etiã aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Vbi facta sunt quæ sepe ratim fieri debuerunt: in unum omnia miscentur. At pastilli hæc ratio est. Arida medicamenta contrita humore non pingui aut uino, uel aceto coquuntur, & rursum cocta inarescunt. Atq; ubi utendum est eiusdem generis humore, diluuntur. tum emplastrum imponitur. pastillis illinitur, aut alicui molliori: aut cerato miscetur.

De malagmatis. Caput. XVIII.

Malagma aduersum calidas podagras.

Is cognitis, primũ malagmata subijciam: quæ ferè non sunt refrigerandi, sed calefaciendi causa reperta. Est tamen quod refrigerare possit ad calidas podagras aptum. Habet gallæ & immature, & alterius coriãdri seminis, acutæ, lacrimæ aridæ, gummi, singulorum plenum acetabulum, cæratii eloti, quod *πεμνόμενον* greci uocant: selibram. Reliqua ferè calefaciunt. Sed quædam digerunt materiam: quædam extrahunt, quæ *επιπορευτικά* uocantur. pleraq; certis magis partibus membrorum accommodata sunt.

Malagma ad materiam extrahendam.

I materia extrahenda est, ut in hydropico, in lateris dolore, in incipiente abscessu, in suppuratione quoq; mediocri, aptum est id quod habet resinæ aridæ, nitri, ammoniaci, galbanæ singulorum pondo, ceræ pondo. Aut in quo hæc sunt, æruginis rasæ, thuris, singulorum. P. *. ammoniaci salis. P. VI. squamæ aeris, ceræ, singulorum. P. VIII. resinæ aridæ. P. VII. aceti cyathus. Idem præstat cumini farina cum struthio & melle. P. II.

Malagma ad iecur dolens.

I iecur dolet: id in quo est balsami lacrimæ. P. XII. costi, cinamomi, cassiæ, corticis myrræ, croci, iunci rotundi, balsami, seminis iridis illiricæ, cardamomi, amomi, nardi, singulorum.

Malagma.

LIBER.

P. XVI. quibus adiicitur nardinum unguentum, donec cæratı crassitudo sit. Et huius quidem recentis usus est. Si uero seruandum est, resinæ terebinthinæ. P. XVI. ceræ. P. X. ex uino leni contunduntur, tum eo miscentur.

Malagma ad lienem.

T si lienis torquet, glādis, quam βάλανος græci uocant: cortex, et nitrum paribus portionibus contunduntur: respergunturq; aceto quā acerrimo. Vbi cæratı crassitudinem habet, linteo antea in aqua frigida madefacto illinitur: et sic imponitur: supraq; farina hordacæ inijcitur: sed manere ibi non amplius sex horis debet, ne lienem consumat. satiusq; est id bis, aut ter fieri. Communem autem et iocineri, et lienem, et abscessibus, et strumæ, parotidibus, articulis, calibus quoq; suppurantibus, aut aliter dolentibus, etiam concoctioni uentris Lysias cōposuit ex hyssopi, panacis, styracis, galbani, resinæ, singulorum. P. II. ammoniaci, bdellij, cære, seu taurini, iridis aridæ. P. IIII. calclirios acetabulo, piperis granis quadraginta. quæ contrita iripo unguento temperantur.

Malagma ad laterum dolores.

D laterum autem dolores compositio est, A pollophanis, in qua sunt resinæ terebinthinæ, turis, fuliginis, singulorū P. IIII. bdellij, ammoniaci, iridis, seu uitalini, aut capri= ni à renibus siccı singulorum. P. IIII. Hæc aut eadem omnem dolorem leuant: dura emolliunt: mediocriter calefaciunt. Ad idem latus Andree quoq; malagma est: quod et resoluit: educt humorem: pus maturat: ubi id maturum est, cutem rumpit: ad cicatricem perducit. prodest impositum minutis, maioribusq; abscessibus: item articulis: ideoq; et coxis: et pedibus dolentibus. item si quid in corpore collisum est, reficit: præcordia quoq; dura, et inflata emollit: ossa extrahit. ad omnia deniq; ualet, quæ adiungere calor potest. id habet ceræ. P. I. uisci, sycamini, quam aliis sycamorum uocat: lacrimæ singulorū. P. XI. piperis et rotundi, et longi, ammoniaci, rhiniamatis, bdellij, iridis illyricæ, cardamomi, amomi, xilobalsami, thuris masculi, myrræ, resinæ aridæ, singulorum. P. X. pyretri, coacti gnidij, spumæ nitri, salis ammoniaci, aristolochiæ creticæ, radicis ex cucumre agrestis, resinæ terebinthinæ liquidæ singulorum. P. XX. quibus adiicitur unguenti

unguenti irini quantum satis est ad ea mollienda, atq; coeunda.

Malagmata ad resoluenda quæ astricta sunt: & mollienda
quæ dura sunt: & digerenda quæ coeunt.

Receptum uero est ad resoluenda quæ astricta sunt: molliē
da quæ dura sunt: digerenda quæ coeunt: id quod ad Poly-
archum authorem refertur. habet iunci quadrati, cardamo-
mi, thuris, fuliginis, amomi, ceræ, resinæ liquidæ pares portiones.

Aliud malagma ad eadem.

Liud ad eadem Nilei crocomagmatis, quod quasi recremē
tū eius est. P. XIII. ammoniaci, thymiamatis, ceræ, singulorū,
P. XXX. ex quibus duo priora ex aceto teruntur: ceræ cū ro-
sa liquatur: & tum omnia iunguntur.

Malagma moschi ad molliendum.

Proprie etiam dura mollit id, quod Moschi esse dicitur. habet
galbani unciam, thuris fuliginis. P. Z. ceræ, ammoniaci, thy-
miamatis trientes, picis aridæ. P. XII. aceti heminas tres.

Malagma medi ad digerenda quæ coeunt.

Fitur etiam ad digerēda quæ coeunt sub authore Medo,
quod habet ceræ. P. Z. panacis. P. semis, squamæ aeris, alumi-
nis rotundi, item scissilis, singulorum. P. Z. plumbi combusti
P. I. & semis.

Malagma Panthemii ad eadem.

De eadē Panthemius utebatur calds. P. semis, sinapis contriti,
item fœni graci, aluminis, singulorum. P. I. Seni bubuli. P.
II. & semis.

Malagma ad strumas.

De strumam multa malagmata inuenio. Credo autem quo
peius id malum est, minusq; facile discutitur: eo plura esse
tentata, quæ in personis uarie responderunt. Andreas author
est, ut hæc misceantur urticæ seminis. P. XI. pipis rotundi, bdellij, gal-
bani, ammoniaci, thymiamatis, resinæ aridæ, singulorū. P. XIII.

Aurelij Cor.

LIBER

resinæ liquidæ, ceræ, pyretri, piperis longi, lactucæ marinæ seminis, sulphuris ignem non experti: quod ἀπὸ πυρὸς vocatur, fecis aridæ, acetæ, spumæ nitri, salis ammoniaci, sinapis, cardamomi, radicis ex cucumero siluestri, resinæ, singulorum. P. XV. Quæ ex leni uino contunduntur.

Aliud malagma ad id ualens.

Xpeditius ad idem fit: quod habet uiscæ, semini, stercoreis, resinæ, sulphuris ignem non experti pares portiones. Et in quo est sulphuris. P. XI. lapidis quæ πυρίτην vocat. P. XIII. umini acetabulum. Itē in quo est lapidis eiusdem pars una, sulphuris duæ partes, resinæ terebinthinæ partes tres.

Malagma ad strumam, & phymata.

frabris malagma

Rabis autem cuiusdam est ad strumam, & orientia tubercula, quæ πυμάτα vocantur: quod hæc digerit. Habet myrrhæ, salis ammoniaci, thuris, resinæ & liquidæ & aridæ, crocomagmatis, ceræ, singulorum. P. XI. lapidis eius: quem πυρίτην vocat. P. XIII. quibus quidam adiciunt sulphuris. P. II.

Malagma ad strumam, & tubera, & carcinodas.

St etiam proficiens in struma, & in his tuberculis: quæ diffiliter concoquuntur, & in his: quæ καπνιδόου vocantur: quod ex his constat. sulphuris. P. XII. nitri. P. XIII. myrræ. P. XVI. fuliginis thuris. P. semis, salis ammoniaci. P. Z. ceræ. P. I.

Malagma protarchi ad parotidas, & fauam, & mala ulcera.

Rotarchus autem ad parotidas eaq; tubercula: quæ μεμμήτια idest faui uel πυμάτα nominantur: item mala ulcera, pumicis, resinæ pineæ liquidæ, thuris fuliginis, spumæ nitri, iuidis, singulorum. P. XVIII. cu ceræ. P. XVIII. miscebat: hisq; olei cyathum, & dimidium adiciebat.

Malagma aduersus panum, & phymata.

T aduersus panum tum primum orientem: quod πυρίτης græci uocant, & omne tuberculum: quod πυμα nominatur, miscetur ochra: quæ attice nominatur cum dualis partibus similæ, hisq; contunditur: subinde mel instillatur: donec malagmatis crassitudo sit.

Malagma aduersus phymata.

Iscaitit etiā omne tuberculum: quod $\phi\mu\alpha$ uocatur: id quod
 d habet calcis, nitri spumæ, piperis rotundi, singulorum. P. XI.
 galbani. P. XII. salis. P. XIII. quæ excipiuntur ærato ex ro-
 sa facto.

Malagma ad suppressendum omne quod abscedit.

Vpprimittq; omne quod abscedit id: in quo est galbani, fabæ
 fresæ, singulorum. P. XI. myrræ, thuris, ex radice cyparis
 corticis, singulorum. P. XIII. Satisq; omnia abscedentia di-
 gerit nurex combustus, & bene contritus, aceto subinde adiecto.

Malagma ad sanguinem suppressendum, & phymata.

T si satis sanguis subit: recte inponitur quod aduersus $\phi\mu\alpha$
 a $\mu\alpha\tau\alpha$ quoq; potest. Constat ex his bdellij, styracis, ammoniaci,
 galbani, resinæ & aridæ, & liquidæ pineæ. Item ex lentis-
 sci, thuris, iridis singulorum. P. XII.

Malagma ad carcinodas, & phymata lenienda.

$\alpha\pi\mu\iota\theta\delta\alpha\upsilon$ uero, & $\phi\mu\alpha\tau\alpha$ commode his leniuntur: galbani,
 uisci, ammoniaci, resinæ terebinthinæ in singulis. P. XI. seui
 taurini. P. semis, fecis combustæ quā maxima portione, di-
 id siatius non faciat: quā esse malagma oportet.

Malagma ad liuorem faciei contusæ.

Vod si facie contusa liuor subcreuitus est: hæc cōpositio no-
 q dte & die impoſitu tollit. Aristolo: hie, thapsiæ, singulorū.
 P. XII. bdellij, styracis, ammoniaci, thymiamatis, galbani, re-
 sine aridæ, & ex lentisco liquidæ, thuris masculi, iridis illyricæ, æ-
 ræ singulorum. P. XIII. Idem faba quæq; impoſita præſtat.

Malagnata stomachica ad aperiendum.

Vnt etiā quedam malagnata: quæ $\sigma\phi\mu\alpha\tau\iota\kappa\alpha$ græci uo-
 cant: quoniam aperiendi uim habent. Quale est quod ex
 f his constat. piperis longi, stumæ nitri, singulorum. P. XII
 erisimi. P. XIII. Quæ cum melle miscentur. Idoneaq; etiā strumæ
 aperiendæ sunt eius generis. Vchementiusq; ex his est id quod habet
 calcis. P. XIII. piperis grana sex, nitri, æræ, singulorum. P. XX. mel-
 lis. P. Z. olei heminam.

LIBER

Niconis malagma ad resoluendum,
aperiendumq; ac purgandum.

Iconis quoq; est quod resoluit: aperit: purgat. Habet alcyo-
nium, sulphur, nitrum, pumicem paribus portionibus: qui-
bus tantum picis, & ceræ adijcitur, ut fiat cerati crassitudo.

Malagma ad ossa, & nervos.

Ossa autē Aristogenis fit ex his. sulphuris. P. XI. resinæ te-
rebinthinæ, nitri spumæ, & ex scylla partis interioris, plu-
bi eloti singulorū. P. XII. thuris fuliginis. P. XVII. ficus ari-
dæ quàm pinguiissima, seui taurini, singulorū. P. XVIII. ceræ. P. XXI.
iridis macedonica. P. XVI. sesami fricti acetabulum. maximiq; ner-
uis & articulis malagma conuenit.

Malagma Euthylei ad articulos, & ad omnem dolorem.

Gitur Euthylei est et ad articulos, & ad omnem dolorem,
& ad uesticæ, & ad recentis cicatrice contractos articulos:
quas ἀνύλας græci nominant. quod habet fuliginis thuris
acetabulum, resinæ tantundem, galbani sine furculis sesquiciam, am-
moniaci, bdellij, singulorū. P. XIII. ceræ. P. semis. Aliud item fit: quod
habet iridis, ammoniaci, galbani, nitri singulorū. P. XIII. resinæ li-
quidæ. P. XVI. ceræ. P. XVI.

Malagma Sasogoræ ad dolores articulorum.

Dolores articulorum Sasogoræ, plumbi combusti, papau-
ris lacrymæ, corticis hyoscyami, styracis, peucedani, seui, re-
sinæ, ceræ pares portiones.

Chrysippi malagma, ad idem ualens.

Chrysippi, resinæ liquidæ, sandaracæ, piperis singulorum
P. XII. quibus ceræ paulum adijcitur.

Clesipontis malagma, ad idem ualens, & ad parotidas,
& phymata, & strumam.

Lesypontis ceræ creticæ, resinæ terebinthinæ, nitri quàm
ruberrimi, singulorū. p. semis, olei cyathi tres. sed id nitrum
ante

ante per triduum instillata aqua teritur, & cum sextario eius inco-
quitur: donec omnis humor consumatur. Potest uero ea compositio etiā
ad parotidas, phymata, strumiam, omnemq; coitum humoris emolli-
endum.

Malagma ad articulos.

- a D articulos fici quoq; aridi partem nepetæ mixtam, uel unā
taminiam siue seminibus, cum puleio recte aliquis imponit.

Malagma Aristonis aduersus podagras, & recētia phy-
mata, & omnis dolores.

- e Adem podagræ præsidia sunt. Sed ad eam fit Aristonis
quoq; quod habet nardi, cinnamomi, cassiæ, chamæleontis, iūci
rotundi, singulorum. P. XVIII. semi caprini ex irino liquati.
P. XXX. iridis. P. XI. quæ in aceto quā acerrimo iacere per viginti
dies debet. Idem autem etiam recentia phymata, doloresq; omnes di-
scutit.

Theoni malagma ad pedum dolores.

- a T Theonius ad pedum dolores seui à renibus partem tertiā,
salis partes duas miscebat, hisq; membranulā illitam impo-
nebat: tum super iniiciebat ammoniacū, thymiana in aceto liquatū.

Numenij malagma ad podagram cæteros
que articulos induratos.

- a T Numenius podagram, cæterosq; articulos induratos hoc
molliebat. abrotani, rosæ aridæ, papaueris lacrimæ, singu-
lorū. P. XIII. resinæ terebinthinæ. P. XIII. thuris, spumæ
nitri, singulorum. P. XVIII. iridis, aristolochiæ, singulorum. P. XXII.
ceræ. P. XIII. qbus adijciatur cedri cyathus unus, olei laurei cyathi
tres, olei acerbi sextarius.

Dexij malagma si quando callus in articulis increuit.

- f I quando autem in articulis callus increuit Dexius docuit
imponere calcis. P. XIII. cerussæ. P. VIII. resinæ pineæ.
P. XXX. piperis grana. XXX. ceræ. P. Z. Quibus dum con-
tunduntur, hemina uini lenis instillatur.

De emplastris. Caput. XVIII.

- e X emplastris autem nulla maiorem usum præstant: quā
quæ cruentis protinus uulneribus iniiciuntur, εὐπλαστῆρ *græci*

i ij

Emplastrum

LIBER

uocant. Hæc enim reprimunt inflammationem nisi magna uis eam
cogit, atq; illius quoq; impetum minuunt, tum glutinant uulnera: quæ
id patiuntur: cicatricem hisdem inducunt. Constant autem ex medicam
mentis non pinguibus, ideòq; ἀλιπείν nominantur.

Barbarum emplastrum nigrum, quod cruentis
protinus uulneribus inicitur.

Primum ex his est quod barbarum uocatur. Habet æruginis
r. sc. P. XXII. spumæ argenti. P. XXX. aluminis, picis aridæ,
resinæ pineæ aridæ, singulorum. P. XI. quibus adiunguntur
olei, & aceti singulæ hemina.

Coacan emplastrum nigrum ad idem ualens.

Lterum ad idem: quod χόανον uocant: habet spumæ argenti
P. XC. resinæ aridæ tantundem. Sed spuma prius ex tribus
olei heminis coquitur. His duobus emplastris color niger est:
qui ferè talis fit. ex pice, atq; resina. At ex bitumine nigerrimus. ex
ærugine, aut æris squama uiridis. ex minio rubet. ex cerussa albus.

Basilicon emplastrum nigrum ad idem.

Auce admodum compositiones sunt, in quibus aliquid mi-
xturæ uarietas nonat. Ergo id quoq; nigrum est. quod βασι-
λινόν nominatur. Habet panacis. P. XI. galbani. P. XII. picis
& resinæ, singulorum. P. XX. olei dimidium cyathum.

Smaragdinum emplastrum ad idem.

T quod peruiride est, smaragdinū appellatur. in quo sunt
resinæ pineæ. P. XIII. ceræ. P. XI. æruginis. P. semis. turis
fuliginis. P. Z. olei tantundem, aceti, quo fuligo, & ærugo in
unum cogantur.

Emplastrum ruffum ad idem.

St etiam coloris ferè ruffi: quod celeriter ad cicatricem uul-
nera perducere uidetur. Habet thuris. P. XI. resinæ. P. XII.
squamæ æris. P. XIII. spumæ argenti. P. XXX. ceræ: P. X
C. olei heminam.

Paracollecticum emplastrum ad idem.

Rætereæ est: quàm παρακολητικόν à glutinando uocant.
Constat ex his. bituminis, aluminis scissilis. P. XIII. spumæ
argenti. P. XL. & olei ueteris hemina.

Color emplastrum
a qb. p. d. b.

Basilicon

Cephalicum emplastrum Philotæ capiti conueniens.

19.

Cephalicum.

Rætereæ sunt quædam generis eiusdem: quæ: quia capitibus fractis maxime conueniunt: κεφαλικὸν à græcis nominantur. philotæ compositio habet terræ erythræ, chalcitidis, singulorū. p. XIII. myrrhæ, æris combusti. p. XX. ichthyocollæ, singulorū. p. XVI. ærugnis rase, aluminis rotundi, mysi crudi, aristolochiæ, singulorum. p. XVIII. squamæ æris. p. XX. thuris masculi. p. XII. ceræ. p. I. rosæ & olei acerbi ternos cyathos, aceti quantum satis est: dum arida ex eo conteruntur.

Emplastrum uiride ad idem ualens.

Id ad idem uiride: æris combusti, squamæ æris, myrrhæ ichthyocollæ, singulorum. p. XVI. mysi crudi, ærugnis rase, aristolochiæ, aluminis rotundi, singulorum. p. XVIII. ceræ. p. XI. olei hemina, aceti quod satis sit.

τετραφάρμακον emplastrum ad pus mouendum.

Vri autem mouendo non aliud melius, quam quod expeditissimum est. τετραφάρμακον à græcis nominatur. habet partes portiones ceræ, picis, resinæ, seui taurini: si id non est, uitulini.

tebapharmakos

Enneapharmachum emplastrum ad pus mouendum, & ad purgandum ualens.

Iterum ad idē ἐννεαφάρμακον nominatur: quod magis purgat. constat ex nouē rebus, cera, melle, seuo, resina, myrrha, rosa, medulla uel ceruina uel uitulina uel bubula, hyssopo, bityro. Quorum ipsorum quoque pondera paria miscentur. Sunt autem quædam emplastra: quibus utriusque rei facultas est. quæ si singula habenda sunt, meliora sunt. Sed in copia reijcienda sunt: his potius adhibitis: quæ proprie id, quod eo tempore opus est, consequuntur. Exempli causa duo proponam.

Attalum emplastrum ad uulnera.

Si igitur ad uulnera attalum: quod habet squamæ æris. p. XVI. fuliginis. p. XXV. ammoniaci tantundem. resinæ terebinthinæ liquidæ. p. XXXV. seui taurini tantundem, aceti heminas tres, olei sextarium.

i iij

LIBER

Iudei emplastrum fracto capiti accomodatum.

T inter ea quæ fracto capiti accomodantur, habet quidam
a id quod ad auctore iudeum refertur. Constat ex his. salis.
 P. XIII. squamæ æris rubri, æris combusti. singulorum. P.
 XXII. ammoniaci, thymiamatis, thuris fuliginis, resinæ aridæ, singu-
 lorum. P. XVI. resinæ colophonice, ceræ, seu vitulini curati, singu-
 lorum. P. XXX. acetis sesquicyathum, olei minus cyathum. τὸ περὶ τοῦ
 μέντοι ἑσπεριον appellant: quæ curata vocant, cum ex seuo puta omnes mē-
 branulæ diligenter exemptæ sunt, aut ex alio medicamento.

Diadaphnidon emplastrum ad extrahendum.

Επεσπαστικά

*V*nt etiam quædam emplastra nobilia ad extrahendum.
s Quæ ipsa quoq; ἐπισπαστικά nominatur. Quale est: quod,
 quæ lauri baccharum habet διαδαφνιδόν appellatur. in eo est, re-
 sinæ terebinthinæ. P. XX. nitri, ceræ, picis aridæ, baccharum lauri, sin-
 gulorum. p. XXX. olei paulum. Quotiens aut baccharum, aut nucem, aut
 simile aliquid posuero, scire oportebit, anteq; expendatur, ei summam
 pelliculam esse demendam.

Aliud διαδαφνιδόν ad extrahendum, et pus mouendum.

*L*iud eo nomine: quod puri quoq; mouendo est, seu vitulini,
a ammoniaci, thymiamatis, picis, ceræ, nitri, baccharum lauri,
 resinæ aridæ, aristolochiæ, pyretri pares portiones.

Philocratis emplastrum ad extrahendum, et pus mouendum.

*P*æter has est philocratis: quod habet salis ammoniaci. P.
 XVII. aristolochiæ. P. XVIII. ceræ, resinæ terebinthinæ. fu-
 liginis thuris, singulorum. P. XXV. spumæ argenti. P. XXXII. Quibus
 ut pus quoq; moueât, iridis. P. XIII. et galbani. P. XVI. adiunguntur.

ῥύ τῶδες emplastrum ad extrahendum.

*P*rimum tamen ad extrahendum est id: quod à similitudine
o sordium ῥύ τῶδες græci appellât. Habet myrræ, croci, iridis,
 propolis, bdellij, capitulorum punici mali, aluminis et scissi-
 lis, et rotundi. mysi, chalcitis, atramenti sutorij cocti, panacis, salis am-
 moniaci, misci, singulorum. P. XIII. aristolochiæ. P. XVIII. squamæ
 æris. P. XXVI. resinæ terebinthinæ. P. LXXV, ceræ, et seui, vel tau-
 rini, vel hircini. P. XC.

Emplastrum

Emplastrum Hecatei ad extrahendum.

h Ecce quoq; auctore emplastrum generis eiusdē fit ex his.
galbani. P. XII. fuliginis thuris. P. XIII. picis. P. XVI. cere,
Et resinæ terebinthinæ, singulorum. XVIII. quibus paulū
irini unguenti miscetur.

Alexandrinum emplastrum uiride ad extrahendum.

u Alensq; ad idem emplastrum uiride alexandrinum est.
Habet aluminis scissilis. P. XVIII. salis ammoniaci. P. XV
III. Z. squamæ aeris. P. XVI. myrrhæ, thuris singulorū. P.
XVIII. cere. P. CL. resinæ colophoniacæ, aut pineæ. P. CC. olei
heminam, aceti sextarium

De emplastris exedentibus.

q Vædam autem sunt emplastra exedentia: quæ τετρα γράκι
uocant quale est id quod habet resinæ terebinthinæ, fuligi-
nis, thuris, singulorum. P. Z. squamæ aeris. P. XI. ladani. P.
XII. aluminis tantundem, spumæ argenti. P. XIII.

Emplastrum quod exest corpus, Et ossa resoluit, Et
super crescentem carnem coerct.

e Xest etiam uehementer corpus, atq; ossa quoq; resoluit, Et
super crescentem carnem coerct id quod habet spumæ ar-
genti, squamæ aeris, uncias singulas, nitri ignem non expti,
lapidis asij, aristolochiæ. p. sextantes, cere resinæ terebinthinæ, thuris
olei ueteris, atramenti sutorij, salis ammoniaci. P. semis, æruginis, rase.
p. bessem, aceti scyllitici heminam, uini aminei tantundem.

Emplastra aduersus morsus, Et alia recentiora ulnura.

f Vnt etiam aduersus morsus quedam accomodata quale est.
Diogenis, nigrum: quod habet bituminis, cere, resinæ pineæ
aride, singulorū. P. XXX. spumæ argenti. P. XC. olei sexta-
rium. Aut in quo sunt squamæ aeris. P. XIII. cerussæ, Et æruginis
passæ singulorū. P. XVIII. ammoniaci. P. XII. cere, resinæ pineæ.
singulorum. P. XXV. spumæ argenti. P. XC. olei sextarium. Aut in
quo sunt squamæ aeris. P. XIII. galbani, P. XVI. cerussæ, Et ærugi-
nis rase, singulorum. P. XVIII. ammoniaci. P. XII. cere, resinæ pi-
neæ singulorum. P. XLV. spuma argenti concoquitur.

Alexand.

III
sepho.

Diog.

LIBER

ἑμπίον emplastrum rubrum ad idem valens.

Vbrum quoque emplastrum, quod *ἑμπίον* vocatur, huc aptum est. Habet resinæ terebinthinæ. P. XII. galbani. P. X. IIII. minij sinopici. P. XVI. thuris fuliginis. P. XVI. ceræ P. XVIII. spumæ argenti. P. XLVI. olei ueteris heminam.

Aliud emplastrum ad idem valens.

Tē id quod ex his constat. squamæ æris: thuris fuliginis: singulorū. P. XIII. galbani. P. XVI. salis ammoniaci. P. XII. Z. ceræ. P. XXXV. olei tribus heminis. Hæc autē alijs quoq; recentioribus vulneribus recte impouuntur.

λαυὰ emplastra non grauibz vulneribus accommodata, et maxime senilibus.

Vnt enim alba lenia: *λαυὰ* græci vocant. ferè nō grauibz vulneribus accommodata, præcipuèq; senilibus. Quale est qđ habet cerussæ. P. XXXII. seu vitulini curati, et ceræ: singulorum. P. XLVIII. olei heminas tres; ex quibus ea cerussa coquitur.

Elephantinum emplastrum.

Liud qđ hēt cerussæ. P. XXX. ceræ. P. XXXV. olei hemina, aquæ sextariū. Quæ quotiens adiungitur cerussæ uel spumæ argenti: scire licet illa ex his coquēda esse. Est autē ea p̄cādida cōpositio quæ supra posita est, ideoq; elephantina nominatur.

Lenia emplastra.

Enia quoq; quædam emplastra sunt, quas *λεπὰ* ferè græci nominant: ut id quod habet minij. P. XIII. spumæ argenti. P. XXXV. ceræ et adipis suillæ. singulorum. P. XXXVII vitellos quatuor.

Emplastrum lene.

Lia compositio generis eiusdem: ceræ, resinæ terebinthinæ, singulorum. P. XVI. cerussæ. P. XVIII. spumæ argenti, plūbi recrementi, *σινωπίαν* *μολύβδου* græci vocant, singulorum P. XXX. citini olei, et myrti, singulorum heminæ.

Archagathi emplastrum lene.

Etia quæ ad auctorem Archagathum refertur, mysi cocti, æris combusti, singulorum. P. XIII. cerussæ coctæ. P. XVIII resinæ terebinthinæ. P. XX. spumæ argenti. P. XVI.

QVINTVS 70
Emplastra eiusdem generis ad leniendum apta.

Tiam num spumæ, argenti, ceræ, adipis suillæ singulorum
P. XXXVII. vitelli cocti quatuor, rosæ hemina, Aut cerati ex
oleo myrteo facti partes tres, adipis suillæ pars quarta, pau-
lum ex plumbi recremento. Aut spumæ argenti sēlibra ex olei hemi-
na, & aquæ marinæ altera cocta donec bullire desierit, cui paulum
ceræ sit adiectum, aut pares portiones ceræ, seui, sibi, spumæ argenti,
ceruſæ.

De pastillis, & primo de his, qui ad recentia vulnera glutinā-
da, sanandaq; apti sunt. Cap. XX.

Pastillus.

Pastilli quoq; facultates diuersas habent. sunt enim ad recen-
tia vulnera glutinanda, sanandaq; apti. Qualis est qui ha-
bet chalcitis, myſi, spumæ nitri, floris æris, gallæ, aluminis
ſciſſilis modice cocti, singulorum. P. XI. æris combusti, capitulorum ma-
li punici, singulorum. P. XII. Hunc oportet diluere aceto, sic, ubi vul-
nus glutinandū est, illinere. At si nervosus aut musculosus is locus est,
cōmodius est, cerato mſcere sic, ut illius octo partes: nona huius sit.

Alius pastillus ad glutinanda vulnera.

Lius ad idem cōstat ex his, bituminis, aluminis ſciſſilis, sin-
gulorum. P. XI. æris combusti. P. XIII. spumæ argenti. P. X.
XI. olei sextarium.

De sphragde pastillo: quē Polybus confect, ad glutinandū vulnus.

Sed longe polybi celeberrimus est. oppari s autē nominatur.
qui habet aluminis ſciſſilis. P. XI. Z. atramenti sutorij. P. X
II. myrrhæ. P. XV. aloes tantundē, capitulorum punici mali, fellis tau-
rini, singulorum. P. XVI. Quæ contrita uino austero excipiuntur.

Pastillus ad ulcera sordida, & nigritiem in auribus, nari-
bus, obscenis partibus, inflammationesq; eorum.

Dulcera sordida & nigritiem in auribus, naribus, obscenis
partibus, inflammationesq; eorum, chrysocollæ. P. XI. atra-
menti sutorij, aluminis ſciſſilis, singulorum. P. XII. halicacabi corticis.
P. XIII. minij. P. XVI. spumæ argenti. P. XII. ceruſæ. P. XXVI.
Quæ ex aceto & coguntur, & ubi utendum est, diluuntur.

Past. Andronis

LIBER

Pastillus andronis ad uenam inflamatam, ad naturalia sordida etiam cancro laborantia.

Andronis uero est ad uenam inflamatam, ad naturalia sordida etiam cancro laborantia, gallæ, atramenti sutorij, myrrhæ singulorum. P. xij. aristolochiæ, aluminis scissilis, singulorum. P. xii. capitula punici mali. P. xxxv. ex passo coacta, et cuius usus exigit aceto, uel uino diluta, prout ualentius, aut lenius uitium est, cui medendum est.

Pastillus ad fissam anam, uel ora uenarum fundentia sanguinem, uel cancerum.

Proprie autem ad anam fissam, uel ora uenarum fundentia sanguinem, uel cancerum, æruginis. P. xii. myrrhæ. P. xxii. stibis, lacrymæ papaueris, acaciæ, singulorum. P. xxvi. Quæ ex uino, et teruntur, et in ipso usu deliquantur.

Pastillus ad expellendum calculum cum urina.

Expellere autem ex uesica cum urina calculum uidetur hæc compositio. casia, croci, myrrhæ, costi, nardi, cinnamomi, dulcis radicis, balsami, hyperici, pares portiones conteruntur. deinde uinum lene instillatur, et pastilli fiunt: qui singuli habeant. P. xz: biq; singuli quotidie mane ieiuno dantur.

Pessum

De pessis. Caput. XXI.

Hæc tria compositionum genera: id est quæ in malagmatis, pastillis, emplastrisq; sunt. maximè præcipueq; uarium usum præstant. Sed alia quoq; utilia sunt. ut ea quæ foeminis subiciuntur (παραούς græci uocant) eorum hæc proprietas est, medicamenta composita molli lana excipiuntur, eaq; lana naturalibus conditur.

Ad sanguinem euocandum.

Ad sanguinem autem euocandum canneis duabus adijcitur nitri. P. xii. aut alij semen coteritur. adijcitur myrrhæ paululum, et unguento susino miscetur, aut cucumeris siluestris pars interior ex lacte muliebri diluitur.

Ad uulvam molliendam.

Ad uulvam molliendam oui vitellus, et foenum græcum, et rosa, et crocum temperantur. Aut elaterij. P. xz. salis tantundem, uulæ taminia. P. xvi. mille excipiuntur.

Alia pessi compositio ad idem ualens.

¶ Ut Boetho auctore, croci resinæ terebinthinæ, singulorum
P. IIII. myrræ. P. X. ZZ. rosæ. P. XI. seu uulini. P. X. Z.
cera. P. XII. miscentur.

AD inflammationes uulnæ Numenij, Pessus.

Prima autem aduersus inflammationes uulnæ Numenij com-
positio est: quæ habet croci. P. X. Z. cera. P. XI. butyri. P. X.
VIII. adipis anserinæ. P. XXII. uitellos coctos d uos, rosæ
minus cyatho.

Ad eijciendum è uulua infantem mortuum.

¶ I uero infans intus decessit: quo facilius eijciatur, malicorium
ex aqua terendum: eoq; utendum est.

Si mulier uitio locorum concidit, quæ curatione utendum sit.

¶ I concidere uitio locorum mulier solet, cochleæ cum testis suis
comburendæ, conterendæq; deinde his mel adijciendum est.
Si non comprehendit, adeps leonina ex rosa mollienda est.

De medicamentis quibus aridis utimur, ad carnem super-
crescentem exedendam. Caput. XXII.

Vadam autem mixturæ medicamentorum sunt: quibus ari-
dis neq; coactis utimur sic, ut inspergamus: aut cum aliquo
liquido mixta illinamus: quale est ad carnem supercre-
scentem exedendam. qâ habet squamæ, fuliginis thuris singuloru. P. XI.
æruginis. P. XII. Hæc aut eadem cum melle purgant ulcera: cum cera
implent. Myse quoq; et galla si paribus portionibus misceantur, corpus
consumunt: eaq; uel arida inspergere licet: uel excepta admixta illinere.

Ad putrem carnem continendam ne ultra serpat, eamq;
leniter exedendam plures compositiones.

¶ Vtrem uero carnem continet, neq; ultra serpere patitur, et
leniter exest mel, uel cum lenticula, uel cum marrubio, uel
cum oleæ folijs ante ex uino decoctis. Item fertula campana
in mulso cocta, deinde contrita, aut alix cum cerato, aut amara nuxes
cû allio sic, ut huius pars tertia sit: paulumq; his croci adijciatur. aut
quod habet spumæ argenti. P. XVI. cornu bubuli combustu. P. XXII.

Puluis

Mel. & Cera

Al. & Cera

LIBER

aluminis scissilis, thuris, singulorum. P. XXXIII. gallæ. P. XXVIII. aristolochiæ. P. XX. Veementius idem facit etiam adurendo, auripigmentum cum chalcitide, aut nitro, aut calce, aut charta combusta. Item sal cum aceto. Vel ea compositio quæ habet chalcitidis, capitulorum punici mali, aloes, singulorum. P. XII. aluminis scissilis, thuris, singulorum. P. XXXIII. gallæ. P. XXVIII. aristolochiæ. P. XX. mellis quantum satis sit ad ea cogenda. Vel catharides. P. XI. sulphuris. P. XI. lolij. P. XIII. Quibus adjicitur picis liquida quantum satis est. adiungendum uel chalcitis quoque cum resina, et ruta mixta. aut cum eadem resina: diphryges, aut uua aminia cum pice liquida. Idem uero possum feces uini combustæ, et calcis, et nitri pares portiones, uel aluminis scissilis. P. XXZ. thuris sandaracæ, nitri singulorum. P. XI. gallæ. P. XXVIII. aristolochiæ. P. XX. mellis quantum satis est.

Hieræ compositio.

Et etiam hieræ compositio. quæ habet myrrhæ, chalcitidis, singulorum. P. XII. aloes, thuris, aluminis scissilis, singulorum. P. XXXIII. Aristolochiæ, gallæ immaturæ, singulorum. P. XXVIII. malicorij contriti. p. XX.

Iudei compositio.

Et iudei in qua sunt calcis partes duæ, nitri quæ ruberrima pars tertia. quæ urina impuberis pueri cogitur, donec strigmeti crassitudo sit. sed subinde is locus: cui id illinitur: malefaciendus est.

Iolæ compositio.

T iolas, chartæ combustæ, sandaracæ, singulorum. p. XI. calcis. p. XII. auripigmenti tantumdem miscebat.

Ad sanguinis profluvia, uel ex membrana cerebri, uel alijs locis et ad cancerum, et ad inducendam cicatricem, et ad coercentem carnem crescentem.

ad sang. etc.

I uero ex membrana: quæ super cerebrum est, profluit sanguis, utellus combustus et contritus inspergi debet. Si alio loco sanguinis profluvium est, auripigmenti, squamæ aris, singulorum. P. XI. sandaracæ. P. II. marmoris cocti. P. XIII inspergi debet. Eadem cancro quoque obfistunt. Ad inducendam cicatricem, squamæ aris, thuris fuliginis, singulorum. P. XII. calcis. P. III. Eadem increescentem quoque carnem coercent.

Timei compositio ad ignem sacrum, uel cancrum.

Imeus autem ad ignem sacrum, uel ad cancrum, his utebatur.
Myrræ. P. XII. thuris, atramenti sutorij, singulorum. P. XIII.
sandaracæ, auripigmenti, squamæ æris, singulari. P. XIII.
gallæ. P. XVI. cerussæ combustæ. P. XVIII. Eadem uel arida insper-
sa, uel melle excepta idem præstant.

Ad sternutamenta excitanda.

Sternutamenta uero, uel albo ueratro, uel struthio coniecto
in naves excitantur, uel his mixtis: piperis, ueratri albi, sin-
gulorum. P. XZ. castorei. P. X. spumæ nitri. P. XI. struthij. P. XIII.

Gargariizationes quibus fieri debeant.

Gargariizationes autem aut lenandi causa fiunt, aut reprimē-
di, aut euocandi. Lenati lac, cremor uel ptisanæ, uel furfurū.
Reprimit aqua, in qua uel lenticula, uel rosa, uel rubus, uel
cotoneum malum, uel palmulæ decoctæ sunt. Euocant, sinapi, piper.

De antidotis, & quibus malis opitulentur. Caput. XXIII.

Antidota raro, sed præcipue interdum necessaria sunt: quia
a grauissimis casibus opitulantur. Ea recte quidem datur col-
lisis corporibus uel per ictus, uel ubi ex alto deciderunt, uel
uiscerum, laterum, faucium, interiorumq; partiū doloribus. Maxime
autem desideranda sunt aduersus uenena uel per morsus, uel per ci-
bos, aut potiones nostris corporibus inserta.

Compositio antidoti.

Num est: quod habet lacrymæ papaueris. P. XZ. acori, ma-
lobachri. P. XV. iridis illirica, gummi, singulorum. P. XII.
anesti. P. XIII. nardi gallici, foliorum rosæ aridorū, carda-
moni, singulorum. P. p. IIII. petroselinū. P. p. IIII. Z. folij. P. p. V. casia
nigræ, silis, bdellij, balsami, seminis piperis albi, singulorum. P. XZ. sty-
racis. P. V. Z. myrræ, oppoponacis, nardi syrii, thuris masculi, hypocisti-
dis succi, singulorū. P. XVI. castorei. P. XVI. costi, piperis albi, galbani,
resinæ terebinthinæ, croci floris, iunci rotundi, singulorum. P. VI. Z.
dulcis radicis. P. p. VIII. Z. Quæ uel melle, uel passo excipiuntur.

Sternutatoria

Gargaria

Antidotes

Compositio

LIBER

Aliud antidotum Ambrosia nominatum, quod Zopyrus
Ptolemæo regi composuit.

Iterum quod Zopyrus regi Ptolemæo dicitur composuisse,
atq; Ambrosia nominasse: ex his constat. Costi, thuris mas-
li, singulorū. P. p. V. piperis albi. P. p. Z. floris iunci rotundi. P.
II. cinnamomi. P. p. III. castæ nigræ. P. p. IIII. croci ciliij. P. p. IIII.
Z. myrræ quàm stadien nominat. P. p. V. nardi indici. P. p. V. Z. quæ
singula contrita melle cocto excipiuntur. Deinde ubi utendum est id:
quod ægyptiæ fabæ magnitudinem impleat, in potione uini diluitur.

Antidotum Mithridatis.

Obilissimum autem est Mithridatis, quod cotidie sumendo
rex ille dicitur aduersus uenenorum pericula tutum corpus
suū reddidisse. in quo hæc sunt, costi. P. p. S. Z. acori. P. p. V.
hypici, cumini, sagapeni, agaciæ succi, iridis illyricæ, cardamomi, singu-
lorū. P. p. II. anisi. P. p. III. nardi gallici, gentiæ æradici, aridorū ro-
sæ foliorum, singulorū. P. p. IIII. papaueris lacrymæ, petroselinū, sin-
gulorū. P. p. IIII. Z. castæ, silis lolij, piperis longi, singulorū. p. XVI.
styracis. p. V. Z. castorei, thuris hypocistidis succi, myrræ, opoponacis, sin-
gulorum. p. VI. Z. malobathri folij. XVI. floris iunci rotundi, resinæ
terebinthinæ, galbani, dauci cretici seminis, singulorū. P. p. VI. Z. nar-
di, opobalsami, singulorū. P. p. VI. Z. thapsis. p. XV. ZZ. radici pon-
ticæ. p. VII. croci, Zinziberis, cinnamomi, singulorum. p. XVIII. r.
Hæc contrita melle excipiuntur: et aduersus uenenum, quod magni-
tudinem nucis græcæ impleat, ex uino datur. In cæteris autem affe-
ctibus corporis pro modo eorū, uel quod ægyptiæ fabæ, uel quod Erui
magnitudinem impleat, satis est.

DE acopis. Caput. XXIIII.

Copa quoq; utilia nervis sunt: quale est quod habet floris
iunci rotundi. p. II. ZZ. costi, iūci quadrati, lauri baccharum,
ammōiaci, cardamomi, singulorū. p. p. IIII. Z. myrrhæ, æris
robusti singulorū. P. p. VII. iridis illyricæ, ære singulorū. P. p. XIII.
alexadrini calami, iunci rotundi, assalathi, xylobalsami, singulorum
P. XVIII. seu. P. I. unguenti irini cyathum.

Acopum a uides nervis utile.

Iterum quod a uides uocatur, hoc modo fit: ceræ. P. Z. olei
tantundem, resinæ terebinthinæ ad nucis iuglandis magni-
tudinem simul incoquantur: deinde infusa in mortario te-
runtur:

runter, instillaturq; subinde quàm optimi mellis acetabulum: tum iri
ni unguenti, & rosæ terni cyathi.

Expisæ ad ulcera purganda, & implenda.

Expisæ autem græci uocant, liquida quæ illinuntur. Qua-
le est quod fit ad ulcera purganda, & implenda, maximo
inter nervos paribus portionibus inter se mixtis, butyri, me-
dullæ uitulinæ, seu uitulini, adipis anserinæ, ceræ, mellis, resinæ tere-
binthinæ, rosæ, olei cicini. Quæ separatim omnia liquantur: deinde
liquida miscentur, & tum simul teruntur. Et hoc quidem magis pur-
gat. Magis uero emollit: si pro rosâ cypirus infunditur.

Ad sacrum ignem.

D sacrum ignem spumæ argenti. P. XVI. corni bubuli om-
bust. P. XII. conteruntur, adijciturq; inuicem uinum, & id
quod specialiter sil uocatur, & myrteû: donec utriusq; terni
cyathi coniungantur.

De catapotijs. Caput. XXV.

Catapotium ad somnum accersendum, & leuationem
doloris, & simul ad concoquendum.

Catapotia

Atapotia quoq; multa sunt, varijsq; de causis fiunt. αρωδύνα
uocant quæ somno dolorem leuant. Quibus uti: nisi nimia
necessitas urget, alienum est: sunt enim ex uehementibus me-
dicamentis, & stomacho alienis. Potest tamen etiam ad concoquendû:
quod habet papaueris lacrymæ, galbani, singulorum. P. XI. myrrhæ,
castorei, piperis, singulorum. P. XII. Ex quibus quod erui magnitudi-
nem habet, satis est deuorasse.

quælibet.

Catapotium ualentius ad somnum.

Iterum stomacho peius, ad somnû ualentius ex his fit, mā-
dragoræ. P. Z. apij seminis, item hyoscyami seminis, singulo-
rû. P. XIII. Quæ ex uino teruntur. Vinum autem eiusdē
magnitudinis: quæ supra posita est: abunde est sumpsisse.

Catapotium ad plurimos dolores per somnum leniendos.

Sine autem capitis dolores, siue ulcera, siue lippitudo, siue
dentes, siue spiritus difficultas, siue intestinorum tormenta,

Aurelij Cor.

k

LIBER

siue inflammatio uulue est, siue coxa, siue iecur, aut lienis, aut latus torquet, siue uitio locorum aliqua prolabiatur, & obmutescit, occurrat dolori per quietem eiusmodi catapotium. Silis, acori, rutæ siluestris seminis, singulorum. P. p. I. castorei, cinnamomi, singulorum. P. p. XII. papaueris lacrymæ, panaces, radicis mandragoræ, malorum aridorum, iunci rotundi floris, singulorum. P. p. II. piperis grana. LVI. Hæc per se contrita, rursus instillato subinde passo, simul omnia teruntur, donec crassitudo sordium fiat. Ex eo paulum aut deuoratur, aut aqua diluitur, & potui datur.

Catapotium aliud, ad multa ualens.

q Vin etiam siluestris papaueris, cum iam ad excipiendam lachrymam maturum est, manipulus qui manu comprehendendi potest, in uas demittitur, & superinfunditur aqua: quæ id contegat, atq; ita coquitur. Vbi iâ bene manipulus is coctus est, ibidem expressus proicitur, & cum eo humore passi pari mensura misceatur, inferuetq; donec crassitudinem sordium habeat. Cum infrixit, catapotia ex eo fiunt ad nostræ fabæ magnitudinem, habentq; usum multiplicem. Nam & somnû faciunt uel per se assumpta, uel ex aqua data, & aurium dolores leuant, adiectis exiguo modo rutæ succi, ac passi. Et tormina supprimunt ex uino liquata, & inflammationem uulue coercet mixta cerato ex rosa facto: cum paulum his croci quoq; accessit, & ex aqua fronti inducta, pituitam in oculos decurrentem tenent.

Catapotiû ad inducendû somnû: quod uulua dolens prohibuit.

i Tem si uulua dolens somnum prohibuit, croci. P. p. XII. anesi, myrrhæ, singulorû P. p. I. papaueris lacrymæ. p. p. XIII. citæ seminis. p. p. XVIII. miscentur, excipiunturq; uino uetere, et quod lupini magnitudinem habet in tribus cyathis aquæ diluitur. Id tamen in febre periculose datur.

Ad iecur sanandum.

a D sanandum iecur nitri. P. p. Z. croci, myrrhæ, nardi gallici, singulorum. P. p. XI. melle excipiuntur, daturq; quod ægyptiæ fabæ magnitudinem habeat.

Ad finiendos dolores lateris.

a d lateris dolores finiendos, piperis. aristolochiæ, nardi, myrrhæ pares portiones.

Ad thoracis dolores finiendos.

a D thoracis, nardi. P. XI. thuris, casie, singulorū. P. XIII. myrrhæ, cinnamomi, singulorū. P. XVI. croci. P. XVIII. resinæ terebinthinæ quadrans, mellis hemina tres.

Catapodium Athenionis ad tussim.

a D tussim Athenionis, myrrhæ, piperis, singulorum. P. p. XI. castorei, papaueris lacrymæ, singulorum. P. XI. Quæ separata contusa postea iunguntur, & ad magnitudinem fabæ nostræ bina catapodia mane, bina noctu dormituro dantur.

Catapodium Heraclidis tarentini ad tussim, & somnum.

f I tussis somnum prohibet, ad utraq; Heraclidis tarentinæ croci. P. XI. cinnamomi. castorei, papaueris lacrymæ, singulorū. P. XI. myrrhæ, pipis longi, costi, galbani, singulorū. P. Z.

Catapodium ad purganda ulcera in faucibus tussientibus.

q Vod si purganda sunt ulcera in faucibus tussientibus, panaces, myrrhæ, resinæ terebinthinæ, singulorum. P. X. galbani. P. Z. hyssopi. P. Z. conterenda sunt. huiusq; hemina mellis adiungenda, & quod digito excipi potest, deuorandum est.

Collice cassij medici.

c Ollice uero Cassij ex his constat, croci, anesi, castorei, singulorū. P. XIII. petroselinæ. P. XIII. piperis & longi, & rotundi, singulorum. P. XV. papaueris lacrymæ, iuncea rotundi, myrrhæ, nardi, singulorum. P. XVI. Quæ melle excipiuntur. Id autem & deuorari potest, & ex aqua calida sumi.

Ad infantem mortuum, aut secundas expellendas.

i Nfantem uero mortuum, aut secundas expellit aquæ potio, cui salis ammoniaci. P. XI. aut cui dictami cretici. P. XI. adiectum est.

Laborantibus ex partu quid dari debeat.

e X partu laborantibus crisimum ex uino tepido ieiunæ dari debet.

Ad adiuvandam uocem.

u Ocem adiuvat iburis. P. XI. in duobus cyathis uini datum.

Aduersus difficultatem urinae.

a Duersus urinae difficultatem, piperis longi, castorei, myrrhæ, galbani, papaueris lacrymæ, croci, costi unciæ singulae, styracis, resinæ terebinthinæ. P. sextantes, mel, absinthij cyathus. Ex quibus ad magnitudinem fabæ ægyptiæ & mæne, & canato dari debet.

k q

LIBER

Arteriaces compositio quomodo fiat.

Rteriace uero hoc modo fit: casia, iridis, cinnamomi, nardi,
a myrrhae, thuris, singulorum. P. .xx. I. croci. P. .xx. I. piperis gra-
na. .xx. ex passi tribus sextarijs decoquantur: donec mel-
lis crassitudo his fiat. Aut croci, myrrhae, thuris, singulorum. P. .xi.
coniunguntur in passi eundem modum, eodemq; modo decoquantur.
Aut eiusdem passi heminae tres usq; eo coquantur: donec extracta
inde gutta indurescat, & adjicitur trita casia. P. .xi.

De quinque generibus nozarum corporis, & primo de vulne-
ribus quae maxime per tela inferuntur. Cap. XXVI.

De vulneribus

Vm facultates medicamentorum proposuerim, genera in qui-
bus noxa corpori est: proponam. Ea quinque sunt. Cum quid
c extrinsecus laesit: ut in vulneribus. Cum quid intra se ipsum
corruptum est, ut in cancro. Cum quid immatum est, ut in uestica cal-
culus. Cum quid increuit, ut uena quae intumescens in varicem con-
uertitur. Cum quid deest, ut cum curata pars aliqua est. Ex his alia
sunt, in quibus plus medicamenta. Alia in quibus plus manus profi-
cit. Ergo dilatis his: quae praecipue scalpelli, et manu postulant: nunc
de his dicam, quae maxime medicamentis egent. Diuidam autem hanc
quoque curandi partem sicut priorem. Et ante dicam, de his quae in quili-
bet partem corporis incidunt. Tum de his, quae certas partes infestant.
Incipiam a vulneribus. In his autem ante omnia scire medicus debet: quae isa-
nabilia sunt: quae difficile curatione habeant: quae promptior est. Est. na-
prudens hominis: primum eum, qui seruari non potest, non attingere, nec
subire speciem eius ut occisi, quem fors ipsius peremit. Deinde ubi gra-
uis metus sine certa tamen desperatione est, indicare necessarij pericli-
tantis in difficili rem esse: ne si uicta ars malo fuerit, uel ignorasse,
uel sefellisse uideatur. Sed ut haec prudenti uiro conueniunt, sic rursum
histrionis est, parua rem attollere, quo plus praestitisse uideatur. Obliga-
riq; aequum est confessione propterea rei: quo curiosius etiam circumspiciat,
ne, quod per se exiguum est malum, maius curantis negligentia fiat.

Quae vulnera insanabilia sint.

Insanabilia

Insanabilia sunt, cui basis cerebri, cui cor, cui stomachus, cui
s iocineris portae, cui in prima medulla percussa est, cuique aut
pulmo medius, aut ieiunum, aut tenuius intestinum, aut uen-
trculus, aut renes vulnerati sunt: cui ne circa fauces grandes uenae, uel
arteriae praecise sunt.

Quæ vulnera difficilē curationem habeant.

¶ Ix autem ad sanitatē perueniunt: quibus ulla parte pulmo, aut iocineris crassum, aut membrana, quæ continet cerebrū, aut lienis, aut uulua, aut uescia, aut ullum intestinum, aut septum transversum vulneratū est. Hi quoq; in præcipiti sunt: in quibus usq; ad grandes intusq; conditas uenas in alis, uel poplitibus micro descendit. Periculosa etiam vulnera sunt, ubicunq; uenæ maiores sunt. quoniam exhaurire hominem profusione sanguinis possunt. Idq; euenit non in alis tantum, atq; poplitibus, sed etiam in his uenis, quæ ad anum, testiculosq; perueniunt. Præter hæc malum uulnus est, quodcunq; in alis uel foeminibus, uel inanibus locis, uel in articulis, uel inter digitos est. Item quodcunq; musculum, aut neruum, aut arteriam, aut membranam, aut os, aut cartilaginem læsit.

Quæ vulnera tutiorē curationem habeant.

¶ Utissimum omnium quod in carne est. Et hæc quidem loco uel peiora uel meliora sunt. modo uero periculū facit quodcunq; magnum est.

Observationes quedam et ætatis, et corporis, et uitæ, et temporis in uulneribus.

Liquid etiam in uulneris genere, figurāq; est. Nam peius est quod etiā collisum, quā quod tantū discissum est. adeo ut acuto quoq; quā retuso telo uulnerari commodius sit. Peius etiā uulnus est, ex quo aliquid excisum est: ex quo uel caro alia parte abscissa, alia dependet: pessima quæq; plaga in orbē est: tutissima quæ lineæ modo recta est. Quo deinde propius huic, illi uel figuræ uulnus est: eo uel deterius, uel tolerabilius est. Quin etiam confert aliquid et ætas, et corpus, et uitæ propositum, et anni tempus, quia facilius sanescit puer uel adolescens, quā senior: ualens quā infirmus: neq; nimis tenuis, neq; nimis plenus, quā si alterum ex his est. integri habitus, quā corrupti: exercitatus, quā iners: sobrius, et temperans, quā uino, ueneriq; deditus. Opportunissimumq; curationi tempus uernum est, aut certe: neq; feruens neq; frigidum, si quidem uulnera et nimis calor, et nimium frigus infestant: maxime tamen horū uarietas: ideoq; perniciosissimus autumnus est. Sed pleraq; ex uulneribus oculis subiecta sunt: quorundam ipsæ sedes indices sunt, quas alio loco demonstrauius, cum positus interiorum partiū ostendimus. Veruntamen quia quedam uicina sunt, interest quoq; uulnus in sum-

Aurelij Cor.

k ij

lra 102

45

ma parte sit, an penitus penetraverit: necessarium est notas subijcere, per quas quid intus actum sit, scire possimus: Et ex quibus, vel spes, vel desperatio oritur.

Signa percussi cordis.

Citur corde percusso, sanguis multus effertur: uenae languescunt: color pallidissimus: sudores frigidi, maliq; odoris: quam irrorato corpore oriuntur: extremisq; partibus frigidis matura mors sequitur.

Signa pulmonis icti.

Ulmone uero icto, spirandi difficultas est: sanguis ex ore spumas: ex plaga rubens: simulq; etiam spiritus cum sono fertur in uulnus inclinari inuat: quidam sine ratione consurgunt. Multi, si in ipsum uulnus inclinati sunt, loquuntur: si in aliam partem, obmutescunt.

Signa iocineris uulnerati.

Iocineris autem uulnerati notae sunt, multus sub dextra parte praecordiorum profusus sanguis: ad spinam redacta praecordia: in uentrem cubandi dulcedo: punctiones, doloresq; usq; ad iugulum, iunctumq; ei latus scapularum: os intentum. Quibus nonnunquam etiam biliosus uomitus accedit.

Signa percussorum renium.

Enibus uero percussis, dolor ad inguina, testiculosq; descendit: difficulter urina redditur: eaq; aut est cruenta, aut error fertur.

Signa uulnerati lienis.

Liene icto sanguis niger a sinistra parte prorumpit: praecordia cum uentriculo ab eadem parte indurescunt: sitis ingens oritur: dolor ad iugulum, sicut iocinere uulnerato uenit.

Signa percussae uulnae.

Cum uulna percussa est, dolor inguinibus, et coxis, et femoribus est. Sanguinis pars per uulnus, pars per naturale descendit: uomitus bilis insequitur. Quaedam obmutescunt: quaedam mente labuntur: quaedam sui compotes: nervorum, oculorumq; dolore urgeri se consentiunt: morietesq; tandem eade, quae corde uulnerato, patiuntur.

Signa percussi cerebri, uel membrane eius.

In cerebrum membranae eius uulnus accepit: sanguis per nares, quibusdam etiam per aures exit: fereq; bilis uomitus insequitur. Quorundam sensus obtunduntur: appellatiq; ignorant. Quorundam trux uultus est: quorundam oculi quasi resoluti huc, atq; illuc mouentur. fereq; tertio, uel quinto die delirium accedit. multorum etiam nervi distenduntur. Ante mortem autem pleriq; fascias, quibus caput deligatum est: lacerant: ac nudum uulnus frigori obijciunt.

Signa percussi stomachi.

Si stomachus autem percussus est: singultus, et bilis uomitus insequitur. Siquid cibi, uel potionis assumptum est, ea redditur cito. Venarum motus elanguescit: sudores tenues oriuntur: per quos extremae partes frigescent.

Signa ieiuni intestini, et uentriculi uulnerati, et aliorum intestinorum.

Communes uero ieiuni intestini, et uentriculi uulnerati notae sunt. Nam cibus, et potio per uulnus exeunt: praecordia indurescunt. nonnunquam bilis per os redditur. intestino tantum sedes inferior est. Caetera intestina icterum uel sterces, uel odorem eius exhibent.

Signa percussae medullae, quae in spina est.

Medulla uero quae in spina est discussa, nervi resoluuntur: aut distenduntur: sensus intercidit: interposito tempore aliquo sine uoluntate inferiores partes uel semen, uel urinam, uel etiam sterces excernunt.

Signa septi transversi percussi.

Si septum transversum percussum est, praecordia sursum contrahuntur: spina dolet: spiritus rarus est: sanguis spumans fertur.

Signa uesicae uulneratae.

Esica uero uulnerata dolent inguina. quod super pubem est: intenditur. pro urina sanguis, aut ex ipso uulnere urina descendit: stomachus afficitur. itaq; aut bilem uomunt: aut singultuant: frigus, et ex eo mors sequitur.

De sanguine, et sanie, et pure, et eorum speciebus quando ue meliora, deteriora ue sint.

Is cognitis etiam nunc quaedam alia noscenda sunt ad omnia uulnera, ulceraq; de quibus dicturi sumus: pertinentia. Ex his aut exit sanguis, sanies, pus. Sanguis omnibus notus est.

k iiij

Signa percussi cerebri

Signa percussi stomachi

Signa ieiuni intestini, et uentriculi uulnerati, et aliorum intestinorum

Signa percussae medullae

Signa septi transversi percussi

Signa uesicae uulneratae

Sanguis
Sanguis
pus

LIBER

Sanies est tenuior hoc, uarie crassa, & glutinosa, & colorata. Pus crassissimum, albidissimumq; glutinosius & sanguine, & sanie. Exit aut sanguis ex ulnere recenti, aut iam sanescente. Sanies est inter utruq; tempus. pus ex ulcere iam ad sanitatem spectante. Rursus & sanies, & pus quasdam species graecis nominibus distinctas habent. Est enim quaedam sanies quae uel ἰχθὺς, uel μελίμπος nominatur. Est pus quod ἐλαῶδες appellatur. ἰχθὺς tenuis, subalbidus ex malo ulcere exit: maximèq; ubi neruo laeso inflammatio secuta est. μελίμπος crassior, & glutinosior subalbida, mellisq; albo subsimilis fertur. Haec quoq; ex malis ulceribus ubi nerui circa articulos laesi sunt, & inter haec loca maximè ex genibus. ἐλαῶδες tenue subalbidum quasi unctum colore, atq; pinguitudine, oleo albo non dissimile apparet in magnis ulceribus sanescentibus. Malus autem est sanguis nimium aut tenuis, aut crassus, colore uel liuidus uel niger, aut pituita mixtus, aut uarius. Optimus calidus, rubens, modice crassus, non glutinosus. Itaq; protinus eius uulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit. Itemq; postea spes in his maior est, ex quibus melioris generis quaeq; proueniunt. Sanies igitur mala est multa, nimis tenuis, liuida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quae & ipsum ulcus & iunctam ei cutem erodit. Melior nō multa modice crassa, subrubicunda, aut subalbida. ἰχθὺς autem peior est multus, crassus, subliuidus, aut subpallidus, glutinosus ater, calidus, mali odoris. Tolerabilior est subalbidus, qui caetera omnia contraria prioribus habet. μελίμπος autem mala est multa, & percrassa: melior quae & tenuior, & minus copiosa est. Pus inter haec optimum est. Sed id quoq; peius est multum, tenue, dilutum, magisq; si ab initio tale est. Itemq; si colore sero simile, si pallidum, si liuidum, si feculentum est. Praeter haec si male olet, nisi tamen locus hunc odorem excitat. Melius est, quo minus est, quo crassus, quo albidus. Itemq; si leue est: si nihil olet: si aequale est. modo tamen conuenire & magnitudini uulneris, & tempori debet. Nam plus ex maiore, plus nondum solutis inflammationibus naturaliter fertur. ἐλαῶδες quoq; peius est multum, & parum pingue, quo minus etiam quoq; id ipsum pinguius, eo melius est.

Curatio aduersus profusionem sanguinis in uulneribus.

Vibis exploratis ubi aliquis ictus ē, qui seruari potest: protinus prospicienda duo sunt: ne sanguinis sit profusio: ne ue inflammatio interimat. Si profusionem timemus, quod ex se de uulneris, & magnitudine eius, & ex impetu ructis sanguinis in-

telligi potest, sicis linamentis vulnus implendum est: supraq; impo-
nenda spongia ex aqua frigida expressa: ac manu super comprimē-
da. Si parum sic sanguis conquiescat, sæpius linamenta mutanda sunt.
Et si sic parum ualent, aceto madefacienda sunt. id uehemens ad
sanguinem supprimendum est. Ideoq; quidam id uulneri infundunt.
Sed alius rursus metus subest: ne nimis ualenter ibi retenta materia
magnam inflammationem postea moueat. quæ res effiat. neq; roden-
tibus medicamentis, neq; adurentibus: & ob id ipsum inducentibus cru-
stam, sit utendum: quanuis plerq; ex his sanguinem supprimunt.
Sed si semel ad ea decurritur, potius quæ mitius idē efficiunt. Quod
si illa quoq; profusio uincuntur. uenæ, quæ sanguinem fundunt, ap-
prehendendæ: circq; id quod ictum est, duobus locis deligendæ, inter-
cidendæq; sunt, ut in se ipsæ coeant: et nihilominus ora præclusa ha-
beant. ubi ne id quidem res patitur: possunt ferro candenti aduri.
Sed etiam satis multo sanguine effuso ex eo loco, quo neq; neruus, neq;
musculus est, ut puta in fronte, uel superiore capitis parte. commodissi-
mum tamen est cucurbitulam admoheri à diuersa parte, ut illuc san-
guinis cursus reuocetur.

Curationes aduersus uulnorum inflammationem.

T aduersus profusionem quidem in his auxilium est. Ad-
uersus inflammationem autem in ipso sanguinis cursu ea ti-
meri possunt, ubi læsum ē uel os, uel neruus, uel cartilago, uel
musculus: aut ubi parum sanguinis pro modo uulneris fluxit. Ergo
quotiens quid tale erit, sanguinem mature supprimere non oportebit:
sed pati fluere dum tutum erit: adeo ut si parum fluxisse uidebitur:
mitti quoq; ex brachio debeat, utiq; si corpus iuuenile, & robustum,
& exercitatum est: multoq; magis si id uulnus ebrietas præcessit.
Quod si musculus læsus uidebitur, præcidendus erit. Nam percussus
mortiferus est: præcisus sanitatem recipit.

*Vulnus foris
parum fluxit.*

*Musculus latus quod
signum.*

De glutinatione uulnorum.

Sanguine autem uel suppresso, si nimis erumpit: uel ex-
hausto, si per se parum fluxit: longe optimum est, uulnus glutina-
ri. Potest autem id uel quod in cute uel etiam in carne est: si
nihil ei præterea mali accedit. Potest etiam alia parte dependens, alia
inherens: si tamen etiam nunc integra est, & coniunctione corporis fo-
uetur. In his uero quæ glutinantur duplex curatio est. Nam si pla-
ga in molli parte, sui debet: maximeq; si discissa auris ima est: uel
rimis nasus, uel frons, uel bucca, uel palpebra, uel labrum, uel circa

LIBER

Suturam
Fibulam.

guttur cutis, uel uenter. Si uero in carne uulnus est, hiatq; neq; in unius
orae facile attrahuntur: sutura quidem aliena est. Imponenda uero
fibulae sunt, ἀντρίπας γράει nominant: quae oras paulum tamen con-
trahunt: quo minus lata postea cicatrix sit. Ex his autem colligi po-
test, id quoq; quod alia parte dependens, alia inhaerebit: si alienatum
adhuc non est: suturam, an fibulam postulet. Ex quibus neutra an-
te debet imponi, quam intus uulnus purgatum est: ne quid ibi concre-
ti sanguinis relinquatur. Id enim & in pus uertitur: & inflamma-
tionem mouet: & glutinari uulnus prohibet. ne linamentum quide,
quod supprimendi sanguinis causa inditum est: inibi relinquendum
est. nam id quoq; inflammat. Comprahendi uero sutura, uel fibula
non cutem tantum, sed aliquid etiam ex carne: ubi suberit haec, opor-
tebit quo ualentius haereat, neq; cutem abrumpat. Vtraq; optima est
ex acia molli non nimis torta, quo mitius corpori insidat. Vtraque
neq; nimis rara, neq; nimis crebra incidenda est. Si nimis rara est, nō
continet: si nimis crebra est, uehementer affiat: quia quo saepius acis
corpus transit, quoq; plura loca iniectum uinculum mordet, eo maio-
res inflammationes oriuntur: magisq; aestate. neutra etiam uim ul-
lam desiderat. sed eatenus utilis est, qua cutis ducentem quasi sua
sponte subsequitur. Ferè tamen fibulae latius uulnus esse patiuntur.
Sutura oras iungit: quae ne ipsae quidem inter se contingere ex toto
debent: ut si quid intus humoris concreuerit, sit qua emanet. Si quod
uulnus neutrum horum recipit, id tamen purgari debet: deinde omni
uulneri primo imponenda est spongia ex aceto expressa. si sustinere
aliquis aceti uim non potest: uino utendum est. Lenis plagi uiuatur
etiam si ex aqua frigida expressa spongia imponitur. sed ea quo-
cunq; modo imposita est: dum madet, prodest, itaq; ut inarescat, non
est committendum. Licetq; sine peregrinis, & conquisitis, & compo-
sitis medicamentis uulnus curare. Sed si quis huic parum confidit, im-
ponere medicamentum debet: quod sine seuo compositum sit ex his,
quae cruentis uulneribus apta esse proposui. Maximèq; si caro est:
barbarum: si nerui, uel cartilago, uel aliquid ex eminentibus, quales
aures, uel labra sunt, Polybi sphragidem. Alexandrinum quoq; uiri-
de neruis idoneum est: eminentibusq; partibus ea, quam graeci πόλιν
ουα uocant. Solet etiam colliso corpore exigua parte findi cutis. quod
ubi incidit, non alienum est, scalpello latius aperire: nisi muscoli, ner-
uiq; iuxta sint: quos incidi non expedit. ubi satis deductum est, me-
dicamentum imponendum est. At si id quod collisum est, quantis pa-
rum diductum est: latius tamen aperiri propter neruos, aut musculos
non licet: adhibenda sunt ea, quae humorem leniter extrahant, pra-

Collisio

apudque ex his id quod *putres* vocari proposui. Non alienum est eti-
am ubi unq; *uulnus* graue est, *impositum*, quo id innetur, in super cir-
cundare *lanam* *fucidam* ex aceto, & oleo: uel *cataplasma*, si mollis
is locus est, quod leniter reprimat. Si *neruosus*, aut *musculosus*: quod
emolliat.

si locus mollis, siue
neruosus est, ubi
uulnus est, quid

Quomodo *uulnus* ligari conueniat.

A *fascia* uero ad *uulnus* deligandum *lintea* aptissima est: eaq;
f lata esse debet, ut semel *iniecta* non *uulnus* tantum, sed *par-*
tum utrinq; et *toris* eius comprehendat. Si ab altera par-
te caro magis recessit, ab ea melius attrahitur. Si aeq; ab utraq; *trā-*
uersa comprehendere oras debet: aut si id *uulneris* ratio non pati-
tur: *media* primum *inicienda* est, ut tum in utranq; partem ducatur.
sic autem deliganda est: ut & contineat, neq; astringat. quod non
contineatur, elabitur. quod nimis astrictum est, cancro periclitatur.
Hyeme saepius *fascia* circuire debet: aestate quotiens necesse est: tum ex-
trema pars eius inferioribus acu assuenda est. nam nodus *uulnus*
lædit: nisi tamen longe est. illo neminem decipi decet, ut propriam ui-
scerum curationem requirat: de quibus supra posui. Nam *plaga* ipsa
curanda extrinsecus uel *sutura*, uel alio *medicinae* genere est. In *visce-*
ribus nihil mouendum est: nisi aut si quid ex *iocinere*, aut *liene*, aut
pulmone duntaxat extremo dependeat: praedatur. alioquin *uul-*
nus interius ea uictus ratio, eaq; *medicamenta* sanabunt: quæ cuiq;
visceri conuenire superiore libro proposui.

quomodo *inicienda*
sit *fascia*.

Uul. uisceris

De ratione uictus, & notis *uulnerum*, curationibusq; eorum.

Is ita primo die ordinatis, homo in lecto collocandus est: usq;
h si graue *uulnus* est: abstinere quantum uires patiuntur ante
inflammationē a cibo debet. bibere donec sitim finiat aquā
calidam. uel si aestus est, neq; febris, neq; dolor est: et frigidam. adeo
tamen nihil perpetuum est. sed semper pro uiribus corporis aestiman-
dum ut imbecillitas etiam cibum protinus facere necessarium possit:
tenuem scilicet & exiguum, qui tantum sustineat. Multiq; etiam ex
profluuio sanguinis inter morientes ante ullam curationem uino re-
ficiendi sunt: quod alioquin inimicissimum *uulneri* est. nimis uero
intumescere *uulnus*, periculosum: nihil intumescere: periculosissimum
est. illud inditium est magnæ inflammationis: hoc emortui corpo-
ris. Protinusq; si mens homini consistit: si nulla febris accessit: scire li-
cet mature *uulnus* sanum fore. Ac ne febris quidem terrere debet,

Nel pportet

Uulnus uisceris

LIBER

si in magno vulnere, dum inflammatio est: permanet: illa pernicio-
sa est, quæ uel leui vulnere superuenit: uel ultra tempus inflammatio-
nis durat: uel delirium mouet: uel si neruorum rigor, aut distentio, quæ
ex vulnere orta est: eam non finit. Vomitus quoq; biliosus non uolun-
tarius, uel protinus ut percussus est aliquis, uel dum inflammatio ma-
niet, malum signum est, in his duntaxat, quorum uel nerui uel etiam
neruosi loci uulnerati sunt. Spõte tamen uomere non alienum est, præ-
cipue his, quibus in consuetudine fuit: sed neq; protinus post cibum, neq;
iam inflammatione orta: neq; cum in superioribus partibus plaga est.
Valerius 3 die & 4 Biduo sic vulnere habito, tertio die id aperiendum, detergendq; sa-
nies ex aqua frigida est: eademq; rursus iniicienda sunt. Quinto iam
die quanta inflammatio futura est, se ostendit. Quo die rursus detecto
vulnere considerandus color est. Quod si liuidus, aut pallidus, aut va-
rius, aut niger est: scire licet malum uulnus esse. idq; quandoq; ani-
ma duersum est terrere nos potest. album, aut rubicundum esse ulcus,
commodissimum est. Item cutis dura, crassa, dolens, periculũ ostendit.
bona signa sunt ubi hæc sine dolore tenuis & mollis est. Sed si gluti-
natur uulnus, aut leniter intumuit, eadem sunt imponenda, quæ pri-
mo fuerunt. Si grauis inflāmatio est, neq; glutinādi spes est, ea quæ pus
moueant: aquæ quoq; calidæ necessarius usus est, ut & materiam dige-
rat: & duritiā emolliat: & pus citet. Ea sic temperanda est, ut &
manu contingenti iocunda sit: usq; eo adhibenda, donec aliquid ex tu-
more minuisse, coloremq; ulceri magis naturalem reddidisse uideatur:
maximeq; si grande uulnus est, *τετραπλάσιον* maior: si in articulis, digitis,
locis cartilaginosis *πυκνῶδες*. Post id fomentum si lata plaga non pa-
tet: imponi protinus emplastrum debet: & si latius hiat, illud empla-
strum liquari ex irino unguento oportet: eoq; illita linamenta disponi
per plagam: deinde emplastrum supra dari, & super id succidam la-
nam: minusq; etiam, quam primo fasciæ astringendæ sunt.

Curationes propriæ articulorum.

Propriæ quedam in articulis uisenda sunt: in quibus si præ-
cipue nervi sunt, qui continebant: debilitas eius partis sequitur.
Si id dubium est: & ex acuto telo plaga est: ea transuersa
commodior est. Si reuulso & graui est, nullum in figura discrimen est.
At uisendum est pus supra articulum, an infra nascatur. Si sub eo na-
scatur: albumq; & crassum diu fertur: neruum præcisum esse credibi-
le est. Magis quoq; maiores dolores, inflammationesq; quo maturius
excitantur sunt. Quauis autem non abscissus neruus est: tamen si cir-
ca tumor durus diu permanet: necesse est & diuturnum ulcus esse:

Et sano quoque eo tumorem permanere futurumque est, ut turde mem-
brum id extendatur uel contrahatur. Maior tamen in extendendo
mora est, ubi recuruato articulo curatio adhibita est, quam in recur-
uando eo, quod rectum continuerimus. Coll. car. quoque membrum:
quod ictum est ratione certa debet. Si glutinandum est, ut superius
sit: si in inflammatione est: ut in neutram partem inclinatum sit. Si iam
pus profluit, ut deuexiu sit. Optimum etiam medicamentum quies
est: moueri et ambulare nisi sanis alienum est. Minus tamen his est
periculosum, qui in capite uel brachijs, quam qui inferioribus parti-
bus uulnerati sunt. Minimeque ambulatio conuenit: foemine, aut crure,
aut pede laborante. Locus in quo cubabit, tepidus esse debebit. Bal-
neum quoque, dum parum uulnus purum est: inter res infestissimas est.
Nam id et humidum et sordidum reddit: ex quibus ad cancerum
transitus esse consuevit. Levis frictio recte adhibetur, sed his parti-
bus, quae longius absunt à uulnere.

Vulnus quomodo purgandum est.

Inflammatione finita, uulnus purgandum est. Id optime fa-
ciunt tincta in melle linamenta, supraque id, emplastrum, uel
ἐν νεκρῶν δανδὸν dandum est. Tum demum uero purum ul-
cus est: cum rubet, ac nimium neque siccum neque humidum est, ac quod-
cumque sensu caret, quod non naturaliter sentit, quod nimium aut ari-
dum, aut humidum est. Quod aut pallidum, aut albidum, aut liui-
dum, aut nigrum est: id purum non est.

Quomodo uulnus implendum est.

Virgato, sequitur ut impleatur, iamque calida aqua catenus
necessaria est, ut sanies remoueatur. Lanae succida superua-
cuis usus est. Lota melius circumdatur. Ad implendum autem
uulnus proficiunt quidem etiam medicamenta aliqua. Itaque ea adhi-
beri non alienum est, ut butyrum cum rosa: exigua mellis parte, aut
cum eadem parte, aut cum eadem rosa τερασπῶν δανδὸν, aut ex rosa
linamenta. Plus tamen proficit balneum rarum. Cibi boni succi, uisitationis
omnibus acerbis, sed iam plenioribus. Nam et auis, et uenatio, et
suilla elixa dari potest. Vinum omnibus dum febris, dum inflama-
tio est, alienum est. Itemque usque ad cicatricem, si nerui, musculi uel uulne-
rati sunt, etiam si alte caro, aut si plaga in summa cute generis tutio-
ris est: potest non peruectus, modice tamen datum ad implendum quoque
proficere. Si quid molliendum est: quod in nervosis locis musculosisque
necessarium est: cerato quoque super uulnus utendum est. At si caro su-
percreuit, modice reprimat siatim linamentum, uehementius squama
eris. Si plus est quod tolli opus est: adhibenda sunt etiam uehementio-

LIBER

Epulid.

percreuit, modice reprimat sicum linamentum, uehementius squama
eris. Si plus est quod tolli opus est, adhibenda sunt etiamnum uehe-
mentiora, quæ corpus exedunt. Cicatricem post omnia hæc commode
inducit lycium ex passō, aut lacte dilutum, uel etiam per se imposi-
tum sicum linamentum.

De uulneribus: quæ extrinsecus per uulnera incidunt, curationibusq; eorū.

*h*ic ordo felix curationis est. sed quædam tamen periculosa in-
cidere consueverunt. Interdum enim uetus ulcus occupat, indu-
citq; ei callus, et circum oræ crassæ liuent, post quæ quicquid me-
dicamentorū ingeritur, parum proficit. quod fere negligenter curato
ulceri superuenit. Interdum uel ex nimia inflammatione, uel ob æstus
immodicos, uel ob nimia frigora, uel quia nimis uulnus ascriptū est,
uel quia corpus aut senile, aut mali habitus est cancer occupat. Id ge-
nus à græcis diductum in species est, nostris uocabulis non est. Om-
nis autem cancer non solum id corrumpit: quod occupauit, sed etiam
serpit: deinde alijs, alijsq; signis decernitur. Nam modo super inflam-
mationem rubor ulcus ambit. isq; cum dolore procedit. ἐπίπληξας
græci nominant. Modo ulcus nigrum est: quia caro eius corrupta est.
Idq; uehementius etiam putrescendo intenditur. Vbi uulnus humi-
dum est, et ex nigro ulcere humor pallidus fertur, maliq; odoris est,
caruncula corruptæ, interdum etiam nerui ac membranae resoluun-
tur, specillumq; demissum descendit, aut in latus, aut deorsum, eoq; uī-
tio nonnunq; os quoq; afficitur. modo oritur ea: quàm græci ῥάγδα
uul appellant. Priores in qualibet parte corporis fiunt. Hoc in pro-
minentibus membris idest inter ungues et alas, uel inguinia, fereq;
in senibus, uel his, quorū corpus mali habitus est. Caro in ulcere uel
nigra, uel liuida est: sed sicca et arida, proximaq; cutis plerunq;
sub nigris pusulis impletur, deinde ei proxima uel pallida, uel liui-
da, fereq; rugosa sine sensu est. Vltior in inflammatione est, omniaq;
ea simul serpunt, Vltus: in locum pusulosum. Pusula: in eum, qui pal-
let aut liuet. Pallor aut liuor: in id quod inflammatum est. Inflam-
matio: in id quod integrum est, transit. Inter hæc deinde febris acuta
oritur, ingensq; sitis. quibusdam etiam delirium accedit. alij quantumvis
mentis suæ cōpotes sunt, balbutiendo tamen uix sensus suos explicant.
Incipit affici stomachus. Fit fædi spiritus ipse odoris. Atq; initium
eius quidem mali recipit curationem. Vbi uero penitus insedit, insa-
nabile est. plurimiq; sub frigido sudore moriuntur.

De Uulneribus.

Curatio ulceris.

*a*pericula quidem uulnerum hæc sunt. Vetus autem ulcus
scarpello coniiciendum est, excidendaq; eius oræ, et quicq;

quid super eas liuet, æque inardendum. si uariola intus est: quæ his sanari prohibet, ea quoq; excidenda. Deinde ubi sanguis emissus, noua tumq; uulnus est, eadem curatio adhibenda: quæ in recentibus uulneribus exposita est. Si scalpello aliquis uti non uult: potest sanare id emplastrum: quod ex ladano fit, & cum ulcus sub eo exesum est: id, quo cicatrix inducitur.

Curatio erysipelatum.

D autem quod è puo πειλας uocari dixi: non solum uulneri se peruenire: sed sine hoc quoq; oriri consuevit: atq; interdum periculum maius affert: utiq; si circa ceruices aut caput constitit. Oportet si uires patiuntur sanguinem mittere: deinde imponere simul reprimentia & refrigerantia, maximeq; cerussam solani succo: aut amoliam cretam aqua pluuiali exceptam, aut ex eadem aqua subactam farinam cypresso adiecta, aut si tenerius corpus est: lenticulam. Quicquid impositum est: betæ folio contegendum est, & super linteolum frigida aqua madens imponendum. Si per se refrigerantia parum proderunt, miscenda erunt hoc modo. sulphuris. P. XI. cerussæ & croci, singulorum. P. XII. eaq; cum uino conterenda sunt, & id his illinendum: aut si durior locus est, solani folia contrita, suillæ adipi miscenda sunt, & illita linteolo super iniicienda. At si nigrities est: neq; dum serpit: imponenda sunt, quæ carnem putrem lenius exedat: repurgatumq; ulcus sic, ut cætera nutriendum est. Si magis putre est: iamq; proædit ac serpit: opus est uehementius erodentibus. Si ne hæc quidem euincunt, aduri locus debet, donec ex eo nullus humor feratur: nam quod sanum est: sicum est cum aduritur: post uestionem putris ulceris superponenda sunt, quæ crustas à uiuo resoluant, eas exæpæ græci uocant. ubi exciderunt, purgandum ulcus maxime melle et resina uest. sed alijs quoq; purgari potest: quibus purulenta curantur, eodemq; modo ad sanitatem perducendum est.

Curatio Gangrenæ.

Angrenam uero si nondum planè tenet, sed adhuc incipit: curare non difficillimum est, utiq; in corpore iuuenili, et magis etiam si muscoli integri sunt: si nerui uel læsi non sunt: uel leuiter affecti sunt: neq; ullus magnus articulus nudatus est: aut carnis in eo loco paulum est: ideoq; non multum, quod putresceret, fuit, consistitq; eo loco uitium quod maxime fieri in digito potest. In eiusmodi casu primum est, si uires patiuntur, sanguinem mittere. Deinde quicquid aridum est & intentione quadam proximū quoque locum male habet: usque eo sanum corpus concidere.

Uulnus uehens

o. ep. 2. u. 7. f. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Uulnus uehens

Uulnus uehens

LIBER

Medicamenta uero, dum malum serpit, adhibenda nulla sunt: quæ prius mouere consuerunt. ideoq; ne aqua quidem calida. Grauius quoque: quamuis reprimantia, aliena sunt. Sed his quam leuissimis opus est. Superq; ea, quæ inflamata sunt: utendum est refrigerantibus. Si nihilo magis malum constitit, ubi id quod est inter integrum ac uitiatum locum debet. Præcipueq; in hoc casu petendum non à medicamentis solum, sed etiam à uictus ratione præsidium est. Neq; enim id malum nisi corrupti uitiosi q; corporis est. Ergo primo, nisi imbecillitas prohibet, abstinentia utendum. Deinde danda quæ per cibum potionemq; aluum: ideoq; etiam corpus astringant, sed ea leuia. Postea si uitium constitit: imponi super uulnus eadem debent: quæ in putri ulcere præscripta sunt. Ac tum quoq; plenioribus cibis uti licebit ex media materia, sic tamen non nisi aluum corpusq; siccantibus. aqua uero pluuiali frigida. balneum nisi iam certa fiducia redditæ sanitatis est, alienum est, si quidem emollitum in eo uulnus cito rursus eodem malo afficitur. Solent uero nonnunq; nihil omnia auxilia proficere, ac nihilo minus serpere his cancer. Inter quæ miserum sed unicum auxilium est, ut cætera pars corporis tuta sit, membrum quod paulatim emoritur, abscidere. Hæ grauissimorum uulnerum curationes sunt. Sed ne illa quidem negligenda, ubi integra cute interior pars collisa est, aut ubi dera sum, ac tritum ue aliquid est, aut ubi surculus corpori infixus est, aut ubi tenue, sed altum uulnus insedit. In primo casu commodissimum est malicorium ex uino coquere, interioremq; eius partem conterere, et cerato miscere ex rosa facto, idq; supponere. deinde ubi cutis ipsa exasperata est, inducere lenè medicamentum. quale *αἰσπὰ* est. Dera so uero detrictoq; imponendum est emplastrum *τετραπύρρον*, minus endusq; cibus, et uinum subtrahendum. Neq; id: quia non habebit altiores ictus, contemnendum erit. Si quidem ex eiusmodi casibus sæpe canceri fiunt. Quod si leuius id erit, et in parte exigua, contenti esse poterimus eodem leni medicamento. Surculum uero, si fieri potest, oportet uel manu, uel etiam ferramento eijcere. Si uel præfractus est, uel altius descendit: quàm ut ita fieri possit, medicamento euocandus est. Optime autem educit super imposita arundinis radix, si tenera est, protinus contrita, si iam durior, ante in mulso decocta. Cui semper mel adijciendum est, aut aristolochia cum eodè melle. Pessima ex surculis arundo est, quia aspera est. Eademq; offensa etiam in filicis hæstula est. Sed usu cognitum est utraq; aduersus alteram medicamentum esse, si contrita super imposita est. Facit autem idem in omnibus surculis quodcumq; medicamentum extrahendum habet. Idem altis tenuibusq; uulneribus aptissimum est. Priori rei Philocratis: huic He-

catei

cicci emplastrum maxime conuenit.

Quo modo cicatrix uulneri inducenda, purgandaq; sit.

Bi uero in quolibet uulnere uentum ad inducendum cicatricem est: quod per purgatis iam repletisq; ulceribus necessarium est: primum ex aqua frigida linamentum, dum cito aliter, deinde cum iam continenda est: sicut imponendum est, donec cicatrix inducatur. Tum deligari super album plumbum oportet: quo & reprimatur cicatrix, et colorem maxime sano corpori similem accipit. Idem radix siluestris cucumeris prestat. Idem compositio, quæ habet elaterij. P. XI. humæ argenti. P. XII. unguenti pond. XIII. Quæ exapiuntur resina terebinthina: donec emplastri crassitudo ex omnibus fiat. Ac nigras quoq; cicatrices leniter purgât paribus portionibus mixta, ærugo, plumbum elotum, eademq; rosa cotta, siue ungitur cicatrix: quod in facie fieri potest: siue id ut emplastrum imponitur: quod in alijs partibus commodius est. At si uel excreuit cicatrix, uel concussa est, stultum est decoris causa rursus & dolore, & medicinam sustinere. Alioqui res utriq; succurri patitur: Si quidem utraq; cicatrix exulcerari scalpello potest. si medicamentum aliquis nungit: idem efficiunt compositiones hæ: quæ corpus exedunt. Cui exulcerata, super eminentem carnem exedentia medicamenta coniicienda sunt. Super concussam, implentia: donec utrunq; ulcus sanæ cuti æquetur, & tum cicatrix inducatur.

De uulneribus quæ per morsus inferuntur, eorumq; curationibus. Caput XXVII.

Idi de his uulneribus, quæ maxime per tela inferuntur. Sequitur ut de his dicam, quæ morfu fiunt, interdum hominis, interdum simiæ, sepe canis, nonnunquam ferorum animalium, aut serpentium. Omnis autem ferè morsus habet quoddam uirus. Itaq; si uehemens uulnus est: cucurbitula admonenda est. Si leuius: protinus emplastrum iniiciendum, præcipueq; Diogenis. si id non est, quodlibet ex his, quæ aduersus morsus proposui. si ea non sunt. uiride alexandrinum. si ne id quidem est, quodlibet non pingue ex his quæ recentibus uulneribus acomodantur. Sal quoque his, præcipueq; ei, quod canis fecit, medicamentum est: si manus uulneri imminuitur, superq; id duobus digitis uerberatur (Exsaniet enim) ac salsa mentum quoq; recte super id uulnus deligatur.

Aurelij Cor.

*Uulnera ab
cicatricibus accipitur*

fol. 69. fol. 70.

Tiq; autem si rabiosus canis fuit, cucurbitula uirus eius ex-
 trahendum est. deinde si locus neq; neruosus, neq; musculo-
 sus est, uulnus id adurendum est. si uri non potest, sanguine
 homini mitti non alienum est. tum uiso quidem uulnere super im-
 ponenda, quæ cæteris usis sunt. ei uero quod expertum ignem nō est,
 ea medicamenta, quæ uehementer exedunt. post quæ nullo nouo ma-
 gisterio, sed iam supra posito, ulcus erit implendum: & ad sanitatem
 perduendum. Quidam post rabiosi canis morsum protinus in bal-
 neum mittunt: ibiq; patiuntur desudare, dum uires corporis sinunt
 ulcere adaperto: quo magis ex eo quoq; uirus desillet. deinde multo
 meroaq; uino excipiunt. quod omnibus uenenis contrarium est. idq;
 cum ita per triduum factum est, tutus esse homo à periculo uidetur.
 Solet autem ex eo uulnere, ubi parum occisum est, aquæ timor nasci.
 ὕδρῳ φόβος græci appellant. Miserrimum genus morbi. in quo simul
 æger & sitis, & aquæ metu cruciatur. quo oppressis in angusto spes
 est. Sed unicum tamen remedium est: nec opinantem in piscinam non
 ante ei prouisam proicere. Et si natandi scientiam non habet modo,
 mersum bibere pati, modo attollere. Si habet, interdum deprimere, ut
 inuitus quoq; aqua satietur. sic enim simul & sitis, & aquæ metus
 tollitur. Sed aliud periculum excipit: ne infirmum corpus in aqua fri-
 gida uexatum, neruorum distentio absumat. Id ne incidat, à piscina
 protinus in oleum calidum demittendus est. Antidotum autem præci-
 pue id quod primo loco posui. ubi id non est, aliud si nondum æger
 aquam horret, potui ex aqua dandum est: & si amaritudine offen-
 ditur: mel adijciendum est. Et si iam is morbus occupauit: per catapo-
 tia sumi potest.

Curationes communes aduersus omnes morsus serpentium.

Serpentium quoq; morsus non nimium distantem curatio-
 nem desiderant: quantum in ea multum antiqui uariarunt,
 ut in singula genera anguim singula medendi genera præ-
 ciperent: atq; alijs alia. sed in omnibus eadem maxime proficiunt.
 Igitur in primis super uulnus id membrum deligandum est: non ta-
 men nimium uehementer, ne torpeat. Dein uenenum extrahendū est.
 id cucurbitula optime facit. Neq; alienū est ante scalpello circa ul-
 nus incidere: quo plus uitiati iam sanguinis extrahatur. Si cucurbi-
 tula non est: quod tamen uix incidere potest: tum quodlibet simile uas
 quod idem possit. si ne id quidem est, homo adhibendus est, qui ul-
 nus exsugāt.

mus exsugāt. Neq; hercules scientiam præcipuam habent hi qui psilli nominantur: sed audaciam usu ipso confirmatam. Nam uenenum serpentis, ut quædam etiā uenatoria uenena, quibus galli præcipue utuntur: non gustu, sed in uulnere nocent. Ideoq; colubra ipsa tuto estur: ictus eius occidit. Et si stupente ea, quod per quædam medicamenta circulatores faciunt: in os digitum quis indidit: neq; percussus est: nulla in ea salua noxa est. Ergo quisquis exemplum psilli secutus id uulnus exsuxerit, et ipse tutus erit: et tutum hominem præstabit. Illud ne intereat, ante debet attendere: ne quod in ginguis, palato ue, alia ue parte oris ulcus habeat. Post hæc is homo loco callido collocandus est sic, ut id, quod percussus erit, in inferiorem partem inclinetur. Si neq; qui exsugāt: neq; cucurbitula est: sorbere oportet ius anserinum, uel ouillum, uel uitulinum, et uomere. Vinum autem gallicum pullum per medium diuidere: et protinus calidum super uulnus imponere sic, ut pars interior corpori iungatur. Facit id etiā hædus, agnus ue discissus, et calida eius caro statim super uulnus imposita. emplastra quoq; quæ supra comprehensa sunt. Aptissimumq; est uel ephesium, uel id quod ei subiectum est. præsensq; in aliquo antidoto præsidium est. Sin id non est: necessarium est exsorbere potionem meri uini cum pipere, uel quidlibet aliud, quo calor mouendus est: ne humore intus coire patiatur. Nam maxima pars uenenum frigore interimit. Omnia etiam urinam mouentia, quia materiam extenuant: utilia sunt.

Speciales curationes aduersus ictus serpentium,
et primo aduersus ictum Aspidis.

Aec aduersus oēs ictus cōmunia sunt. Vnus tamen ipse docuit, eum, quæ aspis percussit: acetum potius bibere debere.

Quod demonstrasse dicitur casus cuiusdam pueri: qui cum ab hac ictus esset: et partim ob ipsum uulnus, partim ob immodicos æstus siti premeretur: ac locis siccis alium humorem nō reperiret: acetum, quod forte secum habebat, ebibit: et liberatus est. Credo qm id, quantum refrigerandi uim habet, tamen habet etiā dissipandi. Quo fit ut terra resperisa eo, spūct. Eadem ergo uerisimile est, spūscen-
tem quoq; intus humorem hominis ab eo discuti: et sic dari sanitatē.

Aduersus ictum scorpionis.

N quibusdam etiam alijs serpentibus certa quædā auxilia satis nota sunt. Nam scorpio sibi ipse pulcherrimū medicamentum est. Quidam contritum cum uino bibunt: quidam eodē modo contritum super uulnus imponunt: quidā super prunā

Lethus scorpionis

LIBER

eo imposito vulnus suffumigant undiq; ueste circumdata, ne is fumus dilabatur: tum carbonem eius, super vulnus deligant. Bibere autem oportet herbæ solaris, quam ἡλιοφύτων græci vocant: semen, uel certe folia ex uino. Super vulnus uero etiam fursures ex aceto, uel ruta siluatica recte imponitur, uel cum melle sal tostus. Cognoui tamen medicos, qui ab scorpione ictis nihil aliud, quam ex brachio sanguinem miserunt.

Aduersus aranei & scorpionis ictum.

e T ad scorpionis autem & ad aranei ictum allium cum ruta recte miscetur, ex oleoq; contritum super imponitur.

Aduersus Ceraſtis, & Dipsæ, & Hemorrhoidis ictum.

a T si Ceraſtes, aut Dipsas, aut Hemorrhoids percussit: catapotium, quod ægyptiæ fabæ magnitudinem æquet, arefactum in duas potiones diuidendū est sic, ut ei rutæ paulum adijciatur. Trifolium quoq; & mentaſtrum, & cum aceto panaces æque proficiunt. Coſtumq; & caſia, et cinnamomū recte per potionem assimuntur.

Aduersus Cherſydri ictum & ceraſtis.

a Duerſus Cherſydri uero ictum, panacis, aut laſer, quod sit scrupulorum. IIIS. XI. uel porri succus cum hemina uini sumendus est, et edenda multa satyria. Imponendum autē super vulnus sterus caprinum ex aceto coctum, aut ex eodem hordeacea farina, aut ruta, uel nepetæ cum sale contrita melle adiecto. Quod in eo quoq; uulnere, quod ceraſtes fecit, æq; ualet.

Aduersus Phalangij ictum.

u Bi uero phalangium nocuit, præter eam curationem, qua manu redditur, sepe homo demittendus in solium est, dandusq; ei myrrhæ & uivæ taminie par modus ex passi hermina: uel radiculae semen, aut lolij radix ex uino, & super vulnus fursures ex aceto coctæ: imperandumq; ut is conquiescat.

Aduersus ictus italorū anguiū, qui minus terribiles peregrinis sunt.

u Erum hæc genera serpentium & peregrina, & aliquanto magis pestifera sunt, maximeq; æstuosis locis gignuntur. Italia, frigidioresq; regiones hac quoq; parte salubritatem habent, quod minus terribiles angues edunt. Aduersus quos satis proficit

herba betonica, uel cantabrica, uel centaurion, uel agrimonia, uel trixago, uel personina, uel marinae pastinacae singulae, binae uel ritae et cum uino potui datae: et super uulnus impositae. Illud ignorari non oportet, ois serpentis ictum et ieiuni, et ieiuno magis nocere. Ideoque pernitiosissimae sunt, cum incubant. Vtilissimumque est, ubi ex anguibz metus est, non ante progredi, quam quid aliquis assumpsit.

Remedium generale aduersus omnia uenena, uel cibo,
uel in potione assumpta.

Non tam facile his opitulari est, qui uenenum, uel in cibo, uel in potione sumpserunt. Primum, quia non protinus sentiunt, ut ab angue icti, ita ne succurrere quidem statim sibi possunt. Deinde, quia noxa non à cute, sed ab interioribus partibus incipit. Commodissimum est tamen ubi primum sensit aliquis, protinus oleo multo epoto uomere. Deinde, ubi praecordia exhausta, bilere antidotum. si id non est, uel merum uinum.

Specialia remedia aduersus quaedam uenena, et primo
aduersus cantharidas.

¶ Vnt tamen quaedam remedia propria aduersus quaedam uenena, maximeque leuiora. Nam si cantharidas aliquis ebibit: pance cū lacte cōtusa, uel galbano, uino adiecto dari, uel lac p se debet.

Aduersus cicutam.

¶ I cicuta: uinum merum calidum cum ruta quamplurimum ingerendum est: deinde is uomere cogendus. posteaque laser ex uino dandum. isque, si febre uacat: in calidum balneum mittendus. Si non uacat: unguendus ex calefactentibus est. post quae quies ei necessaria est.

Aduersus hyoscyamum.

¶ I hyoscyamum: feruens mulsū bibendum est: aut quodlibet lac, maxime tamen asinum.

Aduersus cerussam.

¶ I cerussam: ius maluae, uel ius glandis ex uino contritae maxime profunt.

Aduersus sanguisugam si epota est: et lac quod intus coit.

¶ I sanguisuga epota est, acetum cum sale bibendum est. si lac intus coit, aut passum, aut coagulum, aut cum aceto laser.

Aurelij Cor.

l iij

LIBER

Aduersus fungos inutiles.

I fungos inutiles quis assumpserit, radícula aut epotâ, aut cum sale & aceto edenda est. Ipsi uero hi & specie quidem discerni possunt ab utilibus, & cocturae genere idonei fieri. Nam siue ex oleo inferuerunt, siue piri furculus cum his inferunt, omni noxa uacant.

De adustis corporis locis, & quomodo curari debeant.

Dustis quoque locis extrinsecus uis infertur. Itaque sequi uidetur, ut de his dicam. Hæc autem optime curantur folijs, aut lilij, aut linguae cæuinæ, aut betæ in uetere uino, oleoque decoctis. Quorum quidlibet protinus impositum ad sanitatem perducit. Sed diuidi quoque curatio potest in ea, quæ mediocriter exedentia reprimunturque: primo & pustulas prohibeant, & summam pelliculâ exasperent. Deinde ea quæ lenia ad sanitatem perducant. Ex prioribus est lenticulæ cum melle farina, uel myrrha, uel uino: creta cimo- lia cum thuris cortice contrita & aqua coacta, atque ubi usus necessitas incidit: aceto diluta. Ex insequentibus quælibet arapâ. Sed idonea maxime est, quæ uel plumbi recrementum, uel uitellos habet. Est etiâ illa adustorum curatio, dum inflammatio est: impositam habere cum melle lenticulam. Vbi ea declinauit, farina cum ruta, uel porro, uel marrubio, donec crustæ cadant. Tum eruâ cum melle, aut irim, aut resinam terebinthinam, donec ulcus purum sit. Notissime siccum lina- mentum.

De interioribus ulceribus, quæ aliqua corporum parte corrupta nascuntur. Cap. XXVIII.

De carbunculo, & eius curatione.

In his quæ extrinsecus incidunt ad ea ueniendum est, quæ interioribus corrupta aliqua corporum parte nascuntur. Ex quibus non aliud carbunculo peius. eius hæc notæ sunt. Rubor est: superque eum non nimium pustulæ eminent: maxime nigrae: interdum subliuidæ, aut pallidæ. In his sanies esse uidetur: infra color niger est. Ipsum corpus aridum & durius quam naturaliter oportet. Circa quem quasi crusta est: eaque inflammatione cingitur: neque in eo loco leuari cutis potest: sed inferiori carni quasi affixa est. Somnus urget: nonnunquam horror, aut febris oritur: aut utrumque. Idque uitium subter actis quasi quibusdam radicibus serpit: interdum celerius, interdum tardius: supra quoque procedens inalbescit: dein liuidum fit, circumque exiguae pustulæ oriuntur. Et si circa stomachum, faucesue

*His fungis confuso
linum, pum, & alijs
cuiusque pum, & alijs
est: & nunc*

incidit, subito spiritum saepe elidit. Nihil melius est, quam protinus adurere. Neq; id graue est (nam non sentit: quoniam ea caro mortua est) sinusq; adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est. Tum deinde vulnus, sicut cetera adusta, curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus crusta undiq; à uina carne diducta, quæ trahit secum quicquid corruptum erat: purusq; iam sinus curari potest implentibus. At si in summa cute uitium est: possunt succurrere quædam uel exedentia tantum, uel etiam adurentia. Vis pro magnitudine adhibenda est. Quodcumq; uero medicamentum positum est: si satis proficiet, protinus à uina corruptam partem resoluit. Certaqs; esse fiducia potest ferè, ut undiq; uitiosa caro excedat: qua huiusce rei medicamen exest. Si id non fit, medicamentum malo uincitur, utiq; ad uisionem properandum est: sed in eiusmodi casu abstinendum à cibo, à uino est. Aquam liberaliter bibere expedit: magisq; ea seruanda sunt, si febricula quoq; accessit.

De carcinomate, & eius curatione.

On idem periculum carcinoma affert, nisi imprudentia carantis agitata est. Id uitium fit maxime in superioribus partibus, circa faciem, nares, aures, labra, manimas foeminarum. Et iecore autè, aut plene hoc nascitur. Circa locum, aliqua quasi puncta sentiuntur: isq; immobilis, inæqualis tumor: interdum etiam torpet. Circa eum inflata uenæ quasi recuruantur: hæq; pallent, aut liuent: nonnunquam etiam in quibusdam delitescent. Tactusq; is locus alijs dolorem affert, in alijs cum non habet. Et nonnunquam si ne ulcere durior aut mollior est, quam esse naturaliter debet: nonnunquam hisdem omnibus ulcus accedit. Interdumq; nullam habet proprietatem, interdum simile his est, quæ uocantur græci *κονδυλώματα*: aspredine quadam & magnitudine sua. Colorq; eius ruber est, aut lenticule similis neq; tuto fertur. Nam protinus aut resolutio neruorum, aut dissentio insequitur. Sæpe homo ictus oluitur, atque eius anima deficit. Quibusdam etiam si id ipsum pressum est, quæ circa sunt: intenduntur & intumescunt. Ob quæ pessimum id genus est: ferèq; primum id fit quod *καυόνες* à græcis nominatur. Deinde ex eo id carcinoma quod sine ulcere est. Deinde ulcus ex eo thymum. Tolli nihil nisi *καυόνες* potest: reliqua curationibus irritantur. Et quo maior uis adhibita est, eo magis quidam uisi sunt medicamentis adurentibus. Quidam ferro adusserunt: quidam scalpello exciderunt. Neque ulli unquam medicina proficit: sed adusta protinus conata sunt & increuerunt, donec caderent. Exasa etiam post indu-

*hæc sunt lenticule
apparentes in facie
sicut uelut aspredine
sunt op.*

Libus
etiam cicatricem tamen reuenterunt: et causam mortis attulerunt. Cū interim plerique nullam vim adhibēdo, qua tollere id malum tentent: sed imponendo tantum lenia medicamenta, quæ quasi blandiatur: quo minus ad ultimam senectutem perueniant, non prohibentur. discernere autem non vides quod curationē recipit à carcinomate, quod non recipit: nemo scire potest. sed tempore, et experimento. Ergo ubi primum id vitium notatum est: imponi debēt medicamenta adurentia. si leuatur malum, minuunturq; eius inditia, procedere curatio potest et ad scalpellum, et ad usionem. Si protinus irritatum est, scire licet iam carcinoma esse: remouendaq; sunt omnia acria, omnia uehemētia. Sed si sine ulcere is locus durus est: imponi ficum quā pinguis simam, aut putōdis emplastrum satis est. Si ulcus æquale est, ceratū ex rosa iniiciendum est: adiiciendusq; ei puluis ex contrita testa: ex qua faber ferrarius tingere candens ferrum solitus est. si id nimium supercreuit: tentanda squama æris est: quæ lenissima ex adurentibus est: eatenus nequid eminere patiatur: sed ita, si nihil exacerbauit. sin minus, eodem cerato contenti esse debemus.

De Theriomate, et eius curatione.

*Ergo malum est uti filum
hinc sed a pro milia
Cicuta ad hunc est
Cicuta prole*
Et etiam ulcus, quod θηρίωμα greci uocant. Id et per se nascitur: et interdum ulceri ex alia causa facto superuenit: color est uel liuidus, uel niger: odor foedus, multus, et mucosus similis humor. Ipsum ulcus neq; tactum, neq; medicamentum sentit: prurigne tantum mouetur. at circa, dolor est, et inflammatio. Interdū etiam febris oritur. Nonnunquam ex ulcere sanguis erumpit. ad id quoq; malum serpit. quæ omnia sepe intenduntur. Fitq; ex his ulcus, quod ἐρυσσὴ ἐστὶν ueror greci uocant: quia celeriter serpendo, penetrandoq; usq; ossa, corpus uorat. id ulcus inæquale est, cæno simile: inestq; multus humor glutinosus: odor intollerabilis, maiorq; q̄ pro modo ulceris inflammatio. Vtrunq; sicut omnis cancer, fit maxime in senibus: uel his, quorum corpora mali habitus sunt. Curatio utriusq; eadem est: sed in maiore malo magis necessaria. Ac primum à victus ratione ordinandus est: ut quiescat in lectulo: ut primis diebus à cibo abstineat: aquā quā plurimam assumat. alius quoq; ei ducatur. dein post inflammationē cibum boni succi capiat: uitatis omnibus acribus, potionis quantum uolet sic, ut interdū quidem aqua contentus sit. in cœna etiam uini austeri aliquid bibat. non æque tamen fame in his, quos ἐρυσσὴ urgebit: atq; his qui θηρίωμα adhuc habebūt, utendum erit. et victus quidem talis necessarius est. super ulcus uero

inpergenda arida aloë oenanthe est: & si parum proficiat, chalcitis. Ac si quis nervus exesa carne nudatus est: contegendus ante linteolo est: ne sub eo medicamento aduratur. Si ualidioribus etiam num remedijs opus est: ad eas compositiones ueniendum est, quæ uehementius adurunt. Quicquid autem inpergitur, auerso specillo infundi debet. Super danda cum melle sunt uel linamenta, uel oleæ folia ex uino decocta, uel marrubium: eaq; linteolo contegenda in aqua frigida madefacto, dein bene expresso. Circaq; qua tumor ex inflammatione est, imponenda quæ reprimant cataplasmata. si sub his nihil proficiatur: ferro locus aduri debet: diligenter nervus, si qui apparent: ante ostentis. Adustum uel medicamentis, uel ferro corpus primum purgandū, deinde implendū esse: apparere cuilibet ex prioribus potest.

De sacro igne, & eius curatione.

Supra f. 80.

Acer quoq; ignis malis ulceribus annumerari debet. eius due species sunt. Alterum est subrubicundum, aut mixtum rubore, atq; pallore: exasperatumq; p pustulas continuas, quarum nulla, altera maior est, sed plurimæ perexiguæ. In his semper ferè pus, & sepe rubor cum calore est: serpitq; id nonnunquam sanescente eo, quod primum uitiatum est: nonnunquam etiam exulcerato: ubi ruptis pustulis ulcus continuatur: humorq; exit: qui esse inter sanem, et pus uideri potest. Fit maxime in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, præcipueq; in plantis. Alterum autem est in summæ cutis exulceratione, sed sine altitudine, latum, subliuidum, inæqualiter tamen, mediumq; sanescit extremis procedentibus: ac sæpe id quod iam sanum uidebitur, iterum exulceratur. At circa proximam cutis, quæ uitium receptura est: tumidior, & durior est: colorumq; habet ex rubro subnigrum. Atq; hoc quoq; malo ferè corpora seniora tentantur: aut quæ mali habitus sunt, sed in cruribus maxime. Omnis autem sacer ignis ut minimum periculum habet ex his quæ serpunt: sic propè difficillime tollitur. Medicamentum eius fortuitum est: uno die febris, quæ humorem noxium absumat. Cuius quo crassius, & albidius est: eo periculi minus est. Prodest etiam infra os ulcerum ladi: quo plus puris exeat, & id, quod ibi corruptum corpus est: extrahat. sed tamen si febricula accessit, abstinentia, lectulo, alui ductione opus est. In omni uero sacro igni neq; lenibus, et glutinosiis cibis, neq; salis, & acris utendum est: sed his quæ inter utrumq; sunt: qualis est panis sine fermento, piscis, hedus, aues, exceptoq; apro omnis ferè uenatio. Si non est febricula, & gestatio utilis

LIBER

est, & ambulatio, & uinum austerū & balneum. Atq; in hoc quoq;
genere potio magis liberalis esse, quā cibis debet. Ipsa autem ulce-
ra si mediocriter serpunt: aqua calida. Si uehementius, uino calido fo-
uenda sunt. Deinde acū pusula quæcūq; sunt aperiendæ. Tum im-
ponenda ea: quæ putrem carnem exedunt. Vbi inflammatio sublata,
ulcusq; purgatum est: imponi leue medicamentum debet. In altero
autem genere possunt proficere mala cotonea in uino acta atq; con-
erita. Potest emplastrum uel Hieræ, uel *τηροσφάριον*, cui quinta
pars thuris adiecta sit. Potest nigra hederæ ex uino austero acta.
Ac si celeriter malum serpit: non aliud magis proficit. Purgato ulce-
re: quod in summa cute esse proposui: satis ad sanitatem eadem lenia
medicamenta proficiunt.

De Chironeo ulcere, & eius curatione.

c Hironæum autem ulcus appellatur, quod & magnum est, et
habet oras duas, collosas, tumentes. Exit sanies non multa, sed
tenuis. Odor malus neq; in ulcere, neq; in eius humore est.
Nulla inflammatio, dolor modicus est. nihil serpit: ideoq; nullum pe-
riculum affert, sed non facile sanescit. Interdum tenuis cicatrix indu-
citur: deinde iterum rumpitur: ulcusq; renouatur. Fit maxime in pe-
dibus & cruribus. Super id imponi debet, quod & lene aliquid, &
uehemens, & reprimens habeat. Quale eius rei causa sit ex his.
Squamæ æris: plumbi eloti combusti, singulorum. P. *ϞIIII*. Cadmiæ, æ-
ris: singulorum. P. *ϞVIII*. rosæ quantum satis est ad ceram simul cum
eis molliendam.

De ulceribus quæ ex frigore in pedibus & manibus ori-
untur, & eorum curationibus.

f Iunt etiam ex frigore hiberno ulcera: maxime in pueris, et
præcipue pedibus, digitisq; eorum, nonnunq; etiam in mani-
bus. Rubor cum inflammatione mediocri est. Interdum pu-
sula oriuntur, deinde exulceratio. Dolor autem modicus. Prurigo ma-
ior est: nonnunquam humor exit: sed non multus, qui referre uel pus,
uel saniem uidetur. In primis multa calida aqua fouendum est: in
qua rapa deacta, aut si ea non sunt: aliquæ uerbenæ ex reprimen-
tibus. Si nondum ad apertum ulcus: æs, q̄ maxime calidum quis pati
potest, ad mouendum est. Si iam exulceratio est: imponi debet alumen
æqua portione cum thure contritum, cum uino adiecto: aut malicori-
um in aqua coctum, deinde contritum. Si summa detracta pellicula
est: hic quoq; melius lenia medicamenta proficiunt.

De struma, & eius curatione.

Struma quoque est tumor, in quo subter concreta quedam ex pure & sanguine quasi glandulae oriuntur. Quae uel praecipue fatigare medicos solent: quoniam & febres mouent, nec unquam facile maturescunt, et siue ferro, siue medicamentis curantur. Plerumque iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt, multoque post medicamento est opus. Quibus id quoque accedit: quod longo spatio detinent. Nascentur maxime in ceruice, sed etiam in alis, & inguinibus, & in lateribus. In mammis quoque foeminarum se repperisse chirurgicus Meges auctor est. Propter haec et album ueratrum recte datur: atque etiam sepius, donec ea digerantur. Et medicamenta imponuntur: quae humorem, uel educant, uel dissipent: quorum supra mentio facta est. Adurentibus quoque quidam utuntur: quae exedunt: crustaque eum locum astringunt: tunc uero ut ulcus curant. Quaecumque autem ratio curandi est: corpus puro ulcere exercendum atque alendum est: donec ad cicatricem perueniat. Quae cum medici doceant, quorundam rusticorum experimento cognitum: quem struma male habet, eum: si anguem edit: liberari.

De furunculo, & eius curatione.

Furunculus uero est tuberculum acutum cum inflatione & dolore, maximeque ubi iam in pus uertit. Qui ubi adaper tus est: & exit, super apparet pars carnis in pus uersa: pars corrupta subalbida, subrubra: quem uentriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum periculum est, etiam si nulla curatio adhibeatur. Maturescit enim per se atque erumpit. Sed dolor efficit, ut potior medicina sit, quae maturius liberet. Proprium eius medicamentum galbanum est: sed alia quoque supra comprehensa sunt. Si cetera desunt: imponi debent primum non pingue emplastrum, ut id reprimat: deinde si non repressit: quodlibet puri mouendo accommodatum. Si ne id quidem est, uel resina, uel fermentum. Expresso pure nulla ultra curatio necessaria est.

De phymate, & eius curatione.

Phyma uero nominatur tuberculum furunculo simile: sed rotundius & planius: saepe etiam maius. Nam furunculus oui dimidii magnitudinem raro explet, nunquam excedit. Phyma etiam latius patere consuevit: sed inflammatio, dolorque sub eo minores sunt. Vbi euulsus est pus: eodem modo apparet uentriculus:

Glandula indurata

id est de lobis albi

Anguis.

Phyma furunculo assimilatur.

*Carnis corrupta
in pus uerit;*

quod in furunculo non inuenitur. Verum omnis corrupta caro in pus uertitur. Id autem in pueris et sepius nascitur, et facilius tollitur: in iuuenibus rarius oritur, et difficilius curatur. Vbi aetas indurauit, ne nascatur quidem. Quibus uero medicamentis discenteretur, supra propositum est.

De phygelo, et eius curatione.

Phygelus quid

locus

signum

signa

Cura

*Signa crudi
tumoris*

¶ Vterque autem est tumor non altus, latus, in quo quiddam pusulae simile est. Dolor, distentioque uehemens est: et maior quam pro magnitudine tumoris: interdum etiam febricitans: idque tarde maturescit, neque magnopere in pus conuertitur. Fit maxime aut in uertice, aut in alis, aut inguinibus. Panem ad similitudinem figurae nostri uocant, atque id ipsum quo medicamento tolleretur, supra demonstraui. Sed cum omnes hi nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen trahit latius uitium ad suppurationem spectans. Idque fere fit aut post febres, aut post dolores partis alicuius: maximusque eos, qui uentrem infestauerunt. Sepiusque oculis expositum est. Siquidem latius aliquid intumescit ad similitudinem eius, quod phyma uocari proposui: rubetque cum calore, et paulopost etiam cum duritia, magisque innocenter indolescit: et sitim, uigiliamque exprimit. Interdum tamen nihil horum in cute deprehendi potest: maximeque ubi altius pus mouetur. Sed cum sitim, uigiliamque sentiuntur intus aliquae punctiones, et quod desubito durius non est, melius est: et quamuis non rubet: coloris tamen aliter mutatus est. quae signa iam pure oriente nascuntur. Tumor, ruborque multo ante incipiunt. Sed si locus mollis est, auertendus is materiae aditus est per cataplasmata, quae simul et reprimunt, et refrigerant: qualia et alias et pauloante in erysipela proposui. Si iam durior est, ad ea ueniendum est, quae digerant, et resoluant: qualis est ficus arida contusa, aut fex mixta cum cerato, quod ex adipe suilla coactum sit: aut cucumeris radix, cui ex farina duae partes adiectae sint, ante ex mulso decoctae. Licet etiam miscere aequis portionibus ammoniacum, galbanum, prope olim, uiscum: podusque adijcere myrrhae dimidio minus, quam in prioribus singulis erit. Atque emplastra quoque et malagmata idem efficiunt: quae supra explicui. Quod per haec discussum non est, necesse est maturescat: idque quocelerius fiat, imponenda est farina hordeacea, ex aqua cocta recte miscetur. Eadem autem haec in minoribus quoque abscessibus, quorum nomina, proprietatesque supra reddidi, recte fiunt. eademque omnium curatio. tantum modo distat. Crudum est autem, in quo magis quasi uenarum motus est, et grauitas, et ardor, et distentio, et dolor, et rubor, et durities. Et si maior abscessus est, horror,

aut etiam febricula permanet, Penitusq; condita suppuratio. Si pro his, quæ alibi cutis ostendit, punctiones sunt, ubi ista se remiserunt, iamq; is locus prurit, & aut sublividus, aut subalbidus est: matura suppuratio est: eaq; ubi uel per ipsa medicamenta, uel etiã ferro aperta est: pus debet emitti. Tum si qua in alis uel inguinibus sunt: sine linamento nutrienda sunt. In cæteris quoq; partibus, si una plaga exigua est, si mediocris suppuratio fuit, si non alte penetravit, si febris non est, si ualet corpus, æq; linamenta supernacua sunt. In reliquis parce tamen: nec, nisi plagi est, imponi debent. Commode uero uel super linamenta, uel sine his imponitur lenticula ex melle, aut malicarium ex uino coctum. Quæ & per se, & mixta idonea sunt. Si qua circa duriora sunt, ad ea mollienda, uel malua contrita: uel fœnigræci lini uel semen ex passo coctum super dandum est. Quicquid deinde impositum est, non astringi sed modice deligari debet. Illo neminẽ decipi decet, ut in hoc genere cerato utatur. Cætera quæ pertinent ad purgandum ulcus, ad implendum, ad cicatricem inducendam: conueniunt, quæ in uulneribus exposita sunt.

signa iã facti humoris.

Curatio. 7.

De fistulis & earum generibus, & curationibus.

Numquam autem ex eiusmodi abscessibus, & ex alijs ulcerum generibus fistula oriuntur. Id nomen est ulceri alto: angusto: collo. Fit in omni ferè parte corporis: habetq; quedam in singulis locis propria: prius de communibus dicam. Genera igitur fistularum plura sunt. siquidem aliæ breues sunt: aliæ altius penetrant, aliæ rectæ intus feruntur, aliæ multoq; plures transuersæ, aliæ simplices sunt, aliæ duplices, triplices uel ab uno ore intus orisse: quæ tres fiunt, aut etiam in plures sinus diuiduntur: aliæ rectæ: aliæ flexæ, & tortuosæ sunt. Aliæ intra carnem desinunt. Aliæ ad ossa: aut cartilaginem penetrant, aut ubi neutrum horum subest: ad interiora perueniunt. Aliæ deinde faciles, aliæ cum difficultate curantur. Atq; etiam quedam insanabiles reperiuntur. Expedita curatio est in fistula simplici, recenti, intra carnem, adiuuatq; ipsum corpus si iuuenile: si firmum est. Inimica, contraria his sunt. Itemq; si fistula os uel cartilaginem, uel neruum, uel musculos læsit: si articulum occupauit: si uel ad uescicam, uel ad pulmone, uel ad uulnam, uel ad grandes uenas, arterias uel ad inania, ut guttur, stomachum, thoracem penetrauit. Ad intestina quoq; eam tendere semper periculosum, sæpe pestiferum est. Quibus multum mali accedit: si corpus uel ægrum, uel senile, uel mali habitus est. Ante omnia autem demitti specillum in fi-

fistula quæ?

Cum expediat
fistula qualis.

LIBER

fistulam conuenit: ut quo tendat & quam alte perueniat, scire possi-
mus. Simul etiam protinus humida, an siccior sit. quod extracto spe-
cillo patet. Si uero os in uicino est, id quod disci potest: si iam nec ne
eo fistula penetravit, quatenus noxerit. Nam si molle est, quod ulti-
mo specillo contingitur: intra carnem adhuc uitium est. Si magis id
renititur, ad os uentum est. ibi deinde si labitur specillum, nondum
caries est. si non labitur, sed aequali immititur: caries quidem, uerum
adhuc leuis est. Si inaequale quoque et asperum subest: uehementius os
exesum est. At cartilago ubi subhaesit, ipsa sedes docet: percutuntque
esse ad eam ex renixu patet. Sed ex his quidem colliguntur fistula-
rum sedes, spatia, noxae. Simples uero haec sint, an in plures partes
diducantur: cognosci potest ex modo puris: cuius si plus fertur, quam
quod simplicia spatia conuenit: plures sinus esse manifestum est. Cumque
ferè iuxta sint, caro, & nervus, & aliqua nervosa: quales ferè tunicae,
membranaeque sunt: genus quoque puris docebit, num plures sinus intus
diuersa corporis genera perroserint. si quidem ex carne pus leue, al-
bum, copiosius fertur. At ex nervoso loco: coloris quidem eiusdem,
sed tenuius, & minus. Ex nervo, pingue & oleo non dissimile. Denique
etiam corporis inclinatio docet, num in plures partes fistulae pene-
trarint: quia saepe cum quis aliter decubuit: aliterque membrum collo-
cauit: pus ferri, quod iam desierat, iterum incipit: testaturque non solum
aliu sinum esse ex quo descendat: sed etiam in aliam corporis partem
eum tendere. Sed si & in carne & recens, & simplex est: ac neque
rugosa, neque ana sede, neque in articulo, sed in eo membro, quod per se
immobile, non nisi cum toto corpore mouetur: satis proficiet empla-
strum, quod recentibus uulneribus imponitur: dum habeat uel sale,
uel alumen, uel squamam aeris, uel aeruginem, uel ex metallicis aliquid.
exque eo collirium fieri debet altera parte tenuius, altera paulo ple-
nius. Idque ea parte qua tenuius est: altera antecedente demitti oportet
in fistulam, donec sanguis purus se ostendat. quae in omnibus fistula-
rum collirijs perpetua sunt. Idem deinde emplastrum in linteolo su-
perimponendum: supraque iniicienda spogria est in acetum ante demissa.
soluique quinto die satis est. genusque uictus adhibendum est: quo car-
nem ali docui. Ac si longius a praecordiis fistula est: ex internallo icui-
num radículas edisse: deinde uomere necessarium est. uetustate callo-
sa sit fistula. Callus autem neminem fallit, quia durus est: & aut al-
bus, aut pallidus. sed tum ualidioribus medicamentis opus est. Qua-
le est, quod habet papaueris lacrymae. P. XI. gummi. P. XIII. cadmia
P. XIII. atramenti sutorij. P. XVIII. Ex quibus aqua coactis colliri-
um fit. aut in quo sunt gille. P. XI. aeruginis, sandaracae, aluminis

Callus

egyptij, singulorum. P. XI. atramenti sutorij combusti. P. XII. aut quod constat ex chalcitide, & saxo calcis quibus auripigmenti dimidio minus, quam in singulis prioribus est: adiicitur. eaq; melle cocto excipiuntur. Expeditissimum autem est ex præcepto Megetis, æruginis rasæ. P. XII. conterere: deinde ammoniaci, thymiamatis. P. XII. aceto liquare: eoq; infuso ex ærugine colligere. idq; ex primis medicamentis est. Sed ut hæc maxime effectus sunt: sic qui ista non adsunt, facile tamen est callum quibuslibet adurentibus medicamentis prodere: aut quibus hæc maxime in effectum sunt, erodere. Satiusq; est uel papyri intortum, uel aliquid ex penicillo in modum collirij astrictum eo illinere. ~~folia~~ quocq; cocta, & mixta cum calce callum exest. si quando uero longior & transversa fistula est: demisso specillo contra principium huius incidi commodissimum est: & collirium utrumq; demitti. At si duplicem esse fistulam, aut multiplicem existimamus, sic tamen ut brevis, intraq; carne sit: collirio uti non debemus: quod unam partem curet: reliquas omittat. sed eadem medicamenta arida in calamentum scriptorium coniicienda sunt: isq; ori fistulæ aptandus: inspirandumq; ut ea medicamenta intus compellantur. aut eadem ex uino liquanda. vel si sordidior fistula est, ex mulso: si callosior, ex aceto sunt: atq; intus infundendum quicquid inditum est. superponenda sunt quæ refrigerent, & reprimant. nam ferè quæ circa fistulam sunt, habent aliquid inflammationis. Neq; alienum est ubi quis resoluuerit, anteq; rursus alia medicamenta coniiciat: per oricularium clysterem fistulæ eluere. si plus puris fertur, uino. si callus durior est, aceto. si iam purgatur, mulso, uel aqua, in qua eruum coctum sit sic, ut huic quoq; mellis paulum adiiciatur. Ferè uero fit, ut ea tunica quæ inter ferrumentum, & integram carnem est, uicta medicamentis tota exeat: infraq; ulcus purum sit. quod ubi contigit, imponenda glutinantis sunt: præcipueq; spongia melle cocto illita. Neq; ignoro multis placuisse linamentum in modum collirij compositum, tinctum melle demitti. sed celerius id glutinatur, quam impletur. Neq; uerèdum est ne purum corpus puro corpori iunctum, non coeat: adiectis quoq; medicamentis ad id efficiatibus: cum sæpe exulceratio digitorum, nisi magna cura prospeximus: sanescendo in unum eos iungat.

De melicera.

St etiam ulceris genus: quod à faui similitudine *μειλινον* à græcis nominatur: idq; duas species habet. Alterum subalbidum ficiunculo simile, sed maius, et cum dolore maiore. quod ubi maturescit, hæt foramina, p quæ fertur humor glutinosus, et

*Umi
aceto
Mulso
uino
Ald.*

LIBER

purulentus. Nec tamen ad iustam maturitatem peruenit. Si diuisum est, multo plus intus corrupti, quam in furunculo apparet, altiusq; descendit. Raro fit nisi in scapulis. Alterum est minus super corpus emicans, durum, latum subuiride, subpallidum, magis exulceratum. Si quidem ad singulorum pilorum radices foramina sunt: per quæ fertur humor glutinosus subpallidus: crassitudinem mellis aut visci referens: interdum olei. Si inciditur, uiridis intra cæro apparet. Dolor autem & inflammatio ingens est, adeo ut acutum quocq; febre mouere consuerit. Super id quod minus crebris foraminibus exasperatum est: recte imponitur & ficus arida, & lini semen quod in uino coctum: & emplastra, ac malagmata materiam eductentia: aut quæ proprie huc pertinentia supra posui. Super alterum, & ea medicamenta & farina ex mulso cocta sic, ut ei dimidium resinæ terebinthinæ miscatur, & ficus in mulso decocta, cui paulum hyssopi contriti sit adiectum, & unæ taminicæ pars quarta fico adiecta. Quod si parum in utrolibet genere medicamenta proficiunt: totum ulcus usq; ad sanam carnem excidi oportet, & ulcere ablato super plagam medicamenta danda sunt: primum quæ pus citent: deinde quæ purgent: tum quæ impleant.

De acrochordone & Thymio, & Myrmecio, & Clauo,
curationibusq; eorum.

- 1 S Vnt quædam uero uerrucis similia: quorum diuersa nomina ut uicia sunt: ἀποχόρδωρα græci uocant ubi sub cute coit aliquid durius, & interdum paulo asperius coloris eiusdem: infra tenuis: ad cutem latius: idq; modicum est: quia raro fabæ magnitudinem excedit. Vix unum tantum eodem tempore nascitur: sed ferè plura, maximèq; in pueris, eaq; nonnunquam subito desinunt, nonnunquam mediocrem inflammationem excitant. Sunt quæ etiam in pus conuertuntur. At thymion nominatur, quod super corpus quasi uerrucula eminet, ad cutem tenuis: supra latius, subdurum, & in summo perasperum. Idq; summum colorem floris thymi representat. Vnde ei nomen est. Ibiq; facile finditur & eryentatur, nonnunquam aliquantum sanguinis fundit: ferèq; circa magnitudinem fabæ ægyptiæ est: raro maius: interdum per exiguum: modo unum, modo autem plura nascuntur, uel in talis, uel palmis, uel inferioribus pedum partibus. Pessima tamè in obscœnis sunt: maximèq; ibi sanguinem fundunt. Myrmecia autem uocantur, humiliora thymio durioraq; quæ radices altius exigunt, maioremq; dolorem mouent: infra lata: super autem tenuia: minus sanguinis mittunt: magnitudine uix unquam lupini modum
- 2
- 3

4
 pini modum excedunt. Nascentur ea quoq; aut in palmis, aut in inferioribus partibus pedum. Clauus autem nonnunquam quidem etiā alibi: sed in pedibus tamen maxime nascitur: præcipue tamen ex contuso: quanuis interdum aliter, doloremq; etiam, si non aliās: tamen ingredienti mouet. ex his acrochordon: siue thymium sæpe etiam per se finiuntur: & quo minora sunt: eò magis Myrmecia & clauī sine curatione uix unquam desinunt. Acrochordon, si excisa est nullam radiculam relinquit, ideoq; ne renascitur quidem. Thymio, clauoq; excisis subter rotunda radícula nascitur: quæ penitus descendit ad carnem, eaq; relicta idem rursus exigit. Myrmecia latissimis radicibus inheret: ideoq; ne excidi quidem sine exulceratione magna possunt. Clauum subinde deradere commodissimum est. Nam sine ulla ui sic emollescit: ac si sanguinis quoq; aliquid emissum est: sæpe emoritur. Tollitur etiam, si quis eum circum purgat, deinde imponit resinam, cui miscuit pulueris paulum: quem ex lapide molari contrito fecit. Cætera uero genera medicamentis adurenda sunt. Alijsq; id qđ ex fecē uini, myrmecijs id quod ex alumine, & sandaracā fit: aptissimum. Sed ea: quæ circa sunt: folijs contegi debent: ne ipsa quoq; exulcerentur. Deinde postea lenticula imponi solet. Tollit thymium etiam ficus in aqua cocta.

De pustularum generibus, & earum curationibus.

T pustulæ maxime uernis temporibus oriuntur: earum
 a plura genera sunt. Nam modo circa totum corpus, partem
 ue aspredo quædam fit similis his pustulis: quæ ex urtica,
 uel ex sudore nascuntur. & ξαρόν ματη græci uocant: eaq; modo rubet:
 modo colorem cæcis non excedunt. Nonnunquam plures similes uariis
 oriuntur, nonnunquam maiores pustulæ linidæ, aut pallidæ, aut
 nigrae, aut aliter naturali colore mutato: subestq; his humor. Vbi hæ
 ruptæ sunt, infra quasi exulcerata caro apparet φλυκταῖναι græce
 nominatur. fiunt uel ex frigore, uel ex igni, uel ex medicamentis. Psē
 diacion autem paulo durior, pustula est subalbida: acuta ex qua ipsa
 quod exprimitur, humidum est. Ex pustulis uero nonnunq; etiā ulcera
 scula sunt, aut aridiora, aut humidiora, & modo tantum cum pruriguine,
 modo etiam cum inflammatione aut dolore, Exitq; aut pus, aut
 sanies, aut utrūq;. Maximeq; id euenit in ætate puerili, raro in medio
 corpore: sæpe in eminentibus partibus. pessima pustula est: quæ ἐπι-
 ρυρῆτις uocatur. Ea colore uel sublinida, uel subnigra, uel alba esse con-
 suevit. Circa hanc autem uehemens inflāmatiō est, et cum ad aperta

Aurelij Cor.

m

LIBER

est: reperitur intus exulceratio mucosa. Color est humori suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem eius est. Neque enim ea, faba maior est. Atque hæc quoque oritur in eminentibus partibus: et ferè noctu. Unde nomen quoque à græcis ei ἐπιπρωτὶς impositum est. In omni uero pustularum curatione primum est, multum ambulare atque exerceri. si quid ista prohibet, gestari. Secundum est, cibum minuire: abstinere ab omnibus acerbis et extenuantibus: eademque nutrices facere oportet: si lactens puer ita affectus est. Præter hæc: is, qui iam robustus est: si pustulæ mirusæ sunt: desudare in balneo debet, simulque super eas nitrum inspergere: oleoque uinum miscere: et sic ungi. Tum descendere in solium. si nihil sic proficitur, aut si maius pustularum genus occupauit: imponenda lenticula est: detractaque summa pellicula: ad medicamenta lenia transeundum. ἐπιπρωτὶς post lenticulam recte herba quoque sanguinali, uel uiridi coriandro curatur. Ulcera ex pustulis facta tollit spuma argenti cum semine fæni græci mixta sic, ut his inuicem rosa atque intubi suauis adijciatur: donec mellis crassitudo fiat. Proprie ad eas pustulas: quæ infantes male habent: lapidis: quem πυρίτην uocant P. XVIII. cum quinquaginta amaris nucibus miscetur, adijciunturque olei cyathi tres. Sed prius ungi ex cerussa pustulæ debent: tum hoc illini.

De scabie, et eius curatione.

Scabies uero est humor cutis rubicundus: ex qua pustulæ oriuntur: quædam humidiores, quædam sicciores. Exit ex quibusdam sanies, fitque ex his continue exulceratio pruriens. serpitque in quibusdam cito. Atque in alijs quidem ex toto desinit: in alijs uero certo tempore anni reuertitur. Quo asperior est, quoque prurit magis, eo difficilius tollitur. Itaque eam: quæ talis est, ἀσπίς, idest scabie græci appellant. In hac quoque uictus ratio eadem: quæ supra necessaria est. Medicamentum autem ad incipientem hanc idoneum est: quod fit ex spodio, croci, æruginis, singulorum P. XI. piperis albi: omphacij: singulorum P. XI. cadmeæ P. XV. III. Aut ubi iam exulceratio est: id quod fit ex sulphuris. P. XI. ceræ P. XII. III. picis liquidæ hemina: olei sextarij duobus. Quæ simul incoquantur, dum crassitudo mellis fiat. Est etiam quod ad Protarchum authorem refertur. Habet hoc farina lupinorum sextarium: nitri cyathos quattuor: picis liquidæ heminam: resinæ humidæ selibram: aceti cyathos tres. Crocum quoque licium, ærugo, myrrha, cinis æquis portionibus recte miscentur, et ex passo coquantur. Idque omnem pituitam ubique sustinet. At si nihil aliud

est, amittat ad tertiam partē decocta, uel sulphur picē liquida mixtū
sicut in pectoribus proposui: hominibus quoq; scabie laborantibus opi-
tulantur.

vel sulphur
in aqua

De impetiginis speciebus & curationibus.

Impetiginis uero species sunt quattuor. Minime mala est,
quæ similitudine scabiem representat. Nam & rubet &
durior est, & exulcerata est & roditur. Distat autem ab ea
quia magis exulcerata est, & uariis similes pustulas habet, uideturq;
esse in ea quasi bullulæ quædam ex quibus interposito tempore squa-
mulæ resoluntur: certioribusq; hoc temporibus reuertitur. Alterum
genus peius est simile papulæ ferè: sed asperius, rubicundiusq;: figu-
ras uarias habens. Squamulæ ex summa cute discedunt: roseo maior
est: celerius & latius procedit: certioribusq; etiam nonnunquam pri-
or temporibus & fit et desinit: rubrica cognominatur. Tertia etiam
num deterior est. Nam & crassior est, & durior, et magis tumet: in
summa cute finditur: & uehementius rodit. Ipsa quoq; squamosa, sed
nigra procedit: & late & tarde eminus serpit. In temporibus, aut
oritur, aut desinit, neq; ex toto tollitur: nigra cognomen est. Quartum
genus est, quod curationem omnino non recipit: distans colore. Nam
subalbidum est & recenti cicatrici simile, squamulasq; habet palli-
das, quasdam subalidas, quasdam lenticulæ similes. quibus demptis
nonnunquam profluit sanguis. Alioquin uero humor eius albidus est,
cutis dura atq; fissæ est, proceditq; latus. Hæc uero omnia maximo
genera oriuntur in pedibus et manibus, atq; ungues quoq; infestant.
Medicamentum non aliud ualentius est, quam quod ad scabiem quoq;
pertinere sub authore. Protarcho retuli. Serapion autem nitri. P. XII.
sulphuris. P. XIII. exapiebat resina copiosa, eaq; utebatur.

Serapion.

De papulis, & earum curatione.

Papularum uero duo genera sunt. Altera est, in qua per mi-
nimas pustulas cutis exasperatur & rubet, leniterq; rodi-
tur: medium habet pauxillo lenius: tarde serpit, idq; uitiū
maxime rotundum incipit, eademq; ratione in orbem procedit. Alte-
ra autem est, quam ἀπὸ πύλων, græci appellant. In qua similiter qui-
dem, sed magis cutis exasperatur, exulceraturq; ac uehementius
& roditur & rubet: interdum etiam pilos remittit. Quæ minus
rotunda est: difficilius sanescit: nisi sublata est, in impetiginē uertitur:

m ij

LIBER

sed leuis papula, etiam si ieiuna salina quotidie defricatur: sanescit. Maior commodissime murali herba tollitur, si sub ea detrita est. Vt uero ad composita medicamenta ueniamus, idem illud Protarchi tanto ualentius in his est, quanto minus in his uitij est: alterum ad idem Myronis: nitri rubri, thuris, singulorum. P. XI. cantharidum purgatum. P. XII. sulphuris ignem non experti tantundem, resinae terebinthinae liquidae. P. XXX. farinae lolij sext. iij: gith ciathos tres: pias cyndae sext.

De uitilignis speciebus, idest de Alpho et Mela, et leuce, et earum curatione.

Uitiligo quoque, quamuis per se nullum periculum affert: tamen foeda est, et ex malo corporis habitu fit. Eius tres species sunt. alphas uocatur, ubi color albus est fere subasper et non continuus, ut quaedam quasi guttae dispersae esse uideantur. interdum etiam latius, et cum quibusdam intermissionibus serpit. melas colore ab hoc differt: quia niger est, et umbræ similis. cetera eadem sunt. alium habet quiddam simile alphi, sed magis albida est, et altius descendit, in eaque albi pili sunt, et lanugini similes. Omnia haec serpunt. sed in alijs celerius, in alijs tardius. Alphas et Melas in quibusdam uarijs temporibus et oriuntur, et desinunt. Leuce quæ occupauit: non facile dimittit. Priora curationem non difficillimam recipiunt: ultimum uix unquam sanescit: ac si quid ei uitio demptum est: tamen non ex toto sanus color redditur. Vtrum autem aliquod horum sanabile sit, an non sit, experimento facili colligitur. Incidi enim cutis debet, aut acu pungi. Si sanguis exit: quod fere fit in duobus prioribus, remedio locus est. Si humor albidus, sanari non potest. Itaque ab hoc quidem abstinendum est. Super id uero: quod curationem recipit, imponenda lenticula mixta cum sulphure et thure sic, ut ea contrita ex aceto sit. Aliud ad idem: quod ad Hireneum auihorē refertur. Alcyonium, nitrum, cuminum, fici folia arida paribus portionibus contunduntur adiecto aceto. His in sole uitiligo perungitur: deinde non ita multo post: ne nimis erodatur: eluitur. Proprie quidem Myrone auihore eos: quos alphas uocari dixi, hoc medicamento perungunt. sulphuris. P. p. Z. aluminis scissilis. P. p. Z. nitri. P. XIII. myrti radice contrita acetabulum miscent: deinde in balneo super uitilignem inspergunt farinā ex faba: tum haec inducunt. Hi uero, quos melanas uocari dixi: curantur: cum simul contrita sunt alcyonium, thus, hordeum, faba sine oleo, in balneo ante sudorē insperguntur: tum genus id uitilignis defricatur.

De vitijs singularum corporis partium. Cap. I.

De capillis fluentibus.

¶ Ixi de his vitijs, quæ per totum corpus oriens-
tia: medicamentorum auxilia desiderât. nunc
ad ea veniam, quæ non nisi in singulis parti-
bus incidere consuerunt orsus à capite. In hoc
igitur capillis fluentibus maxime quidem sæ-
pe radêdo succurritur. adiicit enim vim quæ-
dam ad continendum ladanum cum oleo mē-
xtum. nunc de his capillis loquor, qui post morbum ferè flunt. nā
quo minus caput quibusdā ætate nudetur, succurri nullo modo potest.

Aurel. Cor.

De porrigne & eius curatione. Cap. II.

¶ Orrigo autem est ubi inter pilos quedam quasi squamulæ
surgunt, eæq; à cute resolvuntur, & interdū madent: mul-
to sæpius siccæ sunt. Idq; euenit modo sine ulcere, modo ex-
ulcerato loco: huic quoq; modo malo odore, modo nullo accidente: ferèq;
id in capillo fit, rarius in barba: aliquando etiam in supercilio. ac
neq; sine aliquo corporis vitio nascitur, neq; ex toto inutile est. nam
bene integro capite non exit. Vbi aliquid in eo vitium est, non incom-
modum est, summam cutem potius subinde corrumpi: quàm id quod
nocet in aliam partem magis necessariam uerti. Commodius est ergo
subinde pectendo repurgare: quàm id ex toto prohibere. si tamen ea
res nimium offendit: quod humore sequente fieri potest, magisq; si id
etiam mali odoris est, caput sæpe radendum est, dein id super adiu-
uandum aliquibus ex leuiter reprimentibus: quale est nitrum cum ace-
to, uel ladanum cum myrteo uino, uel myrobalanum cum uino. Si pa-
rum per hæc proficitur uehementioribus uti licet, cum eo, ut sciamus
utiq; in recenti vitio id inutile esse.

De sycofi & eius curatione. Cap. III.

¶ St etiam ulcus, quod à fici similitudine σύκοις à græcis no-
minatur. caro excrescit: & id quidem generale est. sub eo
uero duæ species sunt. alterum ulcus durum & rotundum
est, laterum humidum & inæquale. ex duro exiguum quiddam &

Aurelij Cor.

m iij

LIBER

glutinosum exit: ex humido plus, & mali odoris. Fit uero utrunq;
in his partibus, quæ pilis conteguntur: sed id quidem, quod callosum
& rotundum est, maxime in barba. Id uero quod humidum, præci-
pue est in capillo. Super utrunq; oportet imponere elaterium, aut li-
ni semen contritum & aqua coactum, aut ficum in aqua decoctum,
aut emplastrum terrapharmacum ex aceto subactum: terra quoq;
erithrea ex aceto liquata recte illinitur.

De Arcis & earum curationibus. Cap. IIII.

Rearum quoq; duo genera sunt. commune utriq; est: quod
emortua summa pellicula, pili primum extenuantur: dein
de excidunt: ac si ictus is locus est, sanguis exit liquidus et
mali odoris, increscitq; utrunq; in alijs celeriter, in alijs tarde. Peius
est quod densam cutem & subpinguem, & ex toto glabram fecit: sed
ea quæ ἀλωπεία nominatur: sub qualibet figura dilatatur, fit et in
capillo & in barba. Id uero quod à serpentis similitudine ὀφρύων
appellatur: incipit ab occipito: duorum digitorum latitudinem non
exceedit: ad aures duobus capitibus serpit: quibusdam etiam ad fron-
tem: donec se duo capita in priorem partem committant. Illud uitiū
in qualibet ætate est: hoc ferè in infantibus. Illud uix unquam sine
curatione: hoc per se sæpe finitur. quidam hæc genera arcarū sal-
pello exasperant. quidam illinunt adurētia ex oleo, maximq; char-
tam combustam. quidam resinam terebinthinam cum taspia indu-
cunt. sed nihil melius est, quàm nouacula quotidie radere: qua cum
paulatim summa pellicula excisa est, adaperiuntur pilorū radiculæ.
neq; ante oportet desistere, quàm frequentem pilū nasci apparuerit.
Id autem, quod subinde raditur: illini atramento scriptorio satis est.

De Varis, et Lenticulis, & Ephelide, & eorū curationibnt. Cap. V.

enè ineptiæ sunt: curare Varos, et Lenticulas, & Ephelidas.
sed eripi tamen foeminis cura cultus sui non potest. Ex his
autem quas supra proposui, uari, lenticulæq; uulgo notæ
sunt: quamuis rarior ea species est, quàm ἑνίων graci uocant: cum sit
ea lenticula rubicundior et inæqualior. ἰφνίδις uero à plerisq; igno-
ratur: quæ nihil est: nisi asperitas quædam & durities mali coloris.
cætera non nisi in facie, Lenticulæ etiam in alia parte nonnunquam
nasci solent. de qua per se scribere alio loco uisum operæ præcium
non est. sed Vari commodissime tolluntur imposita resina, qui nō mī

nus quàm ipsa est: aluminis, scissilis, & paulum mellis adiectum est. Lenticulam tollunt galbanum et nitrum, cum pares portiones habet, contritaq; ex aceto sunt: donec ad mellis crassitudinem uenerint. His corpus illinendum, & interpositis pluribus horis mane eluendū est: oleoq; leuiter ungendum. Ephedren telli resina, cui tertia pars salis fossilis, & paulum mellis adiectum est. Ad omnia uero ista atq; etiā ad colorandas cataractas potest ea compositio, quæ ad Tryphonem patrem auctorem refertur. In ea pares portiones sunt myrobalani, crocomagmati, cretæ amoliæ subcerulæ, nucum amara um, farinæ hordei atq; erui, struthi aibi, sertule campanæ seminis. quæ omnia contrita, melle quàm amarissimo coquantur, illitinq; à uespere usq; mane eluitur.

De oculorum morbis, curationibusq; eorum: & primo de his morbis qui lenibus medicamentis curantur. Cap. VI.

Ed hæc quidem mediocria sunt. Ingentibus uero et uarijs casibus oculi nostri patitur. qui cum magnam partem ad uitæ simul & usum & dulcedinem conferant: summa cura tuendi sunt: protinus autem orta lippitudine quædam notæ sunt: ex quibus quid euenturum sit: colligere possimus. nam simul & lacryma, & tumor, & crassa pituita cæperint, si ea pituita lacrymæ mixta est: & ea lacryma calida est: pituita uero alba & mollis, tumor non durus: longæ ualitudinis metus non est. at si lacryma multa & calida: pituita paulum, tumor modicus: idq; in uno oculo est: longum id, sed sine periculo futurum est. idq; lippitudinis genus minime cum dolore est, sed uix ante uigesimum diem tollitur: nonnunq; per duos menses durat: sed quandoq; finitur. si pituita alba et mollis esse incipit, lacrymæq; miscentur, aut si simul hæ utrunq; oculum inuasêrunt: potest esse breuior, sed periculum ulcerum est. pituita autem sicca & arida dolorem quidē mouet, sed maturius desinit, nisi quid exulcerauit. tumor magnus si sine dolore est & siccus, sine ullo periculo est. si siccus quidem: sed cum dolore est, ferè exulcerat, & nonnunq; ex eo casu fit, ut palpebra cum oculo glutinetur. Eiusdem exulcerationis timor in palpebris, pupillis uel est: ubi super magnum dolorem lacrymæ salæ, calidæq; eunt, aut etiam si timore infinito diu lacryma cum pituita profluit. peius etiam nam est, ubi pituita calida, aut liuida est, lacryma calida aut multa profluit, caput calet, à temporibus ad oculos dolor peruenit: nocturna uigilia urget. siquidem sub his oculis plerunq; rumpitur: notumq; est, ut tantum exulceretur. In-

m iij

Uel unum

oculus

LIBER

tus ruptum oculum febricula inuat. Si foras iam ruptus procedit: si-
ne auxilio est: si de nigro aliquid albidum factum est, diu manet. at
si asperum, crassum est: etiam post curationem uestigium aliquod re-
linquit. Curari uero oculos sanguinis detractione, medicamento, bal-
neo, uino uetustissimus auctor Hippocrates memoriae prodidit. sed
eorum tempora & causas parum explicuit. In quibus medicinae sum-
ma est. neq; minus in abstinentia & alui ductione saepe auxilij est.
Hos igitur interdum inflammatio occupat: ubi cum tumore in his do-
lor est, sequiturq; pituita: cursus nonnunquam copiosior uel acrior:
nonnunq; utraq; parte moderatior. In eiusmodi casu prima omnium
sunt, quies & abstinentia. Ergo primo die loco obscuro cubare debet,
sic ut a sermone quoq; abstineat. nullum cibum assumere: si fieri po-
test ne aquam quidem: sin minus, certe quam minimum eius. Quod
si graues dolores sunt: commodius secundo die: si tamen res urget: etiā
primo sanguis mittendus est: utiq; si in fronte uenae tumunt, si firmo
corpori materia superest. si uero minor impetus, minus acrem cura-
tionem requirit, aluum, sed non nisi secundo, tertio uel die duci oportet.
At modica inflammatio neutrum ex his auxilium desiderat. Sa-
tisq; est uti quiete & abstinentia. Neq; tamen in lippientibus longum
ieiunium necessarium est: ne pituita tenuior atq; acrior fiat. sed secū-
do die dari debet id quod lenissimum uideri potest ex his, quae pitui-
tam faciunt crassiores: qualia sunt oua sorbilia. Si minor uis urget:
pulticula quoq; aut panis ex lacte. Insequentibusq; diebus quantum
inflammationi detrahatur: tantum adijci cibus poterit. sed generis eius-
dem: utiq; ut nihil salsum, nihil acre, nihil ex his: quae extenuant, su-
matur: nihil potui praeter aquam. Et uictus quidem ratio talis. ma-
xime necessaria est. Protinus autem prima die. croci. P. XI. & farinae
candidae quam tenuissimae. P. XII. excipere oportet oui albo: donec mel-
lis crassitudinem habeat: idq; in linteolum illinere & fronti agglu-
tinare, ut compressis uenis pituitae impetum cohibeat. si crocum non
est, thus idem facit: Linteolo an lana excipiat: nihil interest. Super
inung; uero oculi debent: sic ut croci quantum tribus digitis compre-
hendi potest: sumatur: myrrhae: ad fabae papaueris lacrymae ad len-
ticulae magnitudinem. eaq; cum passo conterantur, & specillo super
oculum induatur. Aliud ad idem: Myrrhae. P. XI. Mandragorae suc-
ci. P. XII. papaueris lacrymae. P. XII. foliorum rosae, acutae seminis:
singulorum. P. XIII. acaciae. P. XIII. gummi. P. XVIII. Et haec qui-
dem interdum. noctu uero: quo commodior quies ueniat: non alienum
est superimponere candidi panis interiorem partem. ex uino suba-
ctam. Nam & pituitam reprimi: & siquid lacrymae proassit, ab-
sorbet,

ut quidam se hoc dicit
et sic pueri

lippimus huius
autem uide

forbet: & oculum glutinari non patitur. Si graue id et durum propter magnum oculorum dolorem uidetur: oui & album & vitellus in uas disfundendum est, adiiciendumq; eò mulsi paulum: idq; digito permiscendum. Vbi facta unitas est, demitti debet lana mollis bene arpta. quæ id excipiat, superq; oculos imponi. Ea res & leuis est: & refrigerando pinitam coercet, & non exarescit, et glutinari oculum non patitur. Farina quoq; hordeacea cocta, & cum malo cotoneo cocto mixta commode imponitur. neq; ab ratione abhorret etiam peni- cillo potissimum uti expresso: si leuior impetus est, ex aqua: si maior, ex posca. Priora fasciæ deliganda sunt, ne per somnam cadant, et hoc superimponi satis est, quia & reponi ab ipso commode potest, et cum inaruit, iterum madefaciendum est. Si tantum mali est, ut somnum diu prohibeat: eorum aliquid dandum est: quæ ἀνὰ δάκρυα græci uocant. Satisq; est puero, quod erui, uiro, quod fribæ magnitudinem impleat. In ipsum uero oculum primo die, nisi modica inflammatio est, nihil recte conijciatur. sepe enim potius concitatur eò pinita, quàm maduitur. A secundo die graui quoq; lippitudini per indita medicamentum recte succurritur, ubi uel iam sanguis missus, uel alius ducta est, aut ubi neutrum necessarium esse manifestum est.

De diuersis oculorum collirijs.

Ultæ autem, multorumq; auctorum colliria ad id apta sunt: nouisq; etiam nunc mixturis temperari possunt, cum lenia medicamenta & modice reprimentia facile et uarie miscantur. Ergo nobilissima exequar.

Philonis collirium.

Si igitur Philonis quod habet cerussæ elotæ: spodij, gummi, singulorum. P. XI. papaueris lacrymæ combustæ. P. XI. Illud scire oportet, hic quoq; omnia medicamenta, singula primum per se teri: deinde mixta iterum adiecta paulatim, uel aqua, uel alio humore: gummi cum quasdam alias facultates habeat, hoc maxime præstare, ut ubi colliria facta inaruerunt, glutinata sint, neque fricentur.

Dionysij collirium.

Dionysij uero collirium est, papaueris lacrymæ combustæ donec tenerescat. P. XI. thuris combusti, gummi: singulorum. P. XII. spodij P. XIII.

LIBER

Cleonis collirium.

Leonis nobile admodum: papaueris lacrymæ frictæ. P. XI. croci. P. XI. gummi. P. XI. quibus cum teruntur: adijcitur rosæ succus. aliud eiusdem valentius: squamæ æris quod solumma appellant. P. XI. croci. P. XII. spodij. P. XIII. plumbi et eloti et combusti. P. XVI. gummi tantundem. eius aliud quoque idem est: maxime ubi multa piraita profluit. castorei. P. XX. aloes. P. XL. croci. P. XXI. myrrhæ. P. XII. lycij. P. XIII. cadmiæ curatæ. P. XVIII. shbis tantundem: acaciæ succi. P. XXII. quod cum gummi misceat id quod habet liquidum in pixidecula servatur. Theodotus vero huic compositioni adiecit papaueris lacrymæ combustæ. P. X. æris combusti et eloti. P. XII. nucleos palmarum combustos numero. XX. gummi. P. XXII.

Theodoti collirium, Acharistum appellatum.

Ipse Theodoti, quod à quibusdā Ἀχάριστον nominatur: eiusmodi est. castorei: nardi indicæ: singulorum. P. XI. lycij. P. XII. papaueris lacrymæ tantundem: myrrhæ. P. XII. croci, cerussæ elotæ: aloes, singulorum. P. XIII. cadmiæ, botryodis elotæ æris combusti singulorum. P. XVIII. gummi. P. XVIII. acaciæ succi. P. XXX. shbis tantundem: quibus aqua pluvialis adijcitur.

Cythion, vel tephron collirium.

Ræter hæc ex frequentissimis collirijs est id quod quidam κύθιον: quidā à cinereo colore τέφρον appellant: amyli, tragacanthæ, acaciæ succi, gummi, singulorum. P. XI. papaueris lacrymæ. P. XII. cerussæ elotæ. P. XVIII. spumæ elotæ. P. XXIII. quæ æque ex aqua pluviali conteruntur.

Euelpidis collirium, trygodes nominatum.

Euelpides autem, qui ætate nostrâ maximus fuit oculus medicus utebatur eo, quod ipse composuerat: τρυγώδες nominabat. castorei. P. XII. lycij, nardi, papaueris lacrymæ, singulorum. P. XI. croci, myrrhæ, aloes, singulorum. P. XIII. æris combusti. P. XVIII. cadmiæ et shbis: singulorum. P. XXII. acaciæ succi. P. XXXVI. gummi tantundem. quo grauior uero quæque inflammatio est: cō magis leniri medicamentum debet, adiecto uel albo oui, uel melle.

liebri lacte. at si neq; medicus, neq; medicamentum præsto est, sæpius utrunlibet horum in oculis penicillo ad id ipsum facto infusum, id malum lenit. Vbi uero aliquis releuatus est: iamq; cursus pituitæ constitit: reliquias fortasse leniores futuras discutunt balneum, & uinum. Igitur lauari debet leniter ante ex oleo perfrictus, diutiusq; in cruribus & feminibus, multaq; calida aqua fouere oculos: deinde per caput prius calida, tum egelida perfundi, à balneo cauere ne quo frigore afflatus ue lædatur. post hæc cibo paulo pleniore, quàm ex eorundem dierum consuetudine uti, uitatis tamen oibus pituitam extenuantibus. uinum bibere lenè: subausterum, modice uetus, neq; effuse, neq; timide, ut neq; cruditis ex eo, & tamen somnus fiat, lenianturq; intus latentia acria. Sed si quis in balneo sensit maiorem oculorum perturbationem, quàm attulerat: quod incidere his solet: qui manente adhuc pituitæ cursu, festinarunt, quàm primum discedere debet: nihil eo die uini assumere: cibi minus etiam quàm pridie. deinde cum primum satis pituita substitit, iterum ad usum balnei redire. Solet tamen euenire nonnunquam siue tempestatum uitio, siue corporis, ut pluribus diebus neq; dolor, neq; inflammatio, & minime pituitæ cursus finiatur. quod ubi incidit, iamq; ipsa uetustate res matura est, ab his hisdem auxilium petendum est: id est balneo ac uino. hæc enim ut in recentibus malis aliena sunt: quia concitare ea possunt & accendere, sic in ueteribus, quæ nullis alijs auxilijs cesserunt: admodum efficacia esse cõsuerunt. uidelicet hic quoq; ut alibi, cum secunda uana fuerint contrarijs adiuantibus. Sed ante tonderi ad cutem conuenit. deinde in balneo aqua calida q̃ plurima caput atq; oculos fouere: tum utrunq; penicillo detergere, & ungere caput irino unguento, continereq; in lectulo se, donec omnis calor qui conceptus est finiatur, desinatq; sudor, qui necessario in capite collectus est. tum ad idem cibi uiniqu; genus ueniendum sic, uti potiones meracæ sint: obtegendumq; caput & quiescendum. sæpe enim post hæc grauis somnus, sæpe sudor, sæpe alui deiectio pituitæ cursum finit. Si leuatum malum est, quod aliquanto sæpius fit: per plures dies idem fieri oportet, donec ex toto sanitas restituitur. si diebus hisdem aluus nihil reddit: ducenda est: quo magis superiores partes leuentur. Nonnunq̃ autem ingens inflammatio tanto impetu erumpit, ut oculos sua sede propellat: proprie enim ὀφθαλμοειδ id, quoniam oculi prociidunt: græci appellant. His utiq; si uires patiuntur, sanguinem mitti: si id fieri non potest, aluum duci, longioremq; in diem indici necessarium est. Opus autem lenissimis medicamentis est. Ideoq; Cleonis collirio quidam, quod ex duobus ante positum est: utuntur. Sed optimum est Nilei. neq; de ullo magis inter omnes auctores conuenit.

LIBER

Nilei collirium omnium optimum.

D habet nardi india, papaueris lacrymae, singulorum. **P**
XI. gummi. **P. XI.** croci. **P. XII.** foliorum rosae recentium. **P.**
XIII. quae uel aqua pluuiatili, uel uino leni subaustero
 coquantur. Neq; alienum est malicorium, uel fertulam campanam ex
 uino coquere, deinde conterere: aut myrrham nigram cum rosae folijs
 miscere, aut hyoscyami folia cum oui cocti uitello, aut farinam cum
 acaciae succo, uel passo, aut mulso. quibus si folia quoq; papaueris adij-
 ciuntur, aliquanto ualentiora sunt. Horum aliquo praeparato penicil-
 lo fouere oculos oportet ex aqua calida expresso: i qua ante mel myr-
 ri, uel rosae folia decocta sint. deinde ex illis aliquid imponi. praeter
 haec ab occipitio incisa cute cucurbitula admouenda est. Quod si per
 haec restitutus oculus in sedem suam non est: eodemq; modo prolapsus
 permanet: scire oportet lumen esse amissum. deinde futurum ut inae-
 rescat is, aut in pus uertatur. Si suppuratio se ostendit, ab eo angulo
 qui propior tempore est: incidi oculus debet: ut effuso pure et inflama-
 tio ac dolor finiatur: et intus tunicae residat quo minus foeda postea
 facies sit. Utendum deinde uel hisdem collirijs est ex lacte, aut ouo
 uel croco, cui album oui miscatur. Ac si induruit et sic mortuus
 est, ne in pus uerteretur: quatenus foede prominebit excidendum erit:
 sic ut hamo summa tunica apprehendatur, infra id deinde scalpel-
 lus incidat: tum eadem medicamenta erunt coniicienda: donec omnis
 dolor finiatur. Hisdem medicamentis in eo quoq; oculo utendum est:
 qui primum procidit: deinde per plura loca fissus est.

De carbunculis oculorum, et eorum curatione.

Olent etiam carbunculi ex inflammatione nasci: nonnunq;
In ipsis oculis, nonnunq; in palpebris: et in his ipsis ocu-
 lis modo ab interiore, modo ab exteriori. In hoc casu alius
 ducenda est: cibus minuendus: lac potui dandus, ut acrimoniae quae laeserunt:
 leniatur. Quod ad cataplasmata et medicamenta pertinet: his uten-
 dum, quae aduersus inflammationes proposita sunt. Atq; hic quoq; Nilei
 collirium optimum est. si tamen carbunculus in exteriori palpebrae
 parte est, ad cataplasmata aptissimum est lini semen ex mulso coctum:
 aut si id non est, tritici farina eodem modo cocta.

De pustulis oculorum, et curatione earum.

Pustulae quoq; ex inflammationibus interdum oriuntur:
 quod si inter initia protinus incidit: magis etiam seruanda
 sunt quae de sanguine et quiete supra posui. sin serius quam ut sanguis

mitti possit: alius tamen ducenda est. si id quoque aliqua res inhibet, utique uictus ratio seruanda est. medicamentis autem hic quoque lenibus opus est, quale Nilei: quale Cleonis est.

φιλαιθου's collirium ad pustulas oculorum.

i D quoque: quod philalethos uocatur: huic aptum est. Myrrhæ, papaueris lacrymæ: singulorum. P. XI. plumbi eloti, terræ samie, quæ ἀσπὴ uocatur: tragacanthæ: singulorum. P. XIII. subis costii, amyli: singulorum. P. XVI. spodij eloti, cerussæ elotæ, singulorum. P. XVIII. Quæ aqua pluuiali excipiuntur. Vsus collirij, uel ex ouo, uel ex lacte est.

De ulceribus oculorum, & eorū curatione, & de διαβαλάρυ collirijs

e X pustulis ulcera interdum fiunt, ea quæ recentia æque lenibus medicamentis nutrienda sunt, & hisdem ferè quæ supra in pustulis posui. Fit quoque proprie ad hæc quod διαβαλάρυ uocatur. Habet aeris combusti, & eloti papaueris lacrymæ frictæ: singulorum. P. XI. spodij eloti, thuris, subis combusti & eloti, myrrhæ gummi, singulorum. P. XII.

Curatio oculorum aliquo casu imminutorum.

e Venit etiam ut oculi, uel ambo, uel singuli minores fiant quàm esse naturaliter debeant: Idque & acer pituitæ cursus in lippitudine efficit, & continuati fletus, & ictus parum bene curati. In his quoque hisdem lenibus medicamentis: ex muliebri lacte utendum est. Cibus uero his, qui maxime corpus alere & implere consueverunt. Vitandaque omni modo causa: quæ lacrymas excitet: curaque domesticorum. quorum etiam si quid tale incidit: eius notitiæ subtrahendum: atque acris quoque medicamenta, et acres cibi non alio magis nomine his nocent: quàm quod lacrymas mouent.

De pediculis palpebrarum.

g Enus quoque uitij est: qui inter pilos palpebrarum pediculi nascuntur. Id φσιπίαιον græci nominant. Quod cum ex malo corporis habitu fiat: raro non ultra procedit. Sed ferè tempore interposito pituitæ cursus acerrimus sequitur: exulceratisque uehementer oculis aciem quoque ipsam corrumpit. His alius ducenda, caput ad autem tondendum, diuque quotidie ieiunis perfricandum. His;

LIBER

ambulationibus, alijsq; exerationibus diligenter utendum, gargarizandumq; ex mulso, in quo nepeta, & pinguis ficus decocta sit: saepe in balneo multa calida aqua fouendum caput. Vitandi acres cibi, laete uinoq; pingui utendum, bibendumq; liberalius, quam edendum est. Medicamenta uero intus quidem lenia danda sunt, ne acriorem pituitam concitent. Super ipsos uero pediculos alia, quae necare eos et prohibere: ne similes nascentur, possint. Ad id ipsum spuma nitri: P. XI. sandaracae. P. XI. muae taminiae. P. XI. simul teruntur, adijciaturq; uetus oleum pari portione atq; acetum donec ei mellis crassitudo sit.

De oculorum grauioribus morbis, qui ex inflammationibus oriuntur, & ualidioribus medicamentis curantur: & de Andree collirio, & de dia ué paxos.

Actenus oculorum morbi lenibus medicamentis nutrium =
h tur. Genera deinde alia sunt: quae diuersam curationem desiderant, fereq; in inflammationibus nata sunt, sed finitis quoq; his manentia. Atq; in primis in quibusdam perseverat tenuis pituita cursus: quibus altius ab inferiore parte euocanda est: demendum aliquid ex cibo: neq; alienum est illius frontem compositione Andree, Quae habet gummi. P. XI. cerussae, stibis, singulorum. P. XII. spuma argenti & coctae & elotae. P. XIII. Sed & ea spuma ex aqua pluuiatili coquitur, & arida haec medicamenta ex succo myrti conteruntur. His illita fronte, cataplasma quoq; super iniiciendum est ex farina, quae frigida aqua coacta sit: cuiq; aut acaciae suavis, aut cupressus adiecta sit. Cucurbitula quoq; inciso uertice recte accommodatur, aut ex temporibus sanguis emittitur. Inungi uero eo debet, quod habet squamae æris: papaueris lacrymae: singulorum. P. XI. ceruini cornus combustae, & eloti plumbi, eloti gummi: singulorum. P. XIII. iheris. P. XII. Hoc collirium: quia cornum habet, dia ué paxos nominatur. Quotienscunq; non adyto quod genus humoris adijciendum sit: aquam intelligi uolo.

Memigmenon Euelpidis collirium.

Idem Euelpidis: quod memigmenon nominabat. In eo papaueris lacrymae, et albi piperis singulae unciae sunt: gummi libra: æris combustae. P. XI. Inter has autem curationes post intermissionem aliquam praesunt balneum & uinum. Cumq; omnibus lippientibus uitandi cibi sunt, qui extenuant, tum praecipue quibus tenuis humor diu fertur. Quod si iam fistiduum est eorum, quae pituitam crassionem reddunt: sicut in hoc genere materiae maxime

promptum est: confugiendum est ad ea: quæ quia uentrem, corpus quoq; astringunt.

De oculorum ulceribus supercrescentibus, sordidis, cauis, ueteribus, & de curationibus singulorum.

Tulcera, si cum inflammatione finita non sunt, aut supercrescentia, aut sordida, aut caua, aut certe uetera esse consuevunt. Ex his supercrescentia collirio: quod *μεμυμένον* uocatur: optime reprimuntur. Sordida purgantur et eodem, ex eo, quod *σμήλιον* nominatur.

σμήλιον collirium.

h Abet æruginis. P. XIII. gummi tantundem: ammoniaci, manij sinopia: singulorum. P. XXVI. Quæ quidam ex aqua, quidam quo uehementiora sint, ex aceto terunt.

Phynon collirium Euelpidis.

i D quoq; Euelpidis, quod phynona appellabat, huic utile est Croci. P. XI. papaueris lacrymæ gummi, singulorū. P. XII. æris combusti & eloti, myrrhæ: singulorum. P. XIII. piperis albi. P. XVI. Sed ante linium hoc, unguendum est.

Sphæron collirium Euelpidis.

i D quoq; eiusdem, quod sphæron nominabat: eodem ualet. Lapidis hæmatitis eloti. P. XII. piperis grana sex: cadmiæ elotæ, myrrhæ, papaueris lacrymæ: singulorū. P. XIII. croci. P. XIII. gummi. P. XVIII. Quæ cum uino amineo conteruntur.

Liquidum Euelpidis collirium.

l Iquidum quoq; medicamentum ad idē componebat: in quæ erant hæc. Eruginis. P. X. manij combusti, atramenti sutorij annamoni: singulorum. P. XIII. croci, nardi, papaueris lacrymæ: singulorum. P. XI. myrrhæ. P. XII. æris combusti. P. XIII. anæris ex odoribus. P. XIII. piperis grana. XV. Hæc ex uino austero teruntur. Deinde cum passi tribus heminis decoquuntur. donec corpus unum sit. Idq; medicamentum uetustate efficacius fit.

De cauis oculorum ulceribus, & curationibus.

c Aua uero ulcera commodissime implent ex his quæ supra posita sunt, sphæron, & id quod *φιλανθοῦς* uocatur. Idem sphæron uetusis ulceribus & uix ad cicatricem uenientibus optima succurrit.

LIBER

Hermonis collirium.

St etiam collirium, quod cum ad plura valeat: plurimum
tamen proficere in his ulceribus uidetur. Refertur ad her-
monem autorem: habet piperis longi. P. XII. albi. P. XV.
cinnamomi: costi: singulorum. P. XI. aitramenti sutorij: nardi, cassia, ca-
storei: singulorum. P. XII. gallæ. P. XV. myrrhæ, croci, thuris, lycij, ce-
russæ: singulorum. P. XVIII. papaueris, lacrymæ. P. XII. aloes: æris
combusti, cadmiæ singulorum. P. XVI. acatiæ, stibis, gummi: singulo-
rum. P. XXV.

De cicatricibus oculorum: quæ ex ulceribus factæ sunt: Et quomodo
curari debeant: Et de Asclepia, et Canopite, Et Pyxino collirijs.

Actæ uero ex ulceribus cicatrices duobus uitijs periclitan-
tur: ne aut cauæ, aut crassæ sint. Si cauæ sunt, potest eas im-
plere id, quod sphæron uocari dixi, uel id, quod asclepias
nominatur: habet papaueris lacrymæ. P. XII. sagapeni, opopanaeis:
singulorum. P. XIII. eruginis. P. XIII. cumini. P. XVIII. piperis. P.
XXII. cadmiæ elotæ: cerussæ: singulorum. P. XXVI. At si crassæ cica-
trices sunt: extenuant uel smilion, uel Canopite collirium: quod habet
cinnamomi, acatiæ: singulorum. P. XI. Cadmiæ elotæ, croci, myrrhæ:
papaueris lacrymæ: gummi: singulorum. P. XII. piperis albi, thuris,
singulorum. P. XIII. æris combusti. P. XVIII. cum aqua pluuiiali.
uel Euelpidis Pyxinum: quod ex his constat. Salis fossilis. P. XIII.
ammoniaci: thymiamatis. P. XVIII. papaueris lacrymæ. P. XII. ce-
russæ. P. XXV. piperis albi, croci siculi: singulorum. XXXI. gum-
mi. P. XIII. cadmiæ elotæ. P. XVIII. Maxime tollere cicatricem ui-
detur id quod habet gummi. P. XII. eruginis. P. XI. croci magna-
tis. P. XIII.

De alio genere inflammationis oculorum.

St etiam genus inflammationis: in qua, si cui tument ac di-
stenduntur cum dolore oculi, sanguinem ex fronte emitti
necessarium est: multaq; aqua calida capui, atq; oculos fove-
re: gargarizari ex lenticula, uel ex fici cremore: inungi acribus mudi-
camentis, quæ supra comprehensa sunt: maximeq; eo quod sphæron
nominatur, quod lapidem hæmatitem habet. Atq; alia quæq; utilia
sunt, quæ ad extenuandam asperitudinem fiunt: de qua protinus di-
cam. Hanc autem inflāmatio oculorum ferè sequitur: interdū maior,
interdum

interdum leuior, nonnunquam etiam ex aspritudine lippitudo fit: deinde aspritudinem ipsam auget, fitq; ea in alijs breuis, in alijs longa, & quæ uix unquam finiatur. In hoc genere ualetudinis quidam crassas, durasq; palpebras & ficulneo folio, & asperato specillo, & interdum scalpello eradunt: uersaq; quotidie medicamentis suffrunt. Quæ neq; nisi in magna uetustaq; aspritudine, neque sæpe faciendæ sunt. Nam melius eodẽ, ratione uictus & idoneis medicamentis peruenitur. Ergo exercitationibus utemur, & balneo frequentiore, multaq; oculorum palpebras aqua calida fouebimus. Cibos autem sumimus acres, & extenuantes.

Cæsarianum collirium.

T medicamentum id quod cæsarianum uocatur, habet atramenti sutorij. P. XI. mysi. P. X. piperis albi. P. XV. papaueris lacrymæ, gummi: singulorum. P. XII. cadmiæ lotæ P. XIII. fribis. P. XVI. Satisq; constat hoc collirium aduersus omne genus oculorum ualetudinis idoneum esse, exceptis his, quæ lenibus nutriuntur.

Hieracis collirium.

Id quocq; quod Hieracis nominatur ad aspritudinem potest. habet myrrhæ. P. XI. ammoniaci: thymamatis. P. XII. æruginis rase. P. XIII. cum aqua pluuiali. Ad idem idoneum est etiam id quod Canopite est: & id quod smilion uocatur, & id quod pyxinum, et id quod sphæron. Si composita medicamenta nõ ad sunt, felle caprino, uel quam optimo melle satis cõmode aspritudo curatur.

De Xerophthalmia.

St etiam genus aridæ lippitudinis: ξηροφθαλμία, & græci appellant: neq; tumens, neq; fluunt oculi, sed rubent tantum, et cum dolore quodam grauescunt, & noctu prægrauis pituita inhaerescunt, quantoq; minor generis huius impetus: tanto finis manus expeditus est. In hoc uitio multum ambulare, multum exerceri, lauari sæpe, ibiq; desudare, multaq; frictione uti necessarium est. cibi qui neq; implent, neq; nimium acres, apti sunt: sed inter hos medij: mane ubi concocxisse manifestum est, non alienum est ex sinapi gargari: tum deinde caput, atq; os diutius defricare.

Aurelij Cor.

LIBER

Rhinion collirium.

Ollirium uero aptissimum est, quod Rhinion uocatur. habet myrrhæ. P. XI. papaueris lacrymæ: acaciæ succi, piperis, gummi: singulorum. P. XI. lapidis hæmatitis: lapidis phrygii, lycii, lapidis scissilis singulorum. P. XII. æris combusti. P. XIII. ac pyxinum quoq; eodem accommodatum est.

Ad oculos scabros colliria.

I uero scabri oculi sunt, quod maxime in angulis esse consuevit, potest prodesse Rhinion id, quod supra positum est: potest similiter prodesse id, quod habet æruginis rasæ: piperis longi, papaueris lacrymæ: singulorum. P. XII. piperis albi, gummi, singulorum. P. XIII. admiæ elotæ, cerussæ, singulorum. P. XVI. nullum tamen melius est quam Euelpidis quod βασιλινὸν nominabat. habet papaueris lacrymæ, cerussæ, lapidis asii, singulorum. P. XII. gummi. P. XIII. piperis albi. P. XIII. croci. P. XVI. psorici. P. XIII. Nulla autem per se materia est: quæ psoricum nominetur: sed chalcididis aliquid, & admiæ dimidio plus ex aceto simul conteruntur, idq; in uas fictile additum, et contactu ficulneis folijs sub terra reponitur: sublaturq; post dies uiginti rursus teritur, & sic appellatur. Verum in basilico quoq; collirio conuenit ad omnes affectus oculorum id esse idoneum: qui non leuibus medicamentis curantur. Vbi non sunt autem medicamenta composita, scabros angulos leuant, et mel, et uinum. suauitq; & his, & aridæ lippitudini si quis panem ex uino subactum super oculum imponit. nam cum ferè sit humor aliquis, qui modo ipsum oculum, modo angulos aut palpebras exasperat, sic et si quid prodit humoris: extrahitur, & si quid iuxta est, repellitur.

Ad caligationem oculorum, quæ propter lippitudinem oritur remedia & colliria.

Aligare uero oculi nonnunquam ex lippitudine, nonnunquam etiam sine hac propter senectutem, imbecillitatem uel alia consuerunt: si ex reliquis lippitudinis id uitium est, adiunat collirium, quod asclepias nominatur, adiunat id quod ex crocogmate fit.

ῥιζὴ ὑπόου collirium.

Properie etiam ad id componitur: quod ῥιζὴ ὑπόου uocant. habet piperis. P. XI. croci alidis, papaueris lacrymæ, cerussæ, singulorum. P. XII. psorici, gummi: singulorum. P. XIII.

Ad caliginationem oculorum, quæ propter senectutem, aut
aliam imbecillitatem fit.

T si ex senectute, alia uel imbecillitate id est, recte inungi po-
test, & melle quàm optimo, et cyprino, et oleo uetere. Côm-
dissimum tamen est balsami partem unam: & olei ueteris,
aut cyprini partes duas, mellis quàm acerrimi partes tres miscere.
Vtilia quoq; huic medicamenta sunt, quæ ad caliginem proxime, quæq;
ad extenuandas cicatrices supra comprehensa sunt. Cuicumq; uero oca-
li caligabunt: huic opus erit multa ambulatione atq; exercitatione,
frequenti balneo, ubi tutum quidem corpus perficiendum est: præci-
pue tamen caput, & quidem irino donec insuder: uelandumq; postea:
nec detegendum antequam sudor, & calor domi conquierint. cum ci-
bis utendum acribus & extenuantibus, interpositisq; aliquibus die-
bus ex sinapi gargarizandum.

De suffusione oculorum.

Suffusio quoq; quam græci ὀφθαλμῶν nominant: interdum
oculi potentia, quæ cernit, se opponit. Quod si inueteraue-
rit, manu curandum est. Inter initia nonnunquam etiam
certis observationibus discutitur. sanguinem ex frõte uel naribus mit-
tere, in temporibus uenas adurere: gargarizando pituitam euocare:
suffumigare oculos acribus medicamentis, inungere expedit. uictus
optimus est qui pituitam extenuat.

De resolutione oculorum, quæ paralysis dicitur.

Cne resolutio quidẽ oculorum: quàm παραλυσὶς græci no-
minant, alio uictus modo, uel alijs medicamentis curanda est.

Exposuisse tantum genus uirij satis est. Igitur interdum eue-
nit modo in altero oculo, modo in utroq; aut ex ictu aliquo, aut ex
morbo comitiali, aut ex distentione nervorum, quæ uchementer oculus
ipse concussus est, ut his neq; quoquam intendi possit, nec omnino con-
sistat, sed huc illuc uel sine ratione moveatur, idcirco ne conspectum
quidem rerum præstet.

De mydriasi oculorum.

Non multũ ab hoc malo distat id, quod μυδρίασις græci no-
cant. Pupilla effunditur, & dilatatur, aciesq; eius hebescit,
ac penẽ difficillime genus id imbecillitatis eliditur. i utraq;
uero id est, et paralysis, & mydriasi pugnandũ est p eadẽ oia, quæ in
caligine oculorũ præcepta sunt, paucis tantũ mutatis: si quidem ad caput

LIBER

irino interdum acetum, interdum nitrum adiiciendum est: melle inu-
gi satis est. quidam in posteriore uitio calidis aquis usi, reuatiq;.
quidam sine ulla manifesta causa subito obcaecati sunt. ex quibus no-
nulli cum aliquandiu nihil uidissent, repentina profusione alui, lumē
receperunt: quo minus alienum uidetur, ex recenti re & interposito
tempore medicamentis quoq; moliri deiectiones: quæ omnem noxiam
materiam in inferiora depellant.

De imbecillitate oculorum.

Ræter hæc imbecillitas oculorum est: ex qua quidam inter-
diu satis, noctu nihil cernunt: quod in foeminam bene respō-
dentibus menstruis non cadit: sed sic laborātes inungi oportet
humore iocineris maxime hircini: si minus, caprini, ubi ad assum
coquitur, excepto: atq; edi quoq; ipsum iecur debet. Licet tamen etiam
hysdem medicamentis non inutiliter uti, quæ uel cicatrices, uel aspri-
tudinem extenuant: quidam contrito semine portulacæ mel adiiciunt
eatenus ne id ex specillo desillet: eoq; inungunt. Exercitationibus, bal-
neo, frictionibus, gargarizationibus usdem his quoq; utendum est.

Ad oculos qui extrinsecus offenduntur: cum sanguine suffusi sunt.

T hæc quidem in ipsis corporibus oriuntur. Extrinsecus
uero interdum si ictus oculum lædit, ut sanguis in eo suffun-
datur: nihil commodius est: quàm sanguine uel columbæ, uel
palumbi, uel hirundinis inungere: neq; id sine causa fit: cum horum
acies extrinsecus læsa interposito tempore in antiquum statum rede-
at, celeberrimiq; hirundinis. Vnde etiam locus fabulæ factus est, aut
per parētes, aut id herba chelidonio restitui: quod per se sanescit: eo-
rum ergo sanguis nostros quoq; oculos ab externo casu commodissime
tuetur, hoc ordine, ut sit hirūdinis optimus, deinde palumbi, minime
effusus columbæ & illi ipsi & nobis. Supra percussum uero oculum
ad inflammationem leniendam non est alienum imponere etiam
cataplasmata: sed ammoniacus, uel quilibet alius quàm optimus teri
debet sic, ut ei paulatim oleum adijciatur, donec crassitudo strigmen-
ti fiat. Id deinde miscendum est cum hordeacea farina: quæ ex mulso
decocta sit. Facile autem recognitis oibus, quæ medici quoq; prodide-
runt: apparere cuilibet potest uix ullum ex his, quæ supra comprehē-
sa sunt: oculi uitium esse, quod non simplicibus quoq; & promptis re-
medijs submoueri possit.

Auris

Actenus in oculis ea reperiuntur, in quibus medicamenta plurimum possint: ideoque ad aures transeundum est, quarum usum proximum à luminibus natura nobis dedit: sed in his aliquanto maius periculum est: nam vitia oculorum intra ipsos nocet. Aurium inflammationes doloresque, interdum etiam ad dementia, mortemque precipitant: quo magis inter initia protinus succurrendum est: ne maiori periculo locus sit. Ergo ubi primum dolorem aliquis sensit: abstinere, & continere se debet. Postero die, si uehementius malum est, caput tondere, idque irino unguento calido perungere, & operire: at magnus cum febre, uigiliaque dolor exigit, ut sanguis quoque mittatur. si id aliquæ causæ prohibens, alius soluenda est. Cataplasmata quoque calida subinde mutata proficiunt, siue foeni græci, siue lini, siue alia farina ex nullo decocta est. recte etiam subinde admoventur spogæ ex aqua calida expressæ. tum lenato dolore ceratum circumdari debet ex irino, aut cyprino factum. In quibusdam tamen melius, quod ex rosa factum est, proficit. si uehemens inflammatio somnum ex toto prohibet, adijci cataplasmata debent papaueris corticis fricti atque contriti sic, ut ex his pars dimidia sit, eaque tunc simul ex passo mixto decoquatur. In aurē uero infundere aliquod medicamentum oportet, quod semper ante tepestieri conuenit: commodissimeque per strigilem instillatur. ubi auris repleta est: super lana mollis addenda est, quæ humorē intus contineat. & hæc quidem cōmunia sunt. Medicamentum uero est & rosæ, & radicū harundinum succus, & oleum in quo lumbrici cocti sunt, et humor ex amaris nucibus, aut ex nucleo mali persici expressus. composita uero ad inflammationem, doloremque leniendum hæc ferè sunt: castorei, papaueris lacrymæ pares portiones conteruntur: deinde adiicitur his passum. uel papaueris lacrymæ, croci, myrrhæ par modus sic teritur, ut inuicem modo rosa, modo passum instilletur, uel id, quod amarum in ægyptia faba est conteritur, & rosa adiecta: quibus myrrhæ quoque paulum à quibusdam miscetur, uel papaueris lacrymæ, aut thus cum muliebri lacte, uel amararum nucum cum rosæ succo, uel castorei, myrrhæ, papaueris, lacrymæ pares portiones cum passo: uel croci. P. XI. myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum P. XII. quibus tum teruntur, paulatim miscetur passi cyathi tres, melis minus cyatho: idque ex primis medicamentis est: uel papaueris lacryma ex aceto. Licet etiam compositione uti Themisonis: quæ habet castorei opopanis: papaueris lacrymæ ex aceto, singulorum. P. XII. spumæ lycij. P. XIII. quæ contrita passo exapiuntur donec cerati

Aurelij Cor.

n iij

unq. irino
massa sang.
purgans
cataplasma

crassitudinem habeant: atq; ita reponuntur. ubi usus requiritur, rursus idem medicamentum adiecto passo, specillo teritur. Illud perpetuum est, quotienscunq; crassius medicamentum est, quam ut in aurem instillari possit, adiiciendum eum esse humorem, ex quo id componi debet: donec satis liquidum sit. si uero pus quoq; aures habent, recte lycium per se infunditur, aut irinum unguentum, aut porri succus cum melle, aut centaureæ succus cum passo, aut dulcis punici mali succus in ipsius cortice tepesfactus, adiecta myrrhæ exigua parte. Recte etiam miscentur myrrhæ, quam stacten cognominant. P. XI. croci tantundem, nucis amaræ. XXV. mellis sesquicyathus, quæ contrita, cum utendum est, in cortice punici mali tepescant. ea quoq; medicamenta. quæ oris exulcerati causa componuntur, æq; ulcera aurium sanant: quæ si uetustiora sunt, et multa sanies fluit: apta compositio est, quæ ad auctorem Erasistratum refertur: piperis. P. XI. croci. P. XI. myrrhæ, mysi cocti, singulorum. P. XII. æris combusti. P. XII. hæc ex uino teruntur: deinde ubi inaruerunt, adiunguntur passi heminae tres, et simul coquantur: cum utendum est, adiicitur his mel, et uinum. Est etiam Ptolemæi chirurgi medicamentum, quod habet lentisci. P. XI. gallæ. P. XI. omphacij. P. XI. succum punici mali. Est menophili ualidum admodum, quod ex his constat: piperis longi. P. XI. castorei. P. XII. myrrhæ, croci, papaueris lacrymæ, nardi syriaci, thuris, malicorij, ex ægyptia faba partis interioris, nucis amararum, mellis quam optimi, singulorum. P. XIII. quibus cum teruntur, adiicitur acetum quam acerrimum, donec crassitudo in his passi fiat. Est Cratonis, cinnamomi, cassiæ, singulorum. P. XI. lycij, nardi, myrrhæ, singulorum. P. XI. aloes. P. XII. mellis cyathi tres, uini sextarius, ex quibus uinum cum lyco decoquitur: deinde his alia miscentur: at si multum puris, malusq; odor est, æruginis rasæ, thuris, singulorum. P. XII. mellis cyathi duo, acetum quattuor simul incoquantur: ubi utendum est, dulce uinum miscetur, aut aluminis scissilis, papaueris lacrymæ, cassiæ sicuti par pondus miscetur: hisq; adiicitur hyoscyami succi dimidio minor quam unius ex superioribus portio: eaq; trita ex uino diluuntur. per se quoq; hyoscyami succus satis proficiat. Commune uero auxilium aduersus omnes aurium casus: iamq; usu comprobatum Asclepiades composuit. In eo sunt cinnamomi, cassiæ, singulorum. P. XI. flores iunci rotundi, castorei, albi piperis longi, amomi, myrobalani, singulorum scrupuli duo, thuris masculi, nardi syriaci, myrrhæ pinguis, croci, spumæ nitri, singulorum. P. XII. quæ separatim contrita, rursus mixta ex aceto conteruntur: atq; ita condita, ubi utendum est, aceto diluuntur. eodem modo commune auxilium auribus laborantibus est. Polybi sphragis ex dulci ui-

no liquata: quæ compositio priore libello continetur. quod si et sanies profluit, et tumor est, non alienum est, mixto uino per oricularium clysterem eluere: et tum infundere uinum austerum cum rosa mixtum: cui spodij paulum sit adiectum, aut lycium cum lacte, aut herbae sanguinalis succum cum rosa, aut mali punia succum cum exigua parte myrrhæ: si sordida quoque ulcera sunt, melius mulso eluuntur: et tum aliquod ex his quæ supra scripta sunt, quod mel habeat, infunditur: si magis pus profluit, et caput utique tondendum est, et multa calida aqua perfundendum, et gargariandum, et usque ad lassitudinem ambulandum, et cibo modico utendum est. si cruor quoque ex ulceribus apparuit, lycium cum lacte debet infundi, uel aqua, in qua rosa decocta sit, succo aut herbae sanguinalis, aut acacie adiecto. quod si super ulcera caro increuit, eaque mali odoris sanguine fundit, aqua tepida elui debet: tum infundi id, quod ex thure, et ærugine, et aceto, et melle fit: aut mel cum ærugine incoctum: squama quoque æris cum sandaraca contrita per fistulam recte insillatur.

Aduersus aurium uermes.

Bi uero uermes orti sunt, si iuxta sunt, protrahendi oriculario specillo sunt: si longius, medicamentis enecandi: cauendumque, ne postea nascentur. ad utrumque proficit album uetrarium cum aceto contritum: flui quoque aurem oportet uino, in quo marrubium decoctum sit. sic emortui uermes in primam auris partem prouocabuntur: unde facillime educi possunt.

Ad compressa aurium foramina.

In foramen auris compressum est, et intus crassa sanies subest, mel quam optimum addendum est: si id parum proficit, mellis cyatho et dimidio, æruginis rase. P. XII. adiacendum est: incoquendumque, et eo utendum. Iris quoque cum melle idem proficit. Item mellis, et rosæ scrupuli duo. Item galbani. P. XII. myrrhæ cum melle, et fellis taurini, singulorum. P. XII. uini quantum satis est ad myrrham diluendam.

Ad grauem auditum.

Bi uero grauius aliquis audire cepit, quod maxime post longos capitis dolores euenire consuevit: in primis aurem ipsam considerare oportet. Apparebit enim aut crusta qualis super ulcera innascitur, aut sordium coitus: si crusta est, infundendum est aut oleum calidum, aut cum melle ærugo, uel porri succus, aut cum mulso nitri paulum: atque ubi crusta à corpore iam recedit,

LIBER

elucenda auris aqua tepida est: quo facilius ea per se diducta, oriculi-
lario specillo protrahatur. si sordes æque molles sunt, eodem specillo
eximendæ sunt. at si duræ sunt: acetum, & cum eo nitri paululum
coniiciendum est. Cumq; emollitæ sunt, eodem modo elui aurem, purga-
riq; oportet. quod si capitis grauitas manet: attendendum idem, &
leniter, sed diu perfricandum est, adiecto uel irino, uel laureo oleo sic,
ut utrilibet paulum aceti misceatur: tum diu ambulandum, leniterq;
post unctionem aqua calida caput fouendū: Cibisq; utendum ex im-
becillissima & media materia, magisq; assumendæ dilutæ potiones:
nonnunq; gargarizandum est. Infundendum autem in aurem casto-
reum cum aceto, & laureo oleo, & succo radicula corticis: aut cucu-
ris agrestis succus adiectis contritis rosæ folijs: immaturæ quoq; uinæ
succus cum rosa insillatus aduersus sordiditatem satis proficit.

Ad sonitum aurium intra se ipsas.

Liud uitij genus est: ubi aures intra se ipsas sonant: atq; hoc
quoq; fit, ne externum sonum accipiant: leuissimum est, ubi
id ex grauedine est. peius: ubi ex morbis, capitis uel longis do-
loribus incidit. Pessimum: ubi magnis morbis uenientibus, maximeq;
comitiali: prouenit. Si ex grauedine est: purgare aurem oportet, et spi-
ritum continere, donec inde humor aliquis expumet: si ex morbo uel
capitis dolore, quod ad exercitationē, frictionem, perfusionem, gargari-
zationemq; pertinet, eadem faciendæ sunt: cibus nō utendum nisi ex-
tenuantibus: in aurem dandus radiculae succus cum rosa, uel cum suc-
co radicis ex cucumere agresti, uel castoreum ex aceto et laureo oleo.
ueratrum quoq; cum aceto conteritur: deinde melle cocto excipitur, &
inde collirium factum in aurem demittitur: si sine his cepit, ideoq;
nouo metu terret, in aurem dari debet castoreum cum aceto uel iri-
no, uel laureo oleo, aut huic mixtum castoreū cum succo uicium ama-
rarum, aut myrrha & nitrum, cum rosa et aceto. Plus tamen in hoc
quoq; proficit uictus ratio: eademq; faciendæ sunt: quæ supra compre-
hendi: cum maiore quoq; diligentia, & præterea, donec his sonus fi-
niatur, à uino abstinendum. quod si simul & sonus & inflammatio,
laureum oleum conicasse abunde est, aut id quod ex amaris nucibus
exprimitur: quibus quidam uel castoreum, uel myrrham miscent.

Ad ea, quæ in aurem inciderunt extrahenda.

¶ Olet etiam interdum in aurem aliquid incidere, ut calculus,
aliquod'ue animal. Si pulex intus est: compellendum eò lanæ
paulum est, quo ipse is subit, & simul extrahitur: si non est secutus,
aliud'ue

aliud ue animal est, specillum lana inuolutum in resina quam glutinosissimam, maximeq; terebinthinam demittendum, idq; in aurem conijciendum, ibiq; uertendum est. Vtiq; enim comprehendet & eximet: si aliquid ex aume est: specillo oriculario protrahendum est, aut hamulo retuso, paulum recuruato: si ista nihil proficiunt, potest eodem modo resina protrahi: sternutamenta quoq; admota id commode elidunt, aut oriculario clystere aqua uehementer intus compulsa: tabula quoq; collocatur media inhaerens capitibus utriusq; pendentibus, superq; eam homo deligatur in id latus uersus, cuius auris eo modo laborat sic, ut extra tabulam emineat. Tum malleo caput tabulae, quod a pedibus est, feritur: atq; ita concussa aure, id quod inest: excidit.

De narium morbis, & curationibus. Cap. VIII.

Nares.

Ares uero intus exulceratas fouere oportet uapore aquae calidae, id est spongia expressa atq; admota: fit & subiecto uase oris angusti, calida aqua repleto. Post id fomentum illinenda ulcera sunt, aut plumbi cremore, aut cerussa, aut argenti spiritum cum quolibet horum aliquis conterit: eiq; dum teritur inuicem uinum & oleum myrteum adijcat, donec mellis crassitudinem fecerit. si autem ea ulcera circa nares sunt, pluresq; crustas, & odorem foedum habent, quod genus graeci ὀσείων appellant: sciri quidem debet, uix ei malo posse succurri. Nihilominus tamen haec tentari possunt, ut caput ad cauem tondeatur, assidueq; uehementer perfricetur: multa calida aqua perfundatur: multa ei deambulatio sit: abus modicus: neq; acer, neq; ualentissimus: tum in nares ipsam mel cum ex quo modo resinae terebinthinae conijciatur: quod specillo quoq; inuoluto lana fit, attrahaturq; spiritu is succus, donec in ore gustus eius sentiat: sub his enim crustae resoluntur, quae tum per sternutamenta elidi debent: puris ulceribus uapor aquae calidae subiiciendus est: deinde adhibendum, aut lycium ex uino dilutum, aut amurca, aut omphacium, aut menthae, aut marrubij succus, aut atramentum sutorium, quod atndens factum, deinde contritum sit, aut interior scyllae pars contrita sic, ut horum cuilibet mel adijciatur: cuius caeteris admodum exigua pars esse debet: in atramento sutorio tanta, ut ea mixtura liquida fiat, cum scylla utiq; pars maior: inuoluendumq; lana specillum est, & in eo medicamento intinguendum, eoq; ulcera implenda sunt: rursumq; linamentum inuolutum, & oblongum eodem medicamento illinendum demittendumq; in nares est, & ab inferiore parte leniter deligandum: idq; per hyemem & uer bis die, per aestatem & autu-

LIBER

inum, ter die fieri debet, interdum uero etiam in naribus carunculae quaedam similes muliebribus mammis nascuntur, haecque in his partibus, quae carnosissimae sunt inhaerent. Has curare oportet medicamentis adurentibus: sub quibus ex toto consumuntur. Polypus uero est caruncula modo alba, modo subrubra, quae narium ossi inhaeret, et modo ad labra pendens narem implet, modo retro per id foramen, quo spiritus à naribus ad fauces descendit, adeo increfcit, uti post uiam conspicia possit, strangulatque hominem maxime austro aut euro flante: fereque mollis est, raro dura, eaque magis spiritum impedit, et nares dilatat: quae fere non curatur: itaque attingi non debet. illud aliud genus, fere quidem ferro curatur, interdum tamen inarescit: si addita in narem per linamentum, aut penicillum ea compositio est, quae habet minij sinopici, chalcitis, calcis, sandaracae, singulorum. P. X. I. atramenti sutorij. P. XII.

Dentes

De dentium dolore, et curationibus. Cap. IX.

N dentium autem dolore, qui ipse quoque maximis tormentis annumerari potest, uinum ex toto circuncidendum est. cibo quoque primo abstinendum, deinde eo modico, mollique utendum, ne mandentis dentes irriter: tum extrinsecus admouendus per spongiam uapor aquae calidae, imponendumque ceratum ex cyprino, aut irino factum, lanaque id comprehendendum, caputque uelandum est, quod si grauior is dolor est: utiliter et alius ducitur, et calida cataplasmata super maxillas iniiciuntur, et ore humor calidus cum medicamentis aliquibus continetur, saepiusque mutatur: cuius rei causa et quinq; folij radix in uino mixto coquitur, et hyoscyami radix, uel in posca, uel in uino mixto coquitur sic, ut paulum his salis adijciatur, et papaueris non nimium aridi cortices, et mandragorae radix eodem modo. sed in his tribus utique uitandum est, ne quod austum erit, deuoretur: ex populo quoque alba cortex radice in hunc usum in uino mixto recte coquitur, et in aceto cornu ceruinum rasum, et nepeta cum teda pingui: ac ficus item pinguis, uel in mulso, uel in aceto, et melle: ex quibus cum ficus decocta est, is humor percolatur. specillum quoque lana inuolutum in calidum oleum demittitur, eoque ipso dens fouetur. quinetiam quaedam quasi cataplasmata in dentem ipsum illinuntur: in quem usum ex malo punice acido, atque arido malicorij pars interior cum pari portione, et gallae et pinei corticis conteritur, misceturque his minium, eaque contrita aqua pluuiali coguntur, aut panacis, papaueris lacrymae, peucedani, uuae taminiae sine seminibus

pares portiones conteruntur, aut galbani partes tres, papaueris lacrymæ pars quarta. Quicquid dentibus admotum est, nihilo minus supra maxillam ceratum, quale supra posui: esse debet: lana obtectum: quidam etiam myrrhæ, cardamomi, singulorum. P. XI. croci, pyretri: fisorum partes: singulorum. P. XIII. Sinapis. P. XVIII. contrita linteolo illinant, imponuntq; in humero partis eius, qua dens dolet: si is superior est, à scapulis: si inferior, à pectore: idq; dolorem leuat: & cum leuauit, protinus submouendum est: si uero exesus est dens, festinare ad eximendum eum, nisi res coegit, non est necesse: sed cum omnibus fomentis, quæ supra posita sunt, adijciendæ quædam ualentiores compositiones sunt, quæ dolorem leuant: quales hæc sunt. habet autem papaueris lacrymæ. P. XI. piperis. P. XII. pforeos. P. XX. quæ contrita galbano excipiuntur, idq; circumdatur: aut Menemachi maxime ad maxillares dentes in qua sunt croci. P. XI. cardamomi, thuris, fuliginis: fisorum partes, pyretri, singulorum. P. XIII. sinapis. P. XVIII. Quidam autem immiscet pyretri, piperis, elaterij, singulorum. P. XI. aluminis scissilis: papaueris lacrymæ, uis tamen sulphuris ignem non experti, bituminis, lauri baathurum, sinapis, singulorum. P. XII. Quod si dolor eximi eum cogit, & piperis semen cortice liberatum, & eodem modo baathur hederæ coniecta in id foramen, dentem findit, isq; forte stans exidet: & plani piscis quàm pastinacæ nostri, *πρωτὶς* græci uocant, aculeus torretur: deinde conteritur, resinaq; excipitur, quæ denti circumdata hunc soluit: & alumen scissile in id foramen coniectum dentem citat: sed id tamen inuolutum in lanula demitti commodius est, quia sic dente seruato dolorem leuat. Hæc à medicis accepta sunt: sed agere stium experimento cognitum est, cum dens dolet, herbam mentastrum cum suis radicibus uelli debere, & in peluem conijci, supraq; aquam infundi, collocariq; iuxta sedentem hominem undiq; ueste contextum: tum in peluem candentes filices demitti sic, ut aqua tegantur, hominemq; eum hiantem ore uaporem excipere, ut supra dictum est undique inclusum. nam & sudor plurimus sequitur, & per os continens pituita defluit, idq; sæpe longiorem, sæpe annuam ualeitudinem bonam præstat.

De tonsillis, & earum cura.

Cap. X.

Si uero tonsillæ sine exulceratione per inflammationem intumuerunt, caput uelandum est extrinsecus: is locus uapore calido fouendus, multa ambulatione utendum, caput in lecto sublime

*Medic. myrrina
P. XI. croci
P. XII. piperis
P. XIII. sinapis
P. XVIII. pyretri
P. XX. pforeos
P. XXI. galbani
P. XXII. menemachi
P. XXIII. cardamomi
P. XXIV. thuris
P. XXV. fuliginis
P. XXVI. aluminis
P. XXVII. bituminis
P. XXVIII. lauri
P. XXIX. baathurum
P. XXX. sinapis*

Quod si dolor eximi eum cogit

Agere stium experimento cognitum est

Tons. cura

LIBER

habendum, gargarizandumq; est ex reprimentibus. radix quoq; ea: quam dulcem appellant contusa & in passo, mulso'ne decocta idem præstat. leniterq; quibusdam medicamentis eas illini non alienū est: quæ hoc modo fiunt. ex malo punico dulci succus exprimitur, & eius sextarius in leni igne coquitur, donec ei mellis crassitudo sit: tum croci, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum. P. XII. per se conteruntur, paulatimq; his adiunguntur uini lenis cyathi duo, mellis unus: deinde priori succo ista miscentur, & rursus leniter incoquantur: aut eiusdē succi sextarius eodem modo coquitur, atq; eadem ratione trita ei adiunguntur hæc nardi. P. XV. omphacij. P. XI. cinnamomi, myrrhæ, cassiæ, singulorum. P. XI. eadem autem hæc & auribus & naribus purulentis accommodata sunt. Cibus quoq; in hac ualitudine lenis esse debet ne exasperet, quod si tanta inflammatio est, ut spiritum impediatur, in lecto conuiescendum, à cibo abstinendum, neq; assumendum quicquam præter aquam calidam est: alius quoq; ducenda est: gargarizandum ex fico & mulso: illinendum mel cum omphacio: intrinsecus admoendum, sed aliquanto diutius uapor aquæ calidæ, donec ea suppurent, et per se aperiantur: si pure substante non rumpuntur hi tumores, incidendi sunt: deinde ex mulso calido gargarizandum ex fico: at si modicus quidem tumor & exulceratio est, furfurum cremori ad gargarizandum paulum mellis adiciendum est: illinendaq; ulcera hoc medicamento. passi quamdulcissimi tres heminae ad unā coquantur: tum adijciatur thuris. P. XI. croci, myrrhæ: singulorum. P. XI. leniterq; oīa rursus feruescunt. ubi pura ulcera sunt, eodem furfurum cremore, uel lacte gargarizandum est. atq; hic quoq; cibus lenibus opus est: quibus adijci dulcē uinum potest.

De oris ulceribus, & curationibus, & quæ antheræ sint. Cap. XI.

Ulcera autem oris, si cum inflammatione sunt, & parum pura ac rubicunda sunt: optime his medicamentis curantur, quæ supra posita ex malis punicis fiunt: continendusq; sæpe ore reprimens cremor, cui paulum mellis sit adiectum: utendum ambulationibus, et non acri cibo. simulatq; uero pura ulcera esse cœperunt, lenis humor, interdum etiam quā optima aqua ore continenda est. predestq; assumptum pyrum mitium, pleniorq; cibus, dum acris uacet. inspergq; ulcera debent alumine scissili, cui dimidio plus gallæ immaturæ sit adiectum. si iam crustas habent, quales in adustis esse consuerunt, adhibendæ sunt hæc compositiones, quas græci ἀνθραξες nominant. Iunci quadrati, myrrhæ, sanda-

sandaracæ, singulorum. P. .XIIII. aluminis pares portiones: aut croci, myrrhæ, singulorum. P. .XII. iridis, aluminis, scissilis, sandaracæ: singulorum. P. .XIIII. iunci quadrati. P. .XVIII. aut gallæ, myrrhæ: singulorum. P. .XII. aluminis, scissilis. P. .XII. rosæ foliorum. P. .XIIII. quidam autem croci. P. .X. aluminis, scissilis, myrrhæ: singulorum. P. .XI. sandaracæ. P. .XII. iunci quadrati. P. .XIIII. miscent. Priora arida insperguntur: hoc cum melle illinitur neq; ulceribus tantum, sed etiã tonsillis. Verũ ea longe periculosissima ulcera sunt, quas ἀποσφᾶς græci appellant, sed in pueris. hos enim sæpe consumunt: in uiris et mulieribus idem periculum non est. Hæc ulcera à gingivis incipiunt, deinde palatum, totumq; os occupant: tum ad unã, faucisq; descendunt. quibus obsessis non facile fit, ut puer convalescat. ac miserius etiam est: si lactans adhuc infans est: quo minus imperari remedium aliquod potest: sed in primis nutrix cogenda est exerceri ambulationibus, hisq; operibus, quæ superiores partes movet: mittenda in balneum, iubendaq; ibi calida aqua mammas perfundere: tum alenda cibis lenibus, & his qui facile non corrumpuntur. Potiones, si febricitat puer, aquæ: si sine febre est: vini diluti. Ac si alius nutriti substitit: ducenda est. Si pituita eius in os coit, vomere debet. Tum ipsa ulcera puni-genda sunt melle, cui rhus: quem syriacum vocant, aut amarae nuxes adiectæ sunt, vel mixtis inter se rosæ folijs aridis, pineis nucleis, mentæ collisulo, melle: vel eo medicamento, quod ex moris fit: quorum suavis eodem modo quo punici mali ad mellis crassitudinem coquitur: eademq; ratione ei crocum, myrrha, alumen, vinum, mel miscetur: Neq; quicquam dandum, ad quod humor euocari possit. Si uero iam firmior puer est: gargarizare debet his ferè, quæ supra comprehensa sunt. at si lenia medicamenta in eo parum proficiunt: adhibenda sunt ea, quæ adurẽdo crustis ulceribus induant: quale est scissile, alumen, vel chalatis, vel atramentum sutorium: prodest etiam fames & abstinentia quanta maxime imperari potest. Cibus debet esse lenis. Ad purganda tamen ulcera interdum caseus ex melle recte datur.

De gingivarum ulceribus. Cap. XII.

Inguæ quoq; ulcera non alijs medicamentis egent, quàm
 3 quæ prima parte superioris capitis exposita sunt: sed quæ
 in latere eius nascuntur: diutissime durant. Videndumq; est
 num contra dens aliquis acucior sit, qui sanescere sæpe ulcus eo loco
 non sinit: ideoq; limandus est. solent etiam interdum iuxta dentes
 in gingivis tubercula quædam oriri dolentia, τρυπόδοντιδα græci

LIBER

appellant. hæc initio leniter sale contrito perfricare oportet, aut in-
ter se mixtis sale fossili, combusto cupresso, nepeta, deinde eluere os
cremore lenticulæ, et inter hæc hiare: donec pituita satis profluat.
In maiore uero inflammatione iisdem medicamentis utendum est: quæ
ad ulcera oris supra posita sunt, et mollis linamenti paulum inuol-
uendum aliqua compositione ex his, quas ἀρόνπας uocari dixi, demit-
tendumq; id inter dentem, et ginguam: quod si durior erit, et id
prohibebit, extrinsecus admonendus erit spongiæ uapor calidus, im-
ponendumq; ceratū. Si suppuratio se ostendet: diutius eo uapore utē-
dum erit, et continuandum ore calidum mulsum, in quo ficus decocta
sit: itemq; subcrudum incidendum, ne si diutius ibi pus permanse-
rit: os lædat. quod si maior is tumor est, commodius totus exaditur,
sic, ut ex utraq; parte dens liberetur. Pure exempto, si leuis plaga
est, satis est ore calidam aquam continere, et extrinsecus fouere eo-
dem uapore: si maior est, lenticulæ cremore: uti hisdem medicamen-
tis, quibus cetera ulcera oris curantur: alia quæq; ulcera in ginguis
plerunq; oriuntur: quibus eadem quæ in reliquo ore succurrunt.
maxime tamen mandere ligustrum oportet, suatumq; cum ore conti-
nere. Fit etiam interdum, ut ex ginguæ ulcere, siue παρὰὀρτις fuit,
siue non fuit, diutius pus feratur: quod aut dēte corrupto, aut fracto,
uel aliter uiciato osse, maximeq; id per fistulam uenire cōsuevit. ubi
inadit, locus aperiendus, dens eximendus, testa ossis, si qua exassit re-
cidenda est: si quid uiciosū est, radendum. post quæ quid fieri debeat,
supra in aliorum ulcerum curatione comprehensum est: si uero à dē-
tibus ginguæ recedunt, eadem ἀρόνπαι succurrunt. Vtile est etiam
pira, aut mala non permatura mandere, et ore eum humorem con-
tinere. Idemq; præstare non acre acetum in ore retentum potest.

De uua morbo et curatione.

Cap. XIII.

Ve uehemens inflammatio terrere quoq; debet: utiq; in hac
et abstinentia necessaria est, et sanguis recte mittatur: et si
id aliquares prohibet, alius utiliter ducitur, capuiq; super
hæc uelandum, et sublimius habendum est: tum aqua gargarizan-
dum, in qua simul rubus, et lenticula decocta sit. Illinenda autem
ipsa uua uel omphacio, uel galla, uel alumine scissili sic, ut cuilibet
eorum mel adiciatur. Est etia medicamentum huic aptum, quod An-
dronium appellatur. constat ex iis: alumine scissili: squama aeris ru-
bri: atramento sutorio, galla, myrrha, mysi: quæ p se contrita, mixtaq;
rursus paulatim adiecto uino austero teruntur, donec is nullis cryssa

tudo sit. ubi horum aliquo illita una est: chelidonie quoque succo per cochlear illita una maxime prodest. Ferè multa pituita decurrit, cumque ea quieuit, ex uino calido gargarizandum: quod si minor in ea inflammatio: lasere terere: eiusque adijcere frigidam aquam satis est, eamque aquam cochleario exceptam ipsi unæ subijcere, ac mediocriter eam tumentem aqua quoque frigida eodem modo subiecta reprimat. Ex eadem autem aqua gargarizandum quoque est, quæ uel cum lasere, uel sine eo hac curatione unæ subiecta est.

De cancro oris. Cap. XV.

Iquando autem ulcera oris cancer inuasit, primum considerandum est, num malus corporis habitus sit: eiusque occurrendum. deinde ipsa ulcera curanda. quod si in summa parte id uicium est: satis proficit arvensis humido ulcери arida inpersa, sicciore, cum exigua parte mellis illita: si paulo altius: chartæ combustæ partes duæ, auripigmenti pars una: si penitus malum descendit: chartæ combustæ partes tres, auripigmenti, pars quarta, aut pares portiones salis fricti & iridis frictæ: aut item pares portiones chalcitidis, calas, auripigmenti. Necessarium autem est linamentum in rosa tingere: & super adurentia medicamenta imponere, ne uicinum, et sanum locum lædant, quidam etiam in acris aceti heminam frictum salem coniungunt, donec tabescere desinat: deinde id acetum coquant, donec exsiccetur: cumque salem contritum inspergunt. quotiens autem medicamentum iniicitur, & ante, & post: os diluendum est uel cremore lentisculæ, uel aqua: in qua aut erui, aut oleæ, aut uerbena decoctæ sint sic, ut quilibet eorum paulum mellis misceatur. acetum quoque ex scylla retentum ore, satis aduersus hæc ulcera proficit: ex aceto cocto salis, sicut supra demonstratum est, rursus maximum acetum: sed & diu continere utrunlibet, & id bis, aut ter die facere, prout uehemens malum est, necessarium est. quod si puer est, cui id inadit: specillum lana inuolutum in medicamentum demittendum est, & super ulcus tenendum, ne per imprudentiam adurentia deuoret. Et si dolor in gingiuis est, mouenturque aliqui dentes: refici eos oportet: nam curationes uehementer impediunt. si nihil medicamenta proficiunt: ulcera erunt adurenda: quod tamen in labris ideo non est necessarium: quoniam excidere commodius est. et id quidem æque adustum, atque exasum sine ea curatione, quæ corpori manu adhibetur: impleri non potest. Gingivarum uero ossa, quæ hebetia sunt: in perpetuum uestione nudantur. neque enim postea caro increscit. Imponenda tamen adustus lentiscula est, donec sanitatem, qualis esse potest, recipiant.

(cum cancer oris)

auripigmenti
chartæ combustæ
joh. Targa de
301

LIBER

De parotibus, quæ sub auribus oriuntur. Cap. XVI.

h Aec in capite ferè medicamentis egent. sub ipsis uero auribus oriri parotides solent, modo in secunda ualitudine ibi inflammatione orta, modo post longas febres, illuc impetus morbi conuerso. Id abscessus genus est: itaq; nullam nouam curationem desiderat: animaduersionem tantummodo hanc habet necessariam: quia si sine morbo id intumuit, primum reprimendum experimentum est: si ex aduersa ualitudine illud inimicum est, maturariq; & q̄ primum aperiri commodius est.

De umbilici prominentis curatione. Cap. XVII.

a D umbilicos uero prominentes, ne manu, ferroq; utendum sit: ante tentandum est, ut abstineat: alius his ducatur, imponatur super umbilicum id, quod ex his constat. Cicutæ, et fuliginis: singulorum. P. XI. cerussæ elotæ. P. XIII. plumbi eloti. P. X. VIII. ovis duobus: quibus etiam solani succus adiçatur. Hoc dilutius impositum esse oportet, & interim conuiescere hominem: cibo modico uti sic, ut uitentur omnia instantia.

De obscenarum partium uicijs, & curationibus. Cap. XVIII.

p Roxima sunt ea, quæ ad partes obscenas pertinent, quarum apud græcos uocalula & tolerabilius se habent, & acceptæ iam usu sunt cum omni ferè medicorum uolumine atq; sermone iactentur, apud nos fœdiora uerba ne consuetudine quidem aliqua uerecundius loquentium accommodata sunt: ut difficilis hæc exemplatio sit simul & pudorem & artis præcepta seruantibus. neq; tamen ea res à scribendo detertere me debuit. Primum ut omnia, quæ salutaria accipi, comprehenderem: dein quia in uulgis eorum curatione etiã præcipue cognoscenda est, quæ inuitissimus quisq; alteri ostendit.

De colicis morbis, & curationibus.

i Citur si ex inflammatione coles intumuit: reduciq; summa cutis, aut rursus induci non potest, multa calida aqua fouendus locus est. Vbi uero glans contracta est, oriculario quoq; elystere inter eam cutemq; aqua calida inferenda est. Si mollita sic & extenuata cutis ducenti paruit, expeditior reliqua curatione est: si tumor

humor uicit: imponenda est uel lenticula, uel marrubium, uel olea folia ex uino cocta sic, ut cuilibet eorum, dum teritur, mellis paulum adijciatur: sursumq; coles ad uentrem deligandus est. quod in omni curatione eius necessarium est, isq; homo continere se debet, & abstinere à cibo, & potione aquae tantum. si uindicta. à postero die rursus adhibendum hisdem rationibus aquae fomentum est, & cum ui quoq; experiundum, an cutis sequatur: eaq; si non parebit, leuiter summa scalpello concidenda erit: nam cum sanies profluxerit: extenuabitur his locus, & facilius cutis ducetur. Siue autem hoc modo uicta erit, siue nunquam repugnauerit, ulcera uel in cutis ulteriore parte, uel in glande, ultra uel eam in cole reperientur, quae necesse est, aut pura siccata uel sint, aut humida & purulenta. si siccata sunt, primum aqua calida fouenda sunt: deinde imponendum lycium ex uino est, aut amurca cocta cum eodem, aut cum rosa buriyum: si leuis is humor est, uino eluenda sunt: tum buriyi & rosae mollis paulum, & resinae teribimbinæ pars quarta adijcienda est, eoq; utendum: aut si pus ex his profluit, ante omnia elui mulso calido debet. tum imponi piperis. P. XI. myrrhae. P. XII. croci, mysi cocti, singulorum. P. XII. quae ex uino austero coquuntur, donec mellis crassitudinem habeant. Eadem autem compositio tonsillis, uiae madentiori, nariumq; ulceribus ac omni modata est. Aliud ad eam, piperis. P. XI. myrrhae. P. XI. croci. P. XII. mysi cocti. P. XI. aeris combusti. P. XII. quae primum ex uino austero conteruntur, deinde ubi inaruerunt: iterum teruntur ex passi tribus cyathis, & incoquantur: donec uisci crassitudinem habeant. Aerugo quoq; cum cocto melle, & ea quae ad oris ulcera supra comprehensa sunt, curant: aut Erasistrati compositio, aut Cratonis recte super purulenta naturalia imponitur. folia quoq; olea ex nouem cyathis uini coquuntur. his adijciatur aluminis scissilis. P. XIII. lycij. P. XVIII. mellis sesquicyathus: ac si plus purus est, id medicamentum ex melle: si minus, ex uino diluitur. Illud perpetuum est: post curationem, dum inflammatio manet, quale supra positum est, cataplasma supra dare: & quotidie ulcera eadem ratione curare: quod si pus & multum et cum malo odore coepit profluere, elui cremore lenticulae debet sic, ut ei mellis paulum adijciatur, aut olea, aut lentisci folia, uel marrubium decoquendum est. eoq; humore eodem modo cum melle utendum, imponendaq; eadem, aut etiam omphacum cum melle, aut id quod ex aerugine & melle ad aures fit, aut compositio Andronis, aut ἀνδρονος sic, ut ei paulum mellis adijciatur. quidam ulcera omnia, de quibus adhuc dictum est, lycio ex uino curant. Si uero ulcus latius atq; altius serpit, eodem modo elui debet: imponi uero, aut aerugo, aut omphacum

LIBER

cum melle, aut Andronis compositio, aut marrubij, myrrhæ, aut croci, aluminis scissilis cocti, rosæ foliorum aridorum, gallæ, singulorum. P. XI. minij sinopici. P. XII. quæ per se singula primum teruntur, deinde iuncta iterum melle adiecto, donec liquidi cerati crassitudine habeant: tum in æneo vase leniter coquantur, ne superfluant: cum iā guttæ indurescunt, vas ab igne remouetur, idq; medicamentum tum, pro ut opus est, aut ex melle, aut ex uino liquatur. Idem autem per se etiā ad fistulas utile est. Solet etiam interdum ad nervos ulcus descendere: profluitq; pituita multa, sanies tenuis maliq; odoris, non cocta, aut aquæ similis, in qua caro recens lota est. doloresq; is locus, et punctiones habet: id genus quamuis inter purulentæ est, tamen lenibus medicamentis curandum est: quale est emplastrum tetrapharmacum ex rosa liquatum sic, ut thuris quoq; paulum ei misceatur: aut id quod ex butyro, rosa, resina, melle fit. supra uero à me positum est. præcipueq; id ulcus multa calida aqua fouendum est, uelandumq; neq; frigori committendum. Interdum autem per ipsa ulcera coles sub cute exesus sic, ut glans excidat. sub quo casu cutis ipsa circuncidenda est. perpetuumq; est, quotiens glans, aut ex cole aliquid, uel excidit, uel absconditur: hanc non esse seruandam, ne confidat, ulceriq; agglutinetur, ac neq; reduci possit postea, et fortasse fistulam quoq; urinæ claudat. Tubercula etiam, quæ quædam græci uocant circa glandem oritur, quæ uel medicamentis, uel ferro aduruntur, et cum crustæ exciderunt, squama aeris inspergitur, ne quid ibi rursus increseat.

De cancro, qui in cole nascitur, curatione.

h Aec circa cancerum sunt, qui cum in reliquis partibus, tum in his quoq; uel præcipue ulcera infestat. incipit à nigritie, quæ si cutem occupauit: protinus specillū subiciendum, eaq; incidenda est: deinde ora uulsellæ prehendendæ: tum quicquid corruptum est: excidendum sic, ut ex integro quoq; paulum demat, idq; adurendum. quotiens quid ustum est, id quoq; sequitur, ut imponenda lentacula sit: deinde ubi crustæ exciderunt, ulcera sic, ut alia curentur. at si cancer ipsum colem occupauit: inspergendæ aliqua sunt ex adurentibus, maximeq; id quod ex calce, chalcitide, auripigmento componitur. si medicamenta uincuntur, hic quoq; scilpello quicquid corruptum est sic, ut aliquid etiā integri trahat, præcidi debet. illud quoq; æq; perpetuum est, ex ciso cancro uulnus esse adurendum: sed siue ex medicamentis, siue ex ferro crustæ ceciderunt, magnum periculum est, ne his decedentibus ex cole profusio sanguinis insequatur: ergo lō=gi quiete et immobili penè corpore opus est, donec ex ipso crustæ

puræ leniter resoluantur. at si uel uolens aliquis, uel imprudens, dum ingreditur immature, crustas diduxit, & fluit sanguis, frigida aqua adhibenda est: si hæc parum ualet, decurrendum est ad medicamenta, quæ sanguinem supprimunt. si ne hæc quidem succurrunt, aduri diligenter & timide debet, neq; ullo postea motu dandus eidem periculo locus est.

De phagedæne in cole nascentis curatione.

Omniunquam etiam id genus ibi cancri, quod *phagedæna* à græcis nominatur, oriri solet, in quo minime differendum: sed protinus huiusdem medicamenti occurrendum est, & si parum ualent: ferro adurendum. quædam etiam nigrities est, quæ nõ sentitur & serpit, ac si sustinuerimus usq; ad uescicam tendit: neq; succurri postea potest. si id in summa glande circa fistulæ urinae est, prius in ea tenue specillum demittendum est, ne claudatur: deinde id ferro adurendum: si uero alte penetrauit, quicquid occupatum est, præcidendum est. cæterum eadem, quæ in alijs canceris, facienda sunt.

De carbunculo qui in cole nascitur.

Calescit etiam in cole interdum aliquid: idq; omni penè sensu caret: quod ipsum quoq; excidi debet. Carbunculus autem ibi natus, ut primum apparet, oriculario clystere eluendus est: deinde ipse quoq; medicamenti urendus, maximeq; chalcitide cum melle, aut ærugine cum cocto melle, aut ouillo stercore & contrito cum eodem melle: ubi is excidit, liquidis medicamentis utendum est, quæ ad ora ulceris componuntur.

De testiculorum morbis, & eorum curatione.

In testiculis uero si qua inflammatio sine ictu orta est: sanguis ex talo mittendus est: à cibo abstinendum: imponendum ex faba farina ex mulso cocta cum cumino contrito ex melle cocto, aut contritum cuminum cum cerato ex rosa facto: aut lini semen frictum, contritum, & in mulso coctum, aut tritici farina ex mulsa cocta cum cypresso, aut lilij radix contrita, aut si ijdē induruerunt, imponi debet lini uel fœni græci semen ex mulso coctum, aut ex cyprino ceratum, aut similia ex uino contrita, cui paulū croci sit adiectum. si uetustior iā durities est, maxime proficiat cucumeris agrestis radix ex mulso cocta, dein contrita. si ex ictu tumens, sanguinē mitti necessariū est, magisq; si etiā liuent. Imponendū uero utriuslibet ex his quæ cum cumino componuntur, supraq; proposita sunt.

LIBER

aut ea compositio, quæ habet nitti cocti. P. XI. resinæ pineæ, gummi, singulorum. P. XII. uisæ taminæ sine seminibus. P. XIII. mellis quantum sat sit ad ea coquenda: quod si ex ictu testiculis aliquid desit, ferè pus quoque increfcit, neque aliter succurri potest, quam si inciso scroto, et pus emissum, et ipse testiculus excisus est.

De rhagadijs, et Condylomate, et hæmorrhoidibus, alijsque aut morbis, et curationibus eorum, et primo de rhagadijs.

Nus quoque multa, tædijque plena mala recipit: nec in se multum abhorrentes curationes habet: at primum in eo saepe et quidem pluribus locis cutis exciditur. *παράδρα* græci vocant, id si recens est: quiescere homo debet et in aqua calida desidere. Columellina quoque onæ coquenda sunt, et ubi induruerunt, purganda: deinde alterum iacere in aqua bene calida debet, altero calido foveri locus sic, ut invicem utroque aliquis utatur. Tum *tetrāpharma* cum, aut *πυρῶδες* rosa diluendum est, aut hyssopum recens miscendum cum cerato liquido ex rosa facto: aut eidem cerato liquido plumbum elotum adiungendum: aut resinæ terebinthinæ myrrha: aut fumæ argenti vetus oleum: et quolibet ex his id perungendum: si quicquid læsum est, extra est, neque intus reconditum, eodem medicamento tinctum linamentum super dandum est: et quicquid ante adhibuimus cerato contegendum. In hoc autem casu neque acris albis utendum, neque asperis, nec alium comprimentibus: ne aridum quidem quicquid satis utile est: nisi admodum paulum: liquida, lenia, pingua, glutinosa meliora sunt: vino leni uti nihil prohibet.

De condylomate.

Condyloma autem est tuberculum: quod ex quadam inflammatione nasci solet: id ubi ortum est, quod ad quietem, cibos, potionesque pertinet: eadem servari debent, quæ proxime scripta sunt: hujusdem etiam onis recte tuberculum id fovetur. sed desidere ante homo in aqua debet, in qua verbenæ decoctæ sunt ex reprimantibus: tum recte imponitur, et lenticula cum exigua mellis parte, et fertula campana ex vino cocta, et rubi folia contrita cum cerato ex rosa facto: et cum eodem cerato contritum, vel cotoneum malum, vel malicorij ex vino cocti pars interior, et chalatis cocta, atque contrita: deinde hyssopo, ac rosa excepta: et ex ea compositione, quæ habet thuris. P. XI. aluminis scissilis. P. XII. arussæ. P. XIII. fumæ argenti. P. XV. quibus dum teruntur: invicem rosa et vinum instillantur. unculum autem ei loco linteolum, aut panniculus quadratus est: qui ad

qui ad duo capita duas ansas, ab altera uero parte totidem fascias habet, cumq; subiectus est, ansis ad uentrem datis à posteriore parte in eas adductæ fasciæ coniunguntur, atq; ubi artatæ sunt: dexteriori sinistra, sinisteriori dextra procedit, circumdatæq; circa alium inter se nouissime nodo deligantur. sed si uetus condyloma iam induruit, neq; sub his curationibus desidit, aduri medicamento potest, quod ex his constat: æruginis. P. XII. myrrhæ. P. XIII. gummi. P. XVIII. thuris. P. XXII. stibis: papaueris lacrymæ, acaciæ, singulorū. P. XXVI. quo medicamento quidam etiam ulcera, de quibus proxime dixi: renouant. si hoc parum in condylomate proficit: adhiberi possunt etiam uehementius adurentia. ubi consumptus est tumor: ad medicamentum lenius transeundum est.

De hæmorrhoidibus.

Eritum autem uitium est, ora uenarum tanquam ex capitis
 t. lis quibusdam surgentia: quæ sæpe sanguinem fundunt, ac
 μωρροΐδαι græci uocant. idq; etiam in ore uulvæ foemina-
 rum incidere consuevit. atq; in quibusdam parum tuto suppressitur,
 qui sanguinis profluvio imbecilliores non fiunt. habet enim purgatio-
 nem hanc non morbum: ideoq; curati quidā cum sanguinis exitum
 non haberent: inclinata in præcordia ac uiscera materia subitis, et
 grauissimis morbis correpti sunt. si cui uero id nocet, is desidere in
 aqua ex uerbis debet: imponere maxime malicorium cum aridis
 rosæ folijs contritum: aut ex his aliqua, quæ sanguinem suppressunt.
 Solet autem oriri inflammatio, maxime ubi dura alius eum locum
 læsit. tum in aqua dulci desidendum est, et id fouendum ovis: im-
 pendi uitelli cum rosæ folijs ex passo subactis: idq; si intus est, digito
 illinendum, si extra super illitum panniculum imponendum est. ea
 quoq; medicamenta, quæ recentibus scissuris posita sunt, hic idonea
 sunt. Cibis uero in hoc casu hisdem quibus in prioribus utendum est:
 si ista parum iuuat, solent imposita medicamenta adurentia, ea capi-
 tula absumere. ac si iam uetustiora sunt, sub auctore Dionysio inspar-
 genda sandaracæ est, deinde imponendum, quod ex his constat: squa-
 mæ eris, auripigmenti: singulorum. P. XV. saxi calcis. P. XVIII. poste-
 ro die acu compungendum. adustus capitulis fit cicatrix: quæ sangui-
 nem fundi prohibet. sed quotiens is suppressus est, ne quid periculi
 afferat, multa exercitatione digerenda materia est. prætereaq; et ui-
 ris et foeminis quibus menstrua non proueniunt, interdum ex bra-
 chio sanguis mittendus est.

Aurelij Cor.

o iij

plapsus am
*

LIBER

Si anus, uel os uulue procidit, qua curatione utendum sit.

T si anus ipse uel os uulue procidit, (nā id quoq; interdum
a fit) considerari debet purum ne id sit: quod prouolutū est,
an humore mucoso circumdatum. si purum est, in aqua de-
sidere homo debet, aut salsa, aut cum uerbena uel malicorio incocta:
si humidum, uino austero subluendum est, illinendumq; fœc uini com-
busta. ubi utrolibet modo curatum est, intus reponendum est, impone-
daq; plantago contrita, uel folia salicis in aceto cocta, tum linteolum
et super lana æque deliganda cruribus inter se deuinctis.

De ulcere fungo simili in ano.

Vngo quoq; simile ulcus in eadem sede nasci solet. id si hy-
f ems est, egelida, si aliud tempus, frigida aqua fouendū est.
deinde squama æris inspergenda, supraq; ceratū ex myr-
teo factū. cui paulū squamæ, fuliginis, calcis, sit adiectum. si hac rōne
nō tollitur: uel medicamentis uehementioribus, uel ferro adurendū est.

De digitorum ulceribus. Cap. XIX.

Igtorum autem uetera ulcera commodissime curantur, aut
d lycio, aut myrrha cocta: cū utrilibet uinum adiectum est. in
hisdem recedere ab ungue caruncula cum magno dolore cō-
suevit. Mephorior græci appellant. oportet alumen melinum rotundum
in aqua liquare donec mellis crassitudinem habeat: tum quantum
eius aridi sit, tantundē mellis infundere, et radicula miscere, do-
nec similis croco colore fiat, eoq; illinere. quidam ad eundem usum
decoquere simul malua solet: cū paria pōdera aluminis aridi et mel-
lis misuerint. si hac ratione ea nō exaderunt: excidēda sunt: deinde
digni fouēdi aqua ex uerbena, imponendumq; sup medicamentum
ita factum. chalcitis, malicorii, squama æris exapiuntur fœc pingui
leniter cocto ex melle. aut chartæ combustæ, auripigmenti, sulphuris
ignē nō experti par modus cerato miscetur ex myrteo facto. aut æris
ginis rasæ. P. XI. squamæ. P. XII. mellis cyatho coguntur. aut pares
portiones miscentur: saxi calcis, chalcitidis, auripigmenti. quicquid ho-
rum impositum est, tegendum linteolo aqua madefacto est: tertio die
digitus resoluendus est. si quid aridi est, iterum excidendum, similisq;
adhibenda curatio est. si non uincitur, purgandus scalpello, tenuibusq;
ferramentis adurendus est: et sicut reliqua uisita curandus est. at ubi
scabri unguis sunt, circum aperiri debent: qua corpus contingunt. tūc
super eos ex hac cōpositione æque imponi sandaracæ, sulphuris, sin-
gulorum. P. XII. nitri, auripigmenti, singulorum. P. XIII. resinae liq-
dæ. P. XVIII. tertioq; id die resoluendū est. sub quo medicamento ui-
ciosi unguis cadunt, et in eorum locum meliores renascuntur.

De chirurgia, & qui in ea claruerint, & qualis esse chirurgus debeat, & quid in hoc libro describanur.

Chirurgia

Ertiam esse medicinae partē: quae manu curet, & vulgo notum, & a me propositum est. ea non quidem medicamenta atq; uictus rationē omittit, sed manu tamen plurimum praestat. estq; eius effectus inter omnes medicinae partes euidentissimus. siquidem in morbis cum multum fortuna conferat: eademq; saepe salu-

taria, saepe uana sint: potest dubitari secunda ualeitudo medicinae, an corporis beneficio contigerit: in his quoq; in quibus medicamentis maxime utimur: quamuis profectus euidentior est: tamen sanitatem & per haec frustra quaeri, & sine his reddi saepe manifestum est. sicut in oculis quoque deprehendi potest: qui a medicis diu uexati sine his interdum sanescunt. at in ea parte, quae manu curat, euident est, omnem profectum, ut aliquid ab alijs adiungetur, hinc tamen plurimum trahere. Haec autem pars, cum sit uetustissima, magis tamen ab illo parente omnis medicinae Hippocrate, quam a prioribus exulta est: deinde posteaquam diducta ab alijs habere profissores suos coepit, in aegypto quoque increuit Philoxeno maxime auctore, qui pluribus uoluminibus hanc partem diligentissime comprehendit. Gorgias quoque, & Sostratus, & Hieron, & Apollonij duo, & Hammonius alexandrinus: multiq; alij celebres uiri singuli quaedam repperierunt. ac Romae quoque non mediocres profissores, maximeq; nuper Tryphon pater, & Euelpistus: & ut ex scriptis eius intelligi potest, horum eruditissimus Megetes quibusdam in melius mutatis aliquantum ei disciplinae adiecerunt. Esse autem chirurgus debet adolescens, aut certe adolescentiae propior, manu strenua, stabili, nec unquam intremescente, eaq; non minus sinistra, quam dextra promptus: acie oculorum acris: claraq; animo intrepidus, immisericors sic, ut sanari uelit eum quem accipit, non ut clamore eius motus, uel magis quam res desiderat: properet, uel minus quam necesse est, secet: sed perinde faciat omnia, ac si nullus ex uagitibus alterius affectus oriatur. Potest autem requiri: quid huic parti proprie uendicandum sit: quia uulnere quoq; ulcerumq; multorum curationes, quas alibi executus sum: chirurgi sibi uendicant. ego eundem quidem hominem posse omnia ista praestare concipio. atque ubi se diuise-

LIBER

runt, cum laudo, qui quàm plurimū percipit. Ipse autē huic parti, ea reliquit: in quibus unius facit medicus: non accipit: & in quibus unius, ulceribus uel plus perfici manu, quàm medicamento credo. tū quicquid ad ossa pertinet: quæ deinceps exequi aggrediar, dilatisq; in aliud nolumen ossibus, in hoc cætera explicabo: præpositisq; his, quæ in qualibet parte corporis fiunt, ad ea, quæ proprias sedes habent: transibo.

De luxatis. Cap. I.

Iuxata igitur in quacumq; parte corporis sunt, quàm primum sic curari debent, ut quæ dolor est, eâ scalpello cutis crebro incidatur: detergaturq; eodem aduerso profluens sanguis. quod si paulo tardius subuenitur, iamq; etiam rubor est, quæ rubet corpus, si tumor quoq; accessit, quacumq; is est, id optimum auxilium est. tum super danda reprimentia sunt, maximeq; lana succida ex aceto, & olco. quod si leuior is æsus est: possunt etiam sine scalpello imposita eadem mederi. Et si nihil aliud est, cinis quoq; maxime ex sarmentis. si is non est, quilibet alius ex aceto uel etiā ex aqua coactus.

De his, quæ per se intumescunt, quomodo excidenda, & curanda sunt. Cap. II.

Erum hoc quidem promptum est. in his autem negotium maius est, quæ per se uicio intus orto intumescunt, & ad suppurationem spectant. ea omnia genera abscessum esse aliàs proposui, medicamentaq; eis idonea executus sum. nunc superest ut dicam in hisdem, quæ manu fieri debeant. ergo priusquam indurescant: cutem incidere, & cucurbitulam accommodare oportet: quæ quicquid illuc malæ, corruptæq; materiæ coijt: extrahat, idq; iterū, tertioq; recte fit, donec omne inditum inflammationis excidat. neq; tamen fas non est nihil cucurbitula agere. interdum enim sed raro quicquid abscedit, uelamento suo includitur. id antiqui tunicam nominabant. Meges quia tunica omnis nervosa est: dicit non nasci sub eo uicio nervum: quo atro consumeretur, sed subiecto iam uetustiore pure callum circumdari. quod ad curationis rationem nullo loco pertinet, quia quicquid dixi, si tunica est, idem, si callus est, fieri debet. neq; ulla res prohibet, etiam si callus est: tamen quia cingit: tunicam nominari. tum pure quoq; maturior hæc interdum esse cōsuevit. ideoq; quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam non potest. sed facile id intelligitur, ubi nihil admota illa mutauit. ergo siue id inci-

dit, siue iam durities est: in hac auxilij nihil est. & ut alias scripse
uel auertenda concurrens eò materia, uel digerenda, uel ad maturi-
tatem perducenda est. si priora contigerunt, nihil præter ea necessa-
rium est. si pus maturuit, in alis quidem, & in inguinibus raro secū-
dum est. item ubicunq; mediocris abscessus est. item quotiens in sum-
ma cute, uel etiam carne nitium est: nisi festinare curantis imbecilli-
tas cogit. satisq; est cataplasmata efficere, ut per se pus aperiatur:
nam ferè sine cicatrice potest esse is locus: qui expertus ferrum non
est, si autem altius malum est, considerari debet nervosus ne is lo-
cus sit: an non sit. nam si sine nervus est, cunctis ferramento ape-
riri debet. cuius hæc gratia est, quod exigua plaga diutius ad pus euo-
candū patet: paruaq; postea cicatrix fit. at si nervi iuxta sunt: ignis
alienum est: ne uel distendantur hi, uel membrum debilitent. necessa-
ria uero opera scalpelli est. sed cætera etiam subcruda aperiri pos-
sunt. inter nervos uero ultima expectanda maturitas est: quæ cutem
extenuet: eiq; pus iungat: quo propius reperiatur. itemq; alia rectam
plagam desiderant in carne. quia ferè uehementer cutem extenuat.
tota ea super pus excidenda est. Semper autem, ubi scalpellus admoue-
tur, id agendum est, ut quàm minimæ, & quàm paucissimæ plagæ
sint. cum eo tamen, ut necessitati succurramus, & in modo & in nu-
mero. nam maiores sinus latius, interdum etiam duabus aut pluri-
bus lineis incidendi sunt. dandaq; opera ut inuis sinus exitum ha-
beat, ne quis humor intus subsidat, qui proxima & adhuc sana ro-
dendo sinuet. est etiam in rerum natura, ut cutis latius excidenda sit:
nam ubi post longos morbos totus corporis habitus uitiatus est, lateq;
se sinus diffudit, & in eo pars cutis pallet: scire licet eam iam emor-
tuam esse, & inuilem futuram. ideoq; excidere commodius est. ma-
xime si circa articulos maiores id euenit, cubantemq; ægrum flu-
ens aluus exhaurit: neq; per alimenta quicquam corpori accedit. sed
excidi ita debet, ut plagi ad similitudinem myrtei folij fiat, quo fa-
cilis sanescat. idq; perpetuum est. ubicunq; medicus ex quacunque
causa cutem excidit, pure effuso in alis, uel inguinibus, linamento opus
non est. spongia ex uino imponenda est. in cæteris partibus si æque
ea linamenta supernacua sunt: purgationis causa paulum mellis in-
fundendum, dein glutinantia super danda. si illa necessaria sunt:
super ea quoq; similiter dari spongia eodem modo ex uino expressa
debet. quando autem linamentis opus sit: quando nō sit: alias dictum
est. cætera eadem incisa suppuratione facienda sunt. quæ ubi per me-
dicamenta rupta est, facienda esse proposui.

LIBER

De bonis, malis'ue signis exluceratorum.

Cap. III.

Rotinus autem quantum curatio efficiat, quantumq; aut spe
 p rari, aut timeri debeat: ex quibusdam signis intelligi po-
 test: fereq; hisdem, quæ in vulneribus exposita sunt. nam
 bona signa sunt: somnum capere: facile spirare: siti non confici: cibum
 non fastidire, si febricula fuit, ea uacare: itemq; habere pus albu, lucu,
 nõ fædi odoris. Mala sunt, uigilia, spiritus grauitas: sitis: cibi fastidiu:
 febris: pus nigrum, aut feculentum & fædi odoris. Item procedente
 curatione eruptio sanguinis, aut si antequam sinus carne impleatur,
 oræ carnosæ fiunt. illa quoq; ipsa carne hebetæ nec firma deficere ta-
 men animam uel ipsa curatione uel postea: pessimum omnium est. quin
 etiam morbus ipse siue subito solutus est: dein suppuratio exorta est,
 siue effuso pure permanet non iniuste terret. Estq; inter causas timo-
 ris: si sensus in uulnere rodentiu non est. sed ut hæc ipsa fortuna huc
 illuc'ue discernit: sic medici partium est: eniti ad reperiendam sanita-
 tem. ergo quotiens ulcus resiliuerit: eluere id: si reprimendus humor ui-
 debitur: uino ex aqua plumiati mixto, uel aqua in qua lenticiula
 cocta sit, debebit. si purgandum erit, mulso, rursusq; imponere eadẽ.
 ubi iam repressus uidebitur humor ulcusq; purum erit, produci car-
 nem conueniet et foueri uulnus pari portione uini ac mellis. superq;
 imponi spongia ex uino & rosa tincta. per quæ cum atro produca-
 tur: plus tamen, ut alijs quoq; dixi, uictus ratio eò confert. id est solu-
 tis iam febribus, & cibi cupiditate reddita: balneum rayum. cotidia-
 na, sed lenis gestatio, cibi, potionesq; corpori reficiendo. apteq; omnia
 quæ per medicamenta suppuratione quoq; rupta sequuntur sed quia
 magno malo uix sine ferro mueri licet: in huc locu reservata sunt.

De fistulis. Cap. IIII.

a Duersus fistulas quoq; si altius penetrant ut ad ultimas de-
 mitti collirium non possit, si tortuose sunt, si multiplices,
 maius in manu quam in medicamentis præsidium est: mi-
 nusq; operæ est: si sub cute transuersæ feruntur, quam si rectæ intus
 tendunt. igitur si sub cute transuersa fistula est: dimitti specillum de-
 bet, supraq; id ea incidi, si flexus reperiuntur, hi quoq; simul specil-
 lo & ferro persequendi sunt. idemq; faciendum, si plures se quasi ra-
 muli ostendunt. ubi ad fines fistulæ uentum est, excidendum ex toto
 callus est, superq; fibulæ dandæ: & medicamentum quo glutinetur:

at si recta subter tendit, ubi quo, maxime ferat, specillo exploratum est, excidi is sinus debet, dein fibula oris cutis injicienda est, et æque glutinantia medicamenta super danda sunt. aut si corruptius ulcus, quod interdum osse uitiatum fit, ubi id quoque curatum est: pus mouētia. solent autem inter costas fistulæ subter exire. quod ubi incidit, eo loco costa ab utraq; parte decidenda, et eximenda est, nequid intus corruptum relinquatur. solent, ubi costas transierunt, septum id, quod transuersum à superioribus uisceribus intestina discernit: uiolare. quod intelligi et ex loco, et ex magnitudine doloris potest: et quia nonnumquam spiritus eò, cum humore quasi bulla intus prorumpit, maximeque si hunc ore ille continuit. in eo medicamini locus nullus est. in cæteris uero quæ arca costas sanabilia sunt: pinguis medicamenta inimica sunt. ceteris, quæ ad uulnera accommodantur, uti licet. optime tamen siat linamenta, uel si purgandum aliquid uidetur, in nulle tincta imponuntur. uentri nullum os subest: sed ibi perniciosè admodum si fistulæ sunt, adeo ut Sostratus insanabiles esse crediderit. id nò ex toto ita se habere usus ostendit. et quidē quæ maxime mirum uideri potest: tutior fistula est contra iecur, et lienem, et uentriculum, quam contra intestina, non quo perniciosior res ibi sit, sed quo alteri periculo locum faciat. cuius experimento moti quidam auctores parum modum rei cognouerunt. nam uentre sepe etiam telo perforatur, pro lapsaque intestina conduntur, et oras uulneris suturæ comprehendunt. quod quemadmodum fiat mox indicabo. itaque etiam ubi tenuis fistula abdomen perfrangit: excidere eam licet. suturæque oras coniungere. si uero ea fistula intus patuit, excisa necesse est latius foramen relinquat, quod nisi magna ui, utique ab interiore parte sui non potest, qua quasi membrana quædam finit abdomen: quam *περιτόνειον* greci uocant. ergo ubi aliquis ingredi ac moueri cœpit: rumpitur illa sutura, atque intestina soluantur. quo fit ut pereundum homini sit. sed non omni modo res ea desperationem habet. ideoque tenuioribus fistulis adhibenda curatio est.

De ani fistulis.

Propriam etiamnum animaduersionem desiderant ea, quæ in ano sunt. in has demisso specillo ad ultimum eius caput p
incidi cutis debet: dein nouo foramine specillum educa lino sequente: quod in aliam eius partem ob id ipsum perforatum coniectum sit. ibi limum prehendendū, uinciendumque cum altero capite est, ut laxè autem, quæ super fistulam est, teneat. idque limum esse debet

LIBER

erudum & duplex, triplexue, sic tortum ut unitas facta sit. Interim autem licet negotia agere, ambulare, lauare, cibū capere perinde atq; sanissimo. tantummodo id līnum bis die saluo nodo ducendum est sic, ut subeat fistulam pars, quæ superior fuerit. neq; committendum est ut id līnum putrescat. sed tertio quoq; die nodus resoluendus est, et ad caput alterum, recens līnum alligandum est, eductoq; uetere, id in fistula cum simili nodo relinquendū. sic enim id paulatim cutem, quæ supra fistulam est: incidit, simulq; & id sanescit, quod à lino relicū est, & id quod ab eo mordetur: inciditur. hæc ratio curationis longa, sed sine dolore est. qui festinat, astringere cutem lino debet, quo celerius fecit, noctuq; penicillo tenuia quædam intus demittere, ut cutis hoc ipso extenuetur: quod extenditur: sed hæc dolorem mouent. adijciatur celeritati sicut tormento quoque: si et līnum, & id quod ex penicillo est, aliquo medicamento illinatur ex ijs, quibus callum exedi posui. poterit tamen fieri ut ad scalpelli curationem etiam illò loci ueniendum sit, si intus fistula fert, si multiplex est. igitur in hæc genera demisso specillo duabus lineis incidenda cutis est: ut media inter eas habundula tenuis admodum eijciatur, ne protinus ora coeant: sitq; locus aliquis linamentis: quæ quàm paucissima super iniicienda sunt, omniaq; eodem modo facienda, qui in abscessibus positus est. si uero ab uno ore plures sinus erunt: recta fistula scalpello erit incidenda, ab eo ceteræ, quæ iam patebunt lino excipiendæ. si intus aliqua procedet: quo ferrum tuto peruenire non poterit: collirium demittendum erit. cibus autem in omnibus eiusmodi casibus, siue manu, siue medicamentis agatur: dari debet humidus: potio liberalis, diuq; aqua ubi iam atro increfcit. tum demum & balneis raris utendum erit, & cibis corpus implentibus.

De telis è corpore extrahendis. Cap. V.

¶ Ela quoq; quæ illata corporibus intus hæserunt: magno negotio sæpe eijciuntur. suntq; quædam difficultates ex generibus eorum, quædam ex his sedibus in quas illa penetrarunt. omne autem telum extrahitur, aut ab ea parte, qua uenit, aut ab ea, in qua tetendit. illic uiam, qua redeat: ipsum sibi fecit. hic à scalpello accipit. nam contra mucronē atro inciditur. sed si non alte telū infedit, et in summa carne est, aut certe magnas uenas, et loca nervosa non transiit, nihil melius est: quàm qua uenit id euellere. si uero plus est p quod telo reuertendū quàm quod perrupendum est: iamq; uenas, nervosq; id transiit: commodius est aperire quod superest, eaq; extrahere. nam & propius petitur, et tutius euellitur, et in maiore

membro si medium mucro trāsīt, facilius sanescit, quod peruium est.
 quia utrinq; medicamento fouetur: sed si retro telum recipiēdum est:
 amplianda scalpello plaga est: quo facilius id sequatur: quoq; minor
 oriatur inflammatio, quæ maior fit: si ab illo ipso telo dum redit,
 corpus laniatur. Item si ex alia parte vulnus aperitur: laxius esse
 debet, quàm ut telo postea transeūte ampliētur. Summa autem utraq;
 parte ita habenda cura est, ne nervus, ne uena maior, ne arteria inci-
 datur. quorum ubi aliquid detectum est, excipiendum hamo retuso
 est, abducendūq; scalpello. Vbi autem satis incisum est, tulum eximē-
 dum est: tum quoq; eodem modo, & eadē cura habita, ne sub eo, qđ
 eximetur, aliquid eorum lædatur: quæ tuenda esse proposui. Hæc cō-
 munia sunt: propria quædam in singulis telorum generibus subiiciē-
 da sunt: quæ protinus subiiciam: nihil tam facile in corpore quàm sa-
 gitta conditur, eademq; altissime insedit. hæc autem eueniunt, et quia
 magna ui fertur illi, & quia ipsa in angusto est. sæpius itaq; ab al-
 tera parte, quàm ex qua uenit, recipiēda est: præcipueq; quia ferē
 spiculis cingitur, quæ magis laniant, si retro, q̄ si contra trahuntur:
 sed inde aperta uia caro diduci debet ferramento ad similitudinem
 facti græcæ litteræ 4. Deinde ubi apparuit: si mucro, si harundo in-
 heret propellenda est, donec ab altera parte apprehendi et extra-
 hi possit: si iam illa decidit, solumq; intus ferrum est, mucro uel digi-
 tis apprehendi, uel forfice, atq; ita educi debet: neq; alia ratio extra-
 hendi est, ubi ab ea parte qua uenit, euelli magis placuit: nam am-
 pliatio uulnere aut harundo, si inest, euellenda est, aut si ea non est,
 ferrum ipsum: quod si spicula apparuerunt, eaq; breuia & tenuia
 sunt: forfice ibi comminui debent, uacuumq; ab his telum educi, si ea
 maiora, ualentioraq; sunt, fissis scriptorijs calamus cōtegenda: ac ne-
 quid lacerent, sic euellenda sunt. & in sagittis quidem hæc observa-
 tio est. Latum uero telum si conditum est, ab altera parte eductio ex-
 pedit, ne ingenti uulnere, ipsi quoq; ingens uulnus adiiciamus. euellē-
 dum est ergo genere quodam ferramenti, quod diocleum græci gra-
 phiscum uocant: quoniam auctorem Dioclen habet: quem inter pri-
 scos, maximosq; medicos fuisse iam posui. Lamina uel ferrea, uel ænea
 etiam ab altero capite duos utrinq; deorsum conuersos uncas habet:
 ab altero duplicata alteribus, leuiterq; extrema in eam partem in-
 clinata, quæ sinuata est: insuper ibi etiam parte inclinata, quæ perfo-
 rata est: hæc iuxta telum transuersa demittitur. deinde ubi ad inuicem
 mucronem uentum est: paulum torquetur, ut telum foramine suo exci-
 piat. cum in cauo mucro est, illico duo digiti subiecti partis alterius
 unās simul & ferramentum id extrahunt, et telum. Tertium genus

LIBER

telorum est, quod interdum euelli debet, plumbea glans, aut lapis, aut simile aliquid, quod perrupta cute integrū intus insedit. in omnibus his latius vulnus aperiendum, idq; quod inest, eā qua uenit, forfice extrahendum est. Accedit uero aliquid difficultatis sub omni ictu, si telum uel osse inhæsit, uel in articulo se inter duo ossa demersit: in osse usq; eo mouendum est, donec is locus laxetur, qui mucronem momordit: Et tum uel manu, uel forfice telum extrahendum est: quæ ratio in dentibus quoq; eijciendis est. Et uix unq; ita telum non sequitur. sed si morabitur, excuti quoq; ictum aliquo ferramento poterit. Vltimū est, ubi nō euellitur, terebra iuxta forare, ab eo quoq; foramine ad speciem littere † contra telum os excadere sic, ut lineæ quæ diducuntur, ad telum spectent. eo facto id necesse est labet, Et facile auferatur. Inter duo uero ossa si per ipsum articulum perruperit, circa vulnus duo membra fasciis habenis uel deliganda, Et per has in diuersas partes diducenda sunt, ut nervos distendant. quibus extētis laxius inter ossa spaciū est, ut sine difficultate telum recipiatur. illud uidendum est, sicut in alijs locis posui, ne quis nervus, aut uena, aut arteria à telo ledatur: dum id extra itur: eadem scilicet ratione quæ supra posita est. at si uenenato quoq; telo quis ictus est: huiusdem omnibus si fieri potest etiam festinantius actis adiucenda curatio est: quæ uel epoto ueneno, uel à serpente ictis adhibetur. Vulneris autem ipsius extracto telo medicina non alia est, quā quæ esset si corpore icto nihil inhæsisset. de qua satis alio loco dictum est.

De ganglijs, Et meliceride, Et atheromate, Et steatomate
capitis tuberculis. Caput VI.

h Acc uenire in qualibet parte corporis possunt. reliqua certas sedes habent: de quibus dicam orsus à capite. in hoc multa, uariaq; tubercula oriuntur: ganglia, meliceridas, et atheromata nominant: alijsq; etiam nūm uocabulis quædam alij discernunt, quibus ego steatomata quoq; adijciam. quæ quamuis Et in ceruice, Et in alis, et in lateribus oriri solent: per se tamen non posui, cum omnia ista mediocres differentias habeant: ac nec periculo terreant, neq; diuerso genere curentur. Omnia autem ista Et ex paruo incipiunt, Et diu, paulatimq; increscunt: Et tunica sua includuntur: quædam ex his dura, ac renitentia: quædam mollia, cedentiaq; sunt, quædam spacio nudantur: quædam tecta capillo suo permanent: fereq; sine dolore sunt. quid intus habeāt, ut coniectura præagiri potest, sic ex toto cognosci, nisi cum eiecta sunt, non potest. maxime tamen in his quæ renitentur, aut lapillis quædam similia, aut concreti, confertiq;

pili reperiuntur. In his uero quæ æduna, aut melli simile aliquid, aut tenui pulcra, aut quasi rase cartilagini, aut carni hebeti, & cruentæ: quibus aliqui colores esse consueverunt. ferèq; ganglia reniuntur. atheromati subest quasi tenuis pulcra. meliceridi liquidior humor: ideoq; pressum circumfluit. steatomati pingue quiddam, idq; latissime patere consuevit, resoluitq; totam cutem superpositam sic, ut ea labet, cum in cæteris sit astrictior. omnia derasa ante si capillis continguntur, per medium oportet incidere: sed steatomatis tunica quoq; secunda est, ut effundatur quicquid intus coit: quia non facile à cute subiecta carne ea separetur: in cæteris ipsa tunica inuiolata seruanda est. Protinus autem alba, & intenta se ostendit. tum scalpelli manubriolo diducenda à cute, & carne est: eijciendaq; cum eo quod intus tenet. si quando tamen ab inferiore parte tunicæ musculus inhæsit, ne is lædatur, superior pars illius decidenda, alia ibidem relinquenda est. ubi tota exempta est, committendæ oræ, fibulaq; his iniicienda, & super medicamentum glutinans dandum est. ubi uel tota tunica, uel aliquid ex ea relictum est: pus mouentia adhibenda sunt.

De oculorum uicijs quæ scalpello, & manu curantur. Cap. VII.

Ed ut hæc neq; genere uicij, neq; ratione curationis inter se multum distant sic, in oculis quæ manum postulant, et ipsa diuersa sunt, & aliter, aliterq; curantur. igitur in superioribus palpebris uesicæ nasci solent pingues, grauesq; quæ uix attollere oculos sinunt: leuesq; pituitæ cursus, sed assiduos in oculis mouent. Ferè uero in pueris nascuntur. Oportet compresso digitis duobus oculo, atq; ita cute intenta, scalpello transuersam lineam incidere, suspensa leniter manu, ne uesicæ ipsa uulneretur: & ut locus ei patefactus est, ipsa prorumpat: tum digitis eam apprehendere oportet, & euellere: facile autem sequitur. deim super ungi collirio debet ex his aliquo, quo lippientes oculi super inunguntur. paucissimisq; diebus cicatrix la inducitur. molestius est ubi incisa uesicæ est. Effundit enim humorē: neq; postea quia tenuis admodum est, potest colligi: si forte id incidit, eorum aliquid imponendum est, quæ puri mouendo sunt.

De crithe tuberculo palpebrarum.

Ne eadem palpebra super pilorum locum tuberculū paruum nascitur, quod à similitudine ordeï à græcis *orion* nominatur. tunica quiddam quod difficulter maturescit cōprehensum est. id uel calido pane, uel cera subide calefacta foueri oportet

LIBER

sic ne nimius is calor sit: sed facile ea parte sustineatur. hac enim ratione sepe discutitur: interdum concoquitur: si pus se ostēdit, scalpello diuidi debet, & quicquid intus humoris est, exprimi. Eodem deinde uapore postea quoq; foueri, & super inungi, donec ad sanitatem perueniat.

De chalaſia palpebrarum.

Lia quoq; quedam in palpebris huic non dissimilia nascuntur: sed neq; utiq; figuræ eiusdem, & mobilia simul, atq; digito huc uel illuc impelluntur: ideoq; ea χαλαſία uocant. hæc incidi debent: si sub cute sunt ab exteriori parte: si sub cartilagine, ab interiori. dein scalpelli manubriolo diducenda ab integris partibus sunt: ac si intus plaga est: inungendū primo lenibus: deinde acrioribus. si extra, super dandum emplastrum, quo id glutinetur.

De ungue oculorum, quod ὀφθαλμία à græcis uocatur.

Unguis uero, quod ὀφθαλμία græci uocant: est membranula nervosa oriens ab angulo, quæ nonnunquam ad pupillam quoq; peruenit, eiq; officit. sæpius à narium, interdum etiā à temporum parte nascitur. hunc recentem non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis extenuantur: si inueterauit, iamq; ei crassitudo quoq; accessit: excidi debet. Post abstinentiam uero unius diei, uel aduersus in sedili contra medicum is homo collocandus est, uel sic aduersus, ut in gremium eius caput resupinus effundat. quidam si in sinistro oculo uicium est, aduersum. si in dextro: resupinum collocari uolunt. alteram autem palpebram à ministro diduci oportet, alteram à medico: sed ab hoc: si ille aduersus est. inferiorem. si supinus: superiorem. tum idem medicus hamulum acutum paulum mucrone intus recuruato subijcere extremo ungui debet, eumq; insingere, atq; eā quoq; palpebram tradere alteri, ipse hamulo apprehenso leuare unguem, eumq; acu traicere linum trahente deinde animum ponere: lini duo capita apprehendere, & per ea erecto ungue si qua parte oculo inhaeret manubriolo scalpelli diducere, donec ad angulū ueniat: deinde inuicem modo remittere, modo attrahere, ut sic & initium eius, & finis anguli reperiatur. duplex enim periculum est: ne uel ex ungue aliquid relinquatur, quod exulceratum nix ullam recipiat curationem, uel ex angulo quoq; atruncula absidatur, quæ si uehementius unguis ducitur, sequitur, ideoq; decipit: ac si al scissa est, pateſcit foramen: per quod postea semper humor descendit pu-

τάδ'α

αἰσα græci uocant. Verus ergo anguli finis utiq; noscendus est, qui ubi satis constitit, non nimium adducto ungue scalpellus adhibendus est: deinde excidenda ea membranula, ne quid ex angulo lædatur. Eo deinde ex melle linamentum super dādum est: supraq; linteolum, & aut spongia, aut lana succida, proximisq; diebus diducendus quod tidie oculus est, ne cicatrice inter se palpebræ glutinentur. siquidem id quoq; tertium periculum accedit: eodemq; modo linamentum imponendum, ac nouissime inungendum collirio, quo ulcera ad cicatricem perducuntur. sed ea curatio uerna esse debet, aut certe ante hyemem: de qua re ad plura loca pertinente semel dixisse satis erit. nam duo genera curationum sunt. alia, in quibus eligere tempus non licet, sed utendum est eo, quod incidit, sicut in uulneribus, & in fistulis. alia in quibus nullus dies urget, & expectare tutissimum, & facile est: sicut euenit in ijs, quæ & tarde crescunt, & dolore non cruciant: in his uer expectandum est. aut si quid magis pressit, melior tamen autumnus uel æstas, quàm hyems est. atq; is ipse medius, iam fractis æstatibus, nondum ortis frigoribus. quo magis autem necessaria pars erit quæ tractabitur, hoc quoq; maiori periculo subiecta est. et sæpe quo maior plaqa facienda, eo magis hæc temporis ratio seruabitur.

De enchanti tuberculo.

X curatione uero unguis ut dixi, uicia nascuntur: quæ ipsa alijs quoq; de causis oriri solent. interdum enim fit in angulo, parum ungue exaso, uel aliter tuberculum, quod palpebras parum diduci patitur, & χαυτῖς græce nominatur. excidi hamulo, & circuncidi debet, hic quoq; diligenter temperata manu, ne quid ex ipso abscidat. tum exiguum linamentum respergendum est uel cadmia, uel atramento sutorio: inq; eum angulum diductis palpebris inferendum: supraq; eodē modo deligandum. proximisq; diebus similiter nutriendum tantum, ut primis aqua egelida, uel etiam frigida foneatur.

De ancyloblepharo oculorum uicio.

i Nterdum inter se palpebræ coalescunt: apeririq; non potest oculus. cui malo solet etiam illud accedere, ut palpebræ cum albo oculi cohærescant: scilicet cum in utroq; fuit ulcus negligenter curatum. sanescendo enim quod diduci potuit, et debuit, glutinabit: ἀγκυλοβλήφαρος sub utroq; uicio græci uocant. Palpebræ tantum inter se cohærentes non difficulter diducuntur, sed interdum fru-

Aurelij Cor.

p

LIBER

stra: nam rursus glutinantur. Experiri tamen oportet: quia bene res
 sæpius cedit. igitur aduersum specillum inferendum, diducendâq; eò
 palpebræ sunt, deinde exigua penicilla interponenda, donec exulce-
 ratio eius loci finiatur. at ubi albo ipsius oculi palpebra inhæsit:
 Heracrides tarentinus auctor est, aduerso scalpello subsecare magna
 cum moderatione, ut neq; ex oculo, neq; ex palpebra quicquam absci-
 datur. ac si necesse est, ex palpebra potius. post hæc inungatur oculus
 medicamentis, quibus aspritudo curatur: quotidieq; palpebra uerta-
 tur, non solum ut ulceri medicamentum inducatur, sed etiam ne rur-
 sus inhæreat, ipsiq; etiam præcipiatur, ut sæpe eâ duobus digitis at-
 tollat. ego sic restitutum esse neminem memini. Meges se quoq; multa
 tentasse, neq; unq; profuisse, quia semper iterum oculo palpebra inhæ-
 serit, memoriæ prodit.

De ægylopa fistula oculorum.

Tiam num in angulo, qui naribus propior est, ex aliquo ui-
 cio quasi parua fistula aperitur, per quam pituita assidue
 defillat. *αἰνῶτα* græci vocant: idq; assidue male habet ocu-
 lum: nonnunquam etiam exeso osse usq; ad nares penetrat, idq; in-
 terdum naturam carcinomatis habet. ubi intentæ uenæ et recurua-
 tæ sunt: color pallet: cutis dura est, et leui tactu irritatur: inflama-
 tionemq; in eas partes, quæ coniunctæ sunt, euocat. ex his eos, qui qua-
 si carcinoma habent, curare periculosum est. nam mortem quoq; ea
 res maturat. eos uero quibus ad nares tendit, supernacuum, neq; enim
 sanescunt. at qui usid in angulo est: potest adhiberi curatio, cum eo
 ne ignotum sit, esse difficilem: quantoq; angulo propius id foramen
 est, tanto difficilior est. quoniam per angustum est in quo uersari ma-
 nus possit. recenti tamen remedi facilius est. sed hamulo summum
 eius foraminis excipiendum: deinde totum id cauum, sicut in fistulis
 dixi, usq; ad os excidendum, oculoq; et cæteris iunctis partibus bene
 obtectis, os ferramento adurendum est uehementius. quod si iam carie
 uexatum est, quo crassior his squama accedat, quidam adurētia im-
 ponunt, ut atramentum sutorium, uel chalcidem, uel æruginem ra-
 sam: quod et tardius et non idem facit. osse adusto curatio sequitur
 eadem, quæ in cæteris uestis.

De pilis palpebrarum oculum irritantibus.

Illi uero, qui in palpebris sunt duabus de causis oculum irri-
 tare consueverunt. nam modo palpebræ superioris summa
 cutis relaxatur et procidit. quo fit ut eius pili ad ipsum oculum con-

uertantur: quia non simul cartilago quoque se remissu. modo subordi-
 ne naturali pilorum alius ordo subcreſcit, qui protinus intus ad oca-
 lum tendit. curationes, hæ sunt. si pili nati sunt qui non debuerunt: te-
 nuis acus ferrea ad similitudinem hastæ lata in ignem coniuncta est.
 deinde candens sublata palpebra sic, ut eius perniciosi pili in conspe-
 ctum curantis ueniant, sub ipsis pilorum radiabus ab angulo in-
 mittenda est, ut ea tertiam partem palpebræ tranſueat. deinde ite-
 rum, tertioque usque ad alterum angulum. quo fit ut omnes pilorum ra-
 dices adustæ emoriantur. tum superimponendum medicamentum est,
 quod inflammationem prohibeat. atque ubi crustæ exciderunt, ad ci-
 catricem perducendum. facillime autem id genus sanescit. quidam autem
 acu tranſiuxta pilos in exteriorē partem palpebræ oportere, eamque
 transmitti duplicem capillum muliebrem ducentum, atque ubi acus tra-
 ſiit, in ipsius capilli sinum, qua duplicatur, pilum esse coniungendum, et
 per eum in superiorem palpebræ partem attrahendum, ibique corpo-
 ri agglutinandum, et imponendum medicamentum, quo foramen
 quoque glutinetur. sic enim fore ut his pilus in exteriorē partem po-
 stea spectet. id primum fieri non potest nisi in pilo longiore, cum fe-
 re breues eo loco nascantur. deinde si plures pili sunt, necesse est lon-
 gum tormentum: cum totiens acus tranſuet, magnam inflammationē
 moueat. Nouissime cum humor aliquis ibi subsit, oculo et ante per
 pilos, et tum per palpebræ foramina affecto, uix fieri potest ut glu-
 ten quo uinctus est pilus, non resoluitur. eoque fit ut is, eo unde ut ab-
 ductus est: redeat ea uero curatio, quæ palpebræ laxioris ab omni-
 bus frequentatur, nihil habet dubij. siquidem oportet contacto oculo
 mediam palpebræ autem, siue ea superior, siue inferior est: apprehē-
 dere digitis, ac leuare. tum considerare quantulo detracto futurum
 sit, ut naturaliter se habeat. siquidem hic quoque duo pericula circun-
 stant. si nimium fuerit excisum, ne contegi oculus non possit. si parum,
 ne nihil actum sit, et frustra sectus aliquis sit. qua deinde inciden-
 dum uidebitur, per duas lineas atramento notandum est sic, ut de in-
 teriore, quæ pilos continet et propiore ei linea aliquid relinquatur,
 quod apprehendere acus postea possit. his constitutis scalpellus adhi-
 bendus est. et si superior palpebra est: ante: si inferior, postea propi-
 us ipsis pilis incidendum. minimumque faciendum in sinistro oculo, ab eo
 angulo, qui tempore in dextro, ab eo qui naribus propior est, idque, quod
 inter duas lineas est. excidendum. deinde oræ uulneris inter se sim-
 pliciter futura committendæ, operiendusque oculus est, et si parum pal-
 pebra descendet, laxanda utique. si nimium, aut astringenda, aut etiam
 rursus tenuis habentula ab ulteriore ora excidenda. ubi secta est, alia

LIBER

sutura adiicienda, quæ supra tres esse non debent. præter hæc in superiore palpebra sub pilis ipsis incidenda linea est, ut ab inferiore parte ducti pili sursum spectent. idq; si levis inclinatio est, etiam solum satis tuetur. inferior palpebra eo non eget. his factis sponsa ex aqua frigida expressa super deliganda est. postero die glutinans emplastrum iniiciendum. quarto sutura tollenda est: Et collirio, quod inflammationes reprimat, superinungendum.

De lagophthalmo oculorum.

¶ Nunquam autem nimium sub hac curatione excisa cute euenit ut oculus non contegatur. idq; interdum etiam alia de causa fit: *αὐρόπθωμος* greci appellant. in quo si nimium palpebrae deest, nulla id restituere curatio potest. si exiguum, mederi licet: paulum infra supercilium cutis incidenda est, lunata figura cornibus eius deorsum spectantibus. altitudo esse plagæ usq; ad cartilaginem debet, ipsa illa nihil læsa. nam si ea inarsa est, palpebra concidit: neq; attolli postea potest. cute igitur tantum ducta fit, ut paulum in ima oculi ora descendat: hiantem scilicet super plagam, in quam linamentum coniiciendum est: quod et coniungi ductam cutem prohibeat: et in medio carunculam citet: quæ ubi eum locum impleuit, postea recte oculus operitur.

De ectropio.

¶ Superioris autem palpebrae uitium est, quod parum descendit, ideoq; oculus non contegit: sic inferioris, quod parum sursum attollitur, sed pendet, et hiat, neq; potest cum superiore committi. atq; id quoq; euenit interdum ex simili uitio curationis, interdum etiam senectute: *ἐκτροπίον* greci uocant. si ex mala curatione est, eadem ratio medicinae est, quæ supra posita est: plagæ tantum cornua ad maxillas non ad oculum conuertenda sunt. si ex senectute est, tenui ferramento id totum extrinsecus adurendum est, deinde melle inungendum. at quarto die uapore aquæ calidæ fouendum, inungendumq; medicamentis ad cicatricem perducentibus.

De staphylomate oculi.

¶ Nec ferè circa oculum in angulis, palpebrisq; incidere consuerunt. in ipso autem oculo nonnunquam summa attollitur tunica siue ruptis intus membranis aliquibus, siue laxatis, et si-

milis figura acino fit. unde id *σποῦλον* greci vocant. curatio duplex est. altera ad ipsas radices per medium transuere, ac duo linea discente. deinde alterius lini duo capita ex superiore parte, alterius ex interiore astringere inter se: quæ paulatim secundo id excidunt. altera in summa parte eius ad lenticulæ magnitudinem excidere: deinde spodium, aut cadmiā inficere. utrolibet autem facto album omī lana excipiendum & imponendum, posteaq; uapore aquæ calidæ fouendus oculus, & lenibus medicamentis ungendus est.

De clauis oculorum.

Clauis autem uocantur, callosa in albo oculi tubercula, quibus nomen à figuræ similitudine est. hos ad imam radicem perforare ac commodissimum est, infraq; eam excidere, deinde lenibus medicamentis inungere.

De natura oculorum, & eorum suffusione.

Suffusionis iam aliis feci mentionem, quia cum recens incidit, medicamentis quoq; sæpe discutitur: sed ubi uetustior facta est, manus curationem desiderat, quæ inter subtilissimas haberi potest. de qua antequam dico, paucis ipsius oculi natura indicanda est. cuius cognitio cum ad plura loca pertineat, tum uel præcipue ad hunc pertinet. is igitur summas habet duas tunicas: ex quibus superior à grecis *επερωειδής* uocatur. ea, qua parte alba est satis crassa: pupillæ loco extenuatur. huic interior adiuncta est media parte: qua pupilla est: modico foramine concava, circa tenais ulterioribus partibus ipsa quoq; plenior. quæ *χορειδής* à grecis nominatur. hæ duæ tunice cum interiora oculi cingant: rursus sub his coeunt: extenuatq; & in unum coactæ per foramen quod inter ossa est: ad mēbra nam cerebri perueniunt, eoq; inherescunt. sub his autem, qua parte pupilla est, locus uacuus est. deinde infra rursus tenuissima tunica quam Herophilus *ἀπαχρωειδής* nominauit. Ea media subsidit, eoq; cæuo continet quiddam, quod à uitri similitudine *ὕαλοειδής* greci uocant. id neq; liquidum, neq; aridum est: sed quasi concretus humor, ex cuius colore pupillæ color uel niger est, uel cæsius, cum summa tunica tota alba sit. Id autem superueniens ab interiore parte membrana la includit. sub his gutta humoris est omī albo similis, à qua uidendi facultas proficiat, *πρωταλλοειδής* à grecis nominatur. igitur uel ex morbo, uel ex icctu concreuit humor sub duabus tunicis, qua locum uacuum esse proposui: isq; paulatim indurefcens interiori potentie se opponit. uicijq; eius plures species sunt: quedam sanabiles: quedam

Aurelij Cor.

p iij

que curationem non admittunt. nam si exigua suffusio est, si immobilis: colorem uero habet marinæ aquæ, uel ferri nitentis, & à latere sensum aliquem fulgoris relinquit spes super est. si magna est, si nigra pars oculi amissa naturali figura in aliam uertit, si suffusioni color ceruleus est, aut auro similis, si labat, & hac, atq; illac mouetur, uix unquam succurritur. ferè uero peior est: quo ex grauiore morbo, maioribus ne capitis doloribus, uel ictu uehementiore orta est, neq; idonea curatio, si senilis ætas est, quæ sine nouo uicio tamen acie hebetem habet. at ne puerilis, quidem, sed inter hæc media ætas. oculus quoq; curationi neq; exiguus, neq; conatus, satis oportunus est, atq; ipsius suffusionis, quædam maturitas est. expectandum igitur est donec iam non fluere, sed durities quædam concreuisse uideatur. ante curationem autem modico cibo uti, bibere aquam triduo debet: pridie ab omnibus abstinere. post hæc in aduerso sedili collocandus est loco lucido, lumine aduerso sic: ut contra medicus paulo altius sede at. à posteriore autem parte caput eius, qui curabitur, minister contineat, & immobile id præstet. nam leui motu eripi acies in perpetuum potest. quin etiam ipse oculus qui curabitur: immobilior faciendus est, super alterum lana imposita & deligata. curari uero sinister oculus dextra manu, dexter sinistra debet. tum acus admouenda est, aut acuta, aut forte non nimium tenuis, eaq; demittenda: sed recta est per summas duas tunicas medio loco inter nigrum oculi, & angulum temporis propiorem è regione mediæ suffusionis, sic ne qua uena lædatur. neque tamen timide demittenda est, quia inani loco excipitur, ad quem cum uentum est, ne mediocriter quidem peritus falli potest: quia prementi nihil renititur. ubi eò uentum est, inclinanda acus ad ipsam suffusionem est, leuiterq; ibi uerti, & paulatim eà deducere infra regionem pupillæ debet. ubi deinde eam transit uehementius imprimi, ut inferiori parti insidat. si hæsit, curatio expleta est. si subinde redit, eadē acu magis concidenda, & in plures partes dissipanda est: quæ singulæ & facilius conduntur, & minus late offiunt. post hæc educenda acus recta est, imponendumq; est lana molli exceptum oui album, & supra: quod inflammationem coerceat: atque ita denuntiandum. post hæc opus est quiete, abstinentia, lenium mediatamentorum inunctionibus, cibo, qui postero die satis mature datur, primum liquido, ne maxillæ laborent, deinde inflammatione finita tali, qualis in uulneribus propositus est. quibus, ut aqua quoq; diutius bibatur, necessario accedit.

E pituitæ quoq; tenuis cursu, qui oculos infestat, quatenus
 d medicamentis agendum est, iam explicui. nunc ad ea ueni-
 am: quæ curationem ex manu postulant. animaduertimus
 autem quibusdam nunquam siccescere oculos, sed semper humore te-
 nuâ madere, quæ res aspritudinem continuat, ex leuibus momētis in-
 flammationes et lippitudines excitat, totam deniq; uitam hominis in-
 festat. idq; in quibusdam nulla ope adiunari potest, in quibusdam sa-
 nabile est. quod primum discrimin est nosse oportet, ut alteri succur-
 ratur, alteri manus non iniiciatur. ac primum supernacua curatio
 est in his, qui ab infantibus id uicium habent, quia necessario mansu-
 rum est usque ad mortis diem: deinde non necessario etiam in his, q-
 bus non mulat, sed acris pituita est. si quidem manu nihil adiunatur.
 medicamentis & uictus ratione, quæ crassiorem pituitam reddit, ad
 sanitatem perueniunt. late etiam capita uix medicinæ patent. tum in-
 terest uenæ pituitam emittant: quæ inter caluariam & cutem sunt,
 an quæ inter membranam cerebri & caluariam. superiores ferè
 per tempora oculos rigant: inferiores per eas mēbranas, quæ ab oca-
 lis ad cerebrum tendunt. potest autem adhiberi remedium his: quæ su-
 pra os fluunt, non potest his, quæ sub osse. ac ne his quidem succurri-
 tur, quibus pituita utrinq; descendit. quia leuata altera parte nihilo-
 minus altera infestat. quid sit autem hoc ratione cognoscitur. raso ca-
 pite ea medicamēta, quibus in lippitudine pituita suspēditur, à super
 alijs usq; ad uerticem illini debent. si sicut oculi esse coeperunt, appa-
 ret per eas uenas, quæ sub cute sunt, irrigari. si nihilominus madent,
 manifestum est sub osse descendere. si est humor, sed leuior, duplex uī-
 cium est. plurimi tamen ex laborantibus reperiuntur: quos superiores
 uenæ exerceant, ideoq; pluribus etiam opitulari licet. idq; non in
 græcia tantummodo, sed in alijs quoq; gentibus celebre est, adeo ut nul-
 la medicinæ pars magis per nationes quoque exposita sit. reperi in
 græcia sunt qui nouem lineis cutem capitis inciderent, duabus in oca-
 pitio rectis: una super eas transversa, dein duabus super aures, una
 inter eas item transversa, tribus inter uerticem & frontem rectis. re-
 perti sunt qui à capite recte eas lineas ad tempora diducerent: cogni-
 tisq; ex motu maxillarum musculorum inuijs, leniter super eos cutem
 inciderent. inductisq; per retusos hamos oris infererent linamen-
 ta, ut neque inter se cutis antiqui fines committerentur, & in medio
 caro incretset, quæ uenas ex quibus humor ad oculos transiret,
 astringeret. Quidam etiam atramento duas lineas duxerunt à

media aure ad mediam alteram aurem: deinde à naribus ad uerticem. tum ubi lineæ committebantur, scalpello inciderunt, & post sanguine fuso os ibidem adusserunt. nihilominus autem: et in temporibus & inter frontem atq; caluariam eminentibus uenis idem candens ferrum admouerunt. frequens curatio est uenas in temporibus adurere, quæ ferè quidem in eiusmodi malo tument. sed tamen ut inflentur, magisq; se ostendant. ceruix ante modice deliganda est, tenuibusq; ferramentis & reuulsis uenæ adurendæ, donec in oculis pituitæ cursus conquietetur. id enim signum est quasi ex cæcatorum itinerum per quæ humor ferebatur. ualentior tamen medicina est: ubi tenues conditæq; uenæ, ideoq; legi non possunt. eodem modo ceruicæ deligatæ: retentoq; ab ipso spiritu, quo magis uenæ prodeant: atramento notare eas contra tempora et inter uerticem ac frontem: deinde ceruicæ resoluta quæ notæ sunt uenas incidere & sanguinem mittere. ubi satis fluxit, tenuibus ferramentis adurere. contra tempora quidem timide, ne subiecti muscoli, qui maxillas tenent, sentiant: inter frontem uero et uerticem, uehementer, ut sic squama ab osse recedat. efficacior tamē etiam nunc est asprorum curatio, qui uerticem usq; ad os adurunt sic, ut squamā remittat. sed nihil melius est quàm quod in gallia quoq; comata fit. ubi uenas in temporibus et in superiore capitis parte legunt. adusta quomodo curanda sint iam explicui. nunc illud adiicio, neq; ut crustæ decedant: neq; ut ulcus impleatur adustis uenis esse properandum. ne uel sanguis erumpat, uel cito pus supprimatur, cum per hoc scisciscere eas partes opus sit: per illud exhauriri opus non sit. si quando tamen sanguis eruperit, infricanda medicamenta esse, quæ sic sanguinem supprimant, ne adurant. quemadmodū autem uenæ deligendæ sint: quidq; lectis his faciendum sit, cum uenero ad crurum uarices dicam.

De aurium morbis, qui manu & scalpello curantur. Cap. VIII.

Errum ut oculi multiplicem curationem etiam manus exigunt: sic in auribus admodum pauca sunt: quæ in hac medicinæ parte tractentur. solet tamen euenire uel à primo natali die protinus, uel postea facta exulceratione, deinde per attritionem aure repleta, ut foramen in ea nullum sit, ideoq; audiendi usum careat. quod ubi incidit: specillo tentandum est, alie ne id repletum, an in summo tantum glutinatum sit. nam si alie est: prementi non cedit. si in summo, specillum protinus recipit. Illud attingi non oportet, ne sine effectus spe distentio oriatur uirorum & ex ea mortis periculum sit. hoc facile curatur nam quæ cauum esse debet, uel medicamen-
tum

tum aliquod imponendum est ex adurentibus, uel candente ferro aperiendum, uel etiam scalpello incidendum. cumq; id patefactum, etiam ulcus purum est: coniicienda eò pinna est illita medicamento cicatricem inducente, circaq; idem medicamentum dandum, ut cutis circa pinnam sanescat: quo fit ut ea remota postea facultas audiendi sit: at ubi aures: in uiro puta, perforatae sunt, et offendunt, traicere id celeriter candente acu satis est, ut leniter eius ora exulceretur, aut etiam adurente medicamento idem exulcerare: postea deinde imponere id quod purget, tum quod eum locum repleat, et sic cicatricem inducat. quod si magnū id foramen est, sicut solet esse in his, qui maiora pondera auribus gesserunt: incidere quod superest ad extremum oportet, supra deinde oras scalpello exulcerare, et postea suere, ac medicamentum, quo id glutinetur, imponere. tertium est: si quid ibi curti est, sarcire. quae res cum in labris quoq; et naribus fieri possit: eandem autem rationem habeat, simul explicanda est.

Curta in auribus, labrisq; ac naribus, quomodo sarciri et curari possint. Cap. IX.

Vita igitur in his tribus, ac si qua parua paria sunt: curari possunt: si qua maiora sunt, aut non recipiunt curationem aut ita per hanc ipsam deformantur, ut minus indecora ante fuerint. atq; in aure quidem et naribus deformatas sola timeari potest. in labris uero si nimium contracta sunt, usus quoq; necessarii iactura fit. quia minus facile et cibis assumitur, et sermo exptiatur. neq; enim creatur ibi corpus: sed ex uicino adducitur: quod in leui mutatione et nihil eripere, et fallere oculum potest: in magna non potest: neq; senile autem corpus, neq; quod mali habitus est, neq; in quo difficulter ulcera sanescunt, huic medicinae idoneum est: quia nusquam celerius cancer occupat, aut difficiliter tollitur. ratio curationis eiusmodi est. id quod curatum est in quadratum redigere. ab interioribus eius angulis lineas transversas incidere, quae ceteriore partem ab ulteriore ex toto diducant: deinde ea quae sic resoluiamus, in unum adducere: si nō satis iunguntur, ultra lineas, quas ante fecimus, alias duas lunatas, et ad plagam conuersas immittere, quibus summa tantum cutis diducatur. sic enim fit ut facilius quod adducitur, sequi possit: quod non ui cogendum est, sed ita adducendum, ut ex facili subsequatur, et demissum non multum recedat. interdum autem ab altera parte cutis haud omnino adducta, deformem quem reliquit locum reddit. Huiusmodi loci altera pars incidenda, altera intacta ha-

LIBER

benda est. ergo neq; ex imis auribus, neq; ex medio naso imis uenarum partibus, neq; ex angulis labrorum quicquam attrahere tentabimus. utrinq; autem petemus: si quid summis auribus, si quid imis, si quid aut medio naso, aut medijs naribus, aut medijs labris deerit. quæ tamen interdum etiam duobus locis curata esse consuerunt. sed eadem ratio curandi est. si cartilago in eo quod incisum est, eminet: excidenda est. neque enim aut glutinatur, aut acutius traicitur. neq; longe tamen excidi debet: ne inter duas oras liberæ cutis, utrinq; citius puris fieri possit. tum iunctæ oræ inter se suendæ sunt utrinq; citius apprehensa, et qua priores lineæ sunt: ea quoq; suturæ iniiciendæ sunt. sicut locis, ut in naribus, illita spuma argenti satis proficit. in ultiores uero lunatasq; plagas linamentum dandum est, ut citius increscens uulnus impleat, summaq; cura quod ita sutum est, tutum esse apparere ex eo potest, quod de cancro supra posui. ergo etiam tertio quoq; die fouendum erit uapore aquæ calidæ: rursusq; idem medicamentum iniiciendum, fereq; septimo die glutinatum est. tum suturæ eximi, et ulcus ad sanitatem perducendum debent.

De polypi curatione per ferrum. Cap. X.

Polypum uero, qui in naribus nascitur, præcipue ferro curari iam alias posui. ergo etiam hunc ferramento acuto in modum spatulæ factæ resolueri ab osse oportet adhibita diligentia, ne infra cartilago lædatur, in qua difficilis curatio est. ubi abscissus est, uno ferramento extrahendus est. tum implicitum linamentum, uel aliquid ex penicillo respergendum est medicamento, quo sanguis suppressitur: eoq; nares leniter implendæ. sanguine suppresso, linamento ulculum purgandum est. ubi purum est, eo pinna eodem modo quo in aure supra positum est, medicamento illita, quo cicatrix inducitur, intus demittenda, donec ex toto id sanescat.

De ozæna. Cap. XI.

Id autem uitium, quod οζæνα à græcis uocatur, si medicamenti non cederet, quemadmodum manu curandum esset, apud magnos chirurgos non reperi. Credo quia res raro ad sanitatem satis proficit: cum aliquod in ipsa curatione tormentum habeat. apud quosdam tamē positum est uel futilem fistulam, uel eodem scriptorium calanum in nares esse coniiciendum, donec sursum ad os perueniat: tum per id tenue ferramentum candens dandum

esse ad ipsum os: deinde adustum locum purgandum esse aerugine & melle. ubi purus est: lyco ad sanitatem perducendum. uel narem incidendam esse ab imi parte ad os, ut & conspici locus possit, & facilius cadens ferramentum adnoueri. tum sui narem debere, & adustum quidem ulcus eadem ratione curari. suturam uero illini uel spuma argenti uel alio glutinante.

De ore uicijs, quæ manu & ferro curantur.

Cap. XII.

De dentibus.

N ore quoque quædam manu curantur. ubi in primis dentes nonnunquam mouentur, modo propter radicum imbecillitatem, modo propter gingivarum arescentium uicium. oportet in utrolibet cadens ferramentum ginguis adnouere, ut leuiter attingat, non ut insidat. adustæ gingivæ melle illinendæ, & mulso eluendæ sunt, ut pura ulcera esse ceperunt, arida medicamentis infricanda sunt ex his quæ reprimunt. si uero dens dolores mouet, eximique eum, qui a medicamentis nihil adiuvant, placuit, circumradi debet, ut gingua ab eo resoluatur. tum is concutiendus est. eaque facienda donec bene mouentur. nam dens hærens cum summo periculo euellitur, ac nonnunquam maxilla loco mouetur. idque etiam maiore periculo in superioribus dentibus fit, quia potest tempora oculus uel coactere. tum si fieri potest manus, si minus, forfice dens exapiendus. ac si exesus est, ante id foramen, uel linamento, uel bene accommodato plumbo replendum est ne sub forfice confringatur: recta uero forfex ducenda est, ne inflexis radicibus os earum, cui dens inhaeret, parte aliqua frangatur. neque ideo nullum eius rei periculum est, utique in dentibus breuibus, qui ferè longiores radices, habent. sæpe enim forfex cum dentem comprehendere non possit, aut frustra comprehendat, os gingivæprehendit & frangit. protinus autem ubi plus sanguinis profluit, scire licet aliquid ex osse fractum esse. ergo specillo conquirenda est testa, quæ recessit & uolsella protrahenda est. si non sequitur, incidi gingua debet, donec labans ossis testa recipiatur. quod si fractum statim non est, indurescit extrinsecus maxilla, ut is hiare non possit. sed imponendum calidum ex farina et fimo cataplasma est, donec ibi pus moueatur. tum incidi gingua debet. pus quoque multum profluens ossis fracti nota est. itaque etiam tum id extrahi conuenit. nonnunquam etiam eo læso, fistula fit quæ eradi debet. Dens autem sabber, quæ parte niger est, radedus est, illinendusque rosæ flore contrito, cui gallæ quarta pars & altera myrrha sit adiecta. continendumque ore crebro uinum meracum. atque

LIBER

in eo casu uelandum caput, ambulatione multa, frictione apitis: cibo non acri utendum est. at si ex ictu uel alio casu aliqui labant dentes, auro cum his, qui bene hærent, uinciendi sunt. continendaq; ore reprimenda, ut uinum in quo malicorium decoctum, aut in quo galla candens coniecta sit. Si quando etiam in pueris alter dens nascitur, quam prior excidat, is qui cadere debuit circum purgandus, & euellendus est: is qui natus est in locum prioris quotidie digito adurgendus, donec ad iustam magnitudinem perueniat: quotiensq; dente exëpto radix relicta est, protinus ea quoq; ad id facta forfic, quam p'lar græci uocant, eximenda est. Tonsillas autem quæ post inflammationes induruerunt: ætidiæ autem græcis appellantur: cum sub leuitatibus sine, oportet digito circum radere & euellere: si ne sic quædam resoluantur, hamulo excipere, & scalpello excidere: tum ulcus aceto eluere, & illinere uulnus medicamento, quo sanguis supprimatur.

De uita.

Va si cum inflammatione descendit, doloriq; est, & sub rubicundi coloris: præcidi sine periculo non potest. solet enim multum sanguinem effundere. itaq; melius est his uti, quæ aliâs proposita sunt. si uero inflammatio quidem nulla est, nihilominus autem ea ultra iustum modum à pituita deducta est, & est tenuis, acuta, alba, præcidi debet. itemq; si ima, livida & crassa, summa, tenuis est. neq; quicquam commodius est quam uolsellaprehendere, sub eaq; quod uolumus, excidere. neq; enim ullum periculum est, ne plus minusue præcidatur: cum liceat tantum infra uolsellam relinquere: quantum inutile esse manifestum est: idq; præcidere quo longior uita est, quàm esse naturaliter debet. post curationem eadem facienda sunt, quæ in tonsillis proxime posui.

De lingua.

Inguæ uero quibusdam cum subiecta parte à primo natali die iuncta est, qui ob id ne loqui quidem possunt. horum extrema lingua uolsellaprehendenda est, sub eaq; membrana incidenda magna cura habita, ne uenæ quæ iuxta sunt: uolentur, et profusione sanguinis noceant. reliqua curatio uulnere in prioribus posita est: & pleriq; quidem, ubi conuenerunt, loquuntur. ego autem cognoui qui sucasa lingua, cum abunde super dentes eam promeret, non tamen loquendi facultatem consecutus est. adeo in medicinæ etiam ubi perpetuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est id, quod sequi conuenit.

¶ Vb lingua quoq; interdum aliquid abscedit, quod ferè consistit in tunica: doloresq; magnos mouet. quod si exiguum est, incidi semel satis est: si maius, summa cutis usq; ad tunicam excidenda est: deinde utrinq; oræ hamulus excipiendæ, & tunica undiq; circumdata liberanda est, magna diligentia per omnem cautionem habita, ne qua maior uena incidatur.

De labris.

¶ Abra autem sæpe finduntur, eaq; res habet cum dolore etiam hanc molestiam, quod sermo prohibetur: qui subinde eas rimas cum dolore diducendo sanguinem citat: sed has, si in summo sunt, medicamentis curare comodius est, quæ ad ulcera oris fiunt. si uero altius descenderunt, necessariū est tenui ferramento adurere: quod spathæ simile quasi transcurrere, non imprimi debet. postea faciendæ eadem sunt, quæ in auribus adustus exposita sunt.

De ceruicis uicijs, & curatione. Cap. XIII.

¶ In ceruice inter cutem, & asperam arteriam tumor incre-
4 scit: $\beta\text{por}\chi\alpha\text{noi}\alpha\text{uv}$ græci uocant. quo modo caro hebes, modo humor aliquis melli, aquæ uel similis includitur: interdum etiam minutis ossibus pili immixti, ex quibus quicquid est quod tunica continetur, potest adurentibus medicamentis curari, quibus summa cutis cum superiecta tunica exæditur. quo facto siue humor est, profluit: siue quid densius, deinde digitis educitur: tum ulcus sub linamentis sanescit: sed scalpelli curatio breuior est. Medio tumore una linea inciditur usq; ad tunicam: deinde uiciosus sinus ab integro corpore digito separatur: totusq; cum uelamento suo eximitur. tum aceto, cui uel sale, uel nitrum aliquis adiecit, eluitur. oræq; una sutura iunguntur: cæteraq; eadem quæ in alijs suturis super injiciuntur. Leniter deinde, ne fauces urgeat, deligatur. si quando autem tunica eximi non potuerit, intus inspergenda adurentia: linamentisq; id curandum est cæteris pus mouentibus.

De umbilicis uicijs. Cap. XIII.

¶ Vnt etiam circa umbilicum plura uicia, de quibus propter raritatem inter auctores parum constat. uerisimile est autem id à quoq; prætermisum, quod ipse non cognouerat: à nullo, id quod

non uiderat, fictum commune omnibus est, umbilicum indecore promerere. causae requiruntur. mages tres has posuit. modo intestinum eò irrumperet. modo omentum. modo humorem. Sostratus nihil de omento dixit. duobus hisdem adiecit, carnem ibi interdum increscere, eamq; modo magram esse, modo carcinomati similem. Gorgias ipse quoque omenti mentionem omisit. sed eadem tria causatus spiritum quoq; interdum eò dixit irrumperet. Heron omnibus his quatuor positis, et omenti mentionem habuit, et eius quod simul et omentum et intestinum habuerit. quid autem horum sit, his indicij cognoscitur. ubi intestinum prolapsum est, tumor neque durus neque mollis est omni frigore comminuitur, non solum sub omni calore, sed etiam retento spiritu crescit. sonat interdum, atq; ubi resupinatus est aliquis delapso intestino ipse desidit. ubi uero omentum est, cetera similia sunt, tumor mollior et ab una parte latus extenuatum in uentrem est. si quis apprehendit: elabatur. ubi utrumque est: indurita quoque mixta sunt, et inter utrumque mollities. at atro durior est, semperq; etiam resupinato corpore tumet, prementiq; non cedit, prioribus facile cedentibus. si uiciosa est easdem notas habet, quas in carcinomate exposui. humor autem si premitur: circumfluit. at spiritus pressus cedit, sed protinus redit resupinato quoq; corpore tumorem in eadem figura tenet. ex his id quod ex spiritu uicium est, medicinam non admittit. atro quoq; carcinomati similis cum periculo tractatur. itaq; omittenda est. sana excidi debet, idq; uulnus linamentis curari. humorem quidam uel inciso summo tumore effundunt, et uulnus hisdem linamentis curant. in reliquis uariae sententiae sunt. ac resupinandum quidem corpus esse res ipsa testatur, ut in uterum, siue intestinum, siue omentum est, delabatur. sinus uero umbilici tum uacius a quibusdam duabus regulis exceptus est, uehementerq; earum capitibus deligatis ibi emoriatur. a quibusdam id uicium acu tractatur duo lina ducente. deinde utriusq; lini duobus capitibus diuersae partes astringuntur. quod in una quoq; oculi fit. nam sic id quod supra uinculum est, moritur. adiecerunt quidam, ut antequam uincerent: summum una linea incidere, exciderentq; quo facilius digito demisso, quod illuc irrupisset, depellerent. tum deinde uinxerunt. sed abunde est, inbere spiritum continere, ut tumor quantus maximus esse potest, se ostendat. tum imam basin eius atramento notare, resupinatoq; homine, digitis tumorem eum premere, ut si quid delapsum non est: manu cogatur. post haec umbilicum attrahere, et qua nota atramenti est lino uehementer astringere. deinde partem superiorem aut medicamentis aut ferro adurere donec emoriatur. atq; ut cetera uisus uulnus nutri-

veridq; non solum ubi intestinum uel omentum, uel utrumque est, sed etiam ubi humor est: optime proficit sed ante quaedam uisenda sunt, ne quod ex uinulo periculum sit. nam curationi neque infans, neque aut robustus annis, aut senex aptus est, sed à septimo ferè anno ad quartumdecimum. deinde ei corpus idoneum est id, quod integrum est. at quod mali habitus est, quodq; papulis, impetiginis, similiaq; habet idoneum non est. leuibus quoq; tumoribus facile subuenitur. at in eorum, qui nimis magni sunt, curatione periculum est. Tempus autem anni & autumnale & hibernum uitandum est. uer idoneum maxime est. ac prima aestas non aliena est. præter hæc abstinere pri die debet. neq; id satis est. sed alius quoq; ei ducenda est, quo facilius omnia quæ exæsserunt, intra alium confidant.

Quomodo aqua hydropicis emittatur.

Caput quintumdecimum.

Quam his qui hydropici sunt emitti oportere aliàs dixi.
 a nunc quemadmodum id fiat dicendum est. quidam autem sub umbilico ferè quattuor interpositis digitis à sinistra parte. Quidam ipso umbilico perforato facere consuerunt. quidam cute primum adusta, deinde interiore abdomine inciso. quia quod per ignem diuisum est, minus celeriter coit. ferramentum autem demittitur: magna cura habita ne qua uena inidatur. id tale esse debet, ut ferè tertiam digiti partem latitudo nucronis impleat. demittendumq; ita est: ut membranam quoque transeat: qua cito ab interiore parte finitur: cō tum plumbea aut ænea fistula coniicienda est, uel recuruatis in exteriorem partem labris, uel in media circum surgente, quadā mora ne tota inuis delabi possit. huius ea pars quæ intra paulo longior esse debet, quàm quæ extra, ut ultra ulteriorem membranam procedat, per hanc effundendus humor est. atq; ubi maior pars eius euocata est, cludenda demisso linuolo fistula est, & in uulnere, si id uisum non est: relinquenda. deinde per insequentes dies circa singulas heminas emittendum, donec nullum aquæ uestigium appareat. quidam tamen etiam non uisita cute protinus fistulam recipiunt, & super uulnus spongiam expressam deligant. deinde postero die rursus fistulam demittunt: quod recens uulnus paulum ductum patitur, ut siquid humoris superest, emittatur: idq; bis ita fecisse contenti sunt.

Nunquam autem venter ictu aliquo perforatur: sequi-
 turq; ut intestina euoluantur. quod ubi incidit, protinus con-
 siderandum est, an integra ea sint, deinde an his color suus
 maneat. si tenuius intestinum perforatum est, nihil profici posse iam
 retuli. latius intestinum sui potest, non quod certa fiducia sit, sed quod
 dubia spes, certa desperatione si potior. interdum enim glutinatur. tū
 si utrumlibet intestinum liuidum, aut pallidum, aut nigrum est, qui-
 bus illud quoq; necessario accedit, ut sensu careat: medicina omnis ina-
 nis est. si uero adhuc ea sui coloris sunt, cum magna festinatione suc-
 currendum est. Momento enim alienantur externo, & insueti spiritus
 circumdant. Resupinandus autem homo est coxis erectioribus. & si
 angustius vulnus est, quam ut intestina commode refundantur, inci-
 dendum est donec satis pateat. Ac si iam scitiora intestina sunt, perlu-
 enda aqua sunt: cui paulum admodum olei sit adiectum. tum mini-
 ster oras vulneris leniter diducere manibus suis, uel etiam duobus
 hamis membranæ interiori iniectis debet. medicus priora semper in-
 testina quæ posteriora prolapsa sunt, condere sic, ut orbium singuloris
 locum seruet: repositis omnibus, leniter homo concutendus est. quo fit
 ut per se singula intestina in suas sedes diducantur: & inibi considat.
 his conditis omentum quoq; considerandum est: ex quo si quid iam
 nigri, & emortui est, forfice excidi debet. si quid integrum est, leniter
 super intestina diduci. sutura autem neq; summæ cutis, neq; interioris
 membranæ per se satis proficit, sed utriusq;. & quidem duobus linis
 uincienda est spissior quam alibi, quia & rumpi facilius motu uen-
 tris potest, & non æque magnis inflammationibus pars ea exposita
 est. igitur in duas acus fila coniicienda, eaq; duabus manibus tenenda:
 & prius interiori membranæ sutura iniicienda est sic, ut sinistra
 manus in dexteriore ora, dextra in sinisteriore à principio vulne-
 ris orsa, ab interiori parte in exteriorem aciem immittat. quo fit, ut
 ab intestinis ea pars semper aciem longe sit, quæ retusa est: semel
 utraq; parte traiecta permutandæ acus inter manus sunt, ut ea sit in
 dextra, quæ fuit in sinistra: ea ueniat in sinistram, quam dextra con-
 tinuit. iterumq; eodem modo per oras immittendæ sunt. Atq; ita ter-
 tio, et quarto: deincepsq; permutatis inter manus acibus includenda
 plaga. post hæc eadem fila, eademq; acus ad cutem transferendæ.
 similiq; ratione ei quoq; parti utraq; sutura iniicienda semper ab in-
 teriore parte acibus uenientibus semper inter manus traiectis. deim
 glutinantia iniicienda, quibus aut spongram, aut succidam lanam ex
 aceto

aceto impressam accedere debere manifestius est, quàm ut semper dicendum sit. impositis his leuiter deligari uenter debet.

De interiore parte abdominis rupta, & quâ ratione curanda sit. Cap. XVII.

i Nterdum tamen uel ex ictu aliquo, uel retento diutius spiri-
tu, uel sub graui fasce interior abdominis membrana supe-
riore cute integra rumpitur. quod foeminis quoq; ex utero
sepe euenire consuevit, fitq; præcipue circa ilia. sequitur autem cum
superior caro mollis sit, ut non satis intestina contineat, hisq; intentæ
cutis indecore intumescat. atq; id quoq; aliter ab alijs curatur. quidã
enim per acum duobus linis ad inam basim immisissis, sic utrinque
deuinciunt, quemadmodum & in umbilico, & in uina positum est,
ut quicquid super uinculum est, emoriatur. quidam medium tumore
excidunt ad similitudinem myrtacei folij. quod semper eodem modo
seruandum esse iam posui, & tum oras sutura iungunt. commodissi-
mum est autem resupinato corpore, experiri manu qua parte is tu-
mor maxime cedat: quia necesse est ea parte rupta membrana sit,
quaq; integra est, ea magis obnitatur. tum qua rupta uidebitur, im-
mittendæ scalpello duæ lineæ sunt: ut ex ciso medio interior membra-
na utrinq; recentem plagam habeat. quia quod uetus est: sutura non
coit loco patefacto. si qua parte membrana non nouam plagam, sed
ueterem habet: tenuis excidenda habena est, quæ tantum ora eius ex-
ulceret. cætera, quæ ad suturæ reliquam curationem pertinent, supra
comprehensa sunt.

De uariis uentris.

p Ræter hæc euenit, ut in quorundam uentribus uarices sint:
quarum, quia nulla alia curatio est: quàm quæ in cruribus
esse consuevit, tum eam partem explanaturus hanc quoq; ediffero.

De testiculorum natura, & morbis eorum. Cap. XVIII.

u Enio autem ad ea: quæ in naturalibus partibus circa testicu-
los oriri solent. quæ quo facilius explicem, prius ipsius loci
natura paucis proponenda est. igitur testiculi simile quid-
dam medullis habent. nam sanguinem non emittunt, & omni sensu
carent. dolent autem in ictibus & inflammationibus tunice, quibus
hi continentur. dependent uero ab inguinibus per singulos nervos quos
αρεϊναι græci nominant: cum quorum utroq; binæ descendunt

Aurelij Cor.

9

Testiculi

Compositi

LIBER

Et uena, et arteria. hæ autem tunicae continguntur tenui, nervosa, si-
ne sanguine alba, quæ ἐλασποειδὴς à græcis nominatur. super eā na-
lentior tunica est: quæ interiori uehementer ima parte inhaeret, δῶρ-
ον græci uocant. Multæ deinde membranulae uenas et arterias, eosq;
nervos comprehendunt: atq; inter duas quoq; tunicas superioribus par-
tibus leues, paruuæq; sunt. hæcenus propria uirg; testiculo et ue-
lamenta, et auxilia sunt. communis deinde utriq; omnibusq; interio-
ribus sinus est, qui iam conspicitur à nobis, ὀρχέον græci, scrotum no-
stri uocant, etq; ab ima parte medijs tunicis leuiter innexus est, à supe-
riore tantum circumdatus est. sub hoc igitur plura uicia esse consue-
runt. quæ modo ruptis tunicis, quas ab inguinibus incipere proposui,
modo his integris fiunt. siquidem interdum uel ex morbo primum
inflammatur, deinde postea pondere abrumpitur. uel ex ictu aliquo
protinus rumpitur tunica, quæ diducere ab inferioribus partibus in-
testina debuit. tum pondere eo deuoluitur, aut omentum, aut etiam in-
testinum. atq; ibi reperta uia, paulatim, aut ab inguinibus inferiores
quoq; partes nisum subinde nervosas tunicas, et ob id eius rei patien-
tes diducit ἐντεροκοίλην, et ἐπιπλοκοίλην græci uocant, apud nos in-
decorum, sed commune his herniæ nomen est. deinde si descendit omē-
tum, nunq; in scroto tumor tollitur, siue inedia fuit, siue corpus huc il-
luc uel conuersum, aut aliquo modo collocatum. itemq; si retentus est spi-
ritus, non magnopere increscit. tactu uero inæqualis est, et mollis, et
lubricus. at si intestinum quoq; descendit, humor his sine inflamma-
tione modo minuitur, modo increscit. estq; ferè sine dolore, et cum
conquiescit aliquis aut iacet, interdum ex toto desidit, interdum sic di-
uiditur, ut in scroto exiguae reliquiae maneant. at si clamore et facie-
tate, et si sub aliquo pondere is homo nixus est, crescit: frigore omni
contrahitur: calore diffunditur. estq; tum scrotum, et rotundum, et
tactu leue: idq; quod subest: lubricum est, si pressum est, ad inguen re-
uertitur, demissumq; iterum cum quodā quasi murmure deuoluitur.
et id quidem in leuioribus malis euenit. nonnunq; autem stercore
accepto uastus tumet, retroq; compelli non potest: affertq; tum dolore,
et scroto, et inguinibus, et abdomini: nonnunq; stomachus quoque
affectus, primum ruffam bilem per os reddit, deinde uiridem, qui-
busdam etiam nigram. integris uero membranis interdum eam par-
tem humor distringit. atq; eius quoq; species duæ sunt: nam uel inter
tunicas is increscit, uel in membranis quæ ibi circa uenas et arteri-
as sunt, ubi hæ grauatæ oculauerunt. ac ne ei quidem humori, qui
inter tunicas est, una sedes est. nam modo inter summam et mediam,
modo inter mediam et imam consistit. græci communi nomine quic-

quid est ὁ ὄγκος ἰσχυρὸς appellant. nostri ut scilicet nullis discriminibus satis cognitis, hæc quoque sub eodem nomine, quo priora habent signa autem quædam communia sunt, quædam propria. communia quibus humor deprehenditur. propria: quibus loci humorem subesse dicimus. si tumor est nunquam ex toto se renitens: sed interdum leuior, aut propter famem, aut propter febriculam, maximeque in pueris, hisque mollis est, si non nimis humor subest. at si his uehementer increuit, renititur sic, ut uter repletus, et arte ascriptus. uenæ quoque in scroto instantur, et si digito prissimus, adu humor, circumfluentisque id, quod non premitur, attollit, et tanquam in vitro cornu'ne per scrotum apparet: usque quantum in ipso est, sine dolore est. sedes autem eius sic deprehenditur: si inter summam, mediamque tunicam est, cum digitis duobus pressimus, paulatim humor inter eos reuertens subit. scrotum ipsius et albidius est. si ducitur, aut nihil, aut paruum in tenditur. testiculus ea parte neque uisu, neque tactu sentitur. at si sub media tunica est, intentum scrotum magis se attollit, adeo ut superior coles sub tumore eo delitescat. præter hæc æque integris tunicis ramæ innascitur, ὁ ὄγκος ἰσχυρὸς græci appellant. uenæ intumescunt, hæ quoque intortæ, conglomeratæque ad superiorem partem, uel ipsum scrotum implent, uel mediam tunicam, uel imam: interdum etiam sub ima tunica circa ipsum testiculum, neruumque eius increuant. ex his ea quæ in ipso scroto sunt, oculis patent. hæ uero quæ nudæ, imæue tunice insident, ut magis conditæ, non æquæ quidem cernuntur, sed tamen etiam uisui subiectæ sunt, præterquam quod et tumoris aliquid est pro uenarum magnitudine et modo, et id prementi magis renititur, ac per ipsos uenarum toros inæquale est, et qua parte id est, testiculus magis iusto dependet. cum uero etiam super ipsum testiculum, neruumque eius id malum increuit, aliquanto longius testiculus ipse descendit, minorque altero fit, ut pote alimento amisso. Raro sed aliquando caro quoque inter tunicas increuit, ὁ ὄγκος ἰσχυρὸς græci uocant. interdum etiam ex inflammatione tumet ipse testiculus, ac febres quoque affert, et nisi celeriter ea inflammatio conquiescit, dolor ad inguina atque ilia peruenit: partesque hæ intumescunt. neruus, ex quo testiculus dependet, plenior fit, simulque indurescit super hæc, inguen quoque nonnunquam uarices implent: ὁ ὄγκος ἰσχυρὸς appellant.

De testiculorum curationibus communibus, et primo de inasione, et curatione inguinis, uel scroti. Caput. XIX.

h Is cognitis de curatione dicendum est, in qua quædam communia omnium sunt, quædam propria singulorum. prius de com-

q ü

LIBER

minibus dicam. loquar autem nunc de his, quæ scalpellum deside-
 rant: nam quæ uel sanari non possint, uel aliter nuriri debeant, di-
 cendum erit simul cum ad species singulas uenero. inciditur autē in-
 terdum inguen, interdum scrotum. in utraq; curatione homo ante tri-
 duum bibere aquam pridie: abstinere etiam à cibo debet, ipso autem
 die collocari supinus, deinde si inguen incidendum est, idq; iam pube
 contegitur, ante radendum est, & tum extento scroto, ut cutis inguinis
 intenta sit: id incidendum sub imo uentre, qua cum abdomine tunica
 inferiores committuntur. aperiendum autem audacter est. donec sum-
 ma tunica, quæ ipsius scroti est, incidatur: perueniaturq; ad eam, qua
 media est plaga facta. foramen deorsum uersus subest. in id demitten-
 dus est sinistræ manus digitus index, ut diductis interuenientibus me-
 branulis simul laxet. minister autem sinistra manu comprehenso scro-
 to sursum uersus eum debet extendere: & quàm maxime ab inguini-
 bus abducere, primum cum ipso testiculo, dum medicus omnes mem-
 branulas quæ super mediam tunicam sunt: si digito diducere non po-
 test, scalpello abscedat: deinde sine eo, ut is delapsus ipsi plagæ iunga-
 tur, digitoq; inde promatur, & super uentrem cum duabus suis tuni-
 cis collocetur. inde si qua uiciosa sunt, circumcidenda sunt. in quibus cum
 multæ uenæ discurrant, tenuiores quidem præcidi protinus possunt:
 maiores uero ante longiore lino deligandæ sunt, ne periculose sangui-
 nem fundant. sin media tunica uexata erit, aut sub ea malum incre-
 uerit, excidenda erit sic, ut alte ad ipsum inguen præcidatur. infra
 tamen non tota demenda est. nam quod ad basim testiculi uehementer
 cum ima tunica connexum est, excidi sine summo periculo nō potest.
 itaq; ibi relinquendum est. idem in ima quoq; tunica, si læsa est, faci-
 dum est. sed non à summa inguinis plaga, uerum infra paulum ea
 abscedenda, ne læsa abdominis membrana inflammationes moueat.
 neq; tamen nimium ex ea sursum relinquendum est, ne postea sinue-
 tur, & sedem eidem malo præstet. purgatus ita testiculus per ipsam
 plagam cum uenis, & arterijs, & neruo suo leuiter demittendus est,
 uidendumq; ne sanguis in scrotum descendat, ne ue concretus aliquo
 loco maneat. quæ ita fient, si uenis uinciendo medicus prospexerit. li-
 na quibus capita earum continebuntur, extra plagam dependere de-
 bebunt. quæ pure orto sine ullo dolore excidēt. ipsi autem plagæ inij-
 ciendæ duæ fibulæ sunt, & insuper medicamentum, quo glutinentur.
 solet interdum ab altera ora necessarium esse aliquid excidi, ut cicat-
 rix maior & latior fiat. quod ubi incidit, linamenta super non ful-
 cienda, sed leuiter tantum ponenda sunt. supraq; ea quæ inflamma-
 tionem repellant, id est ex aceto, uel lana succida, uel spongia, cætera
 eadem

eadem: quæ ubi pus moueri debet, adhibenda sunt. at cum infra inci-
di oportet, resupinato homine subiicienda sub scroto sinistra manus est,
deinde id uehementer apprehendendum & incidendum. si paruu-
lum est quod nocet, modice: ut tertia pars integra ad sustinendum te-
sticulum infra relinquatur. si maius est, etiam amplius, ut paulum
tantummodo ad inum, cui testiculus insidere possit: integrum mane-
at. sed primo rectus scalpellus quàm leuissima manu teneri debet, do-
nec scrotum ipsum diducat. tum inclinandus mucro est, ut transversa
membrana secet, quæ inter summam, mediamq; tunicam sunt. at si
uicium in proximo est, mediam tunicam attingi non oportet. si sub il-
la quoq; conditur, etiam illa incidenda est sic, ut tertia quoq; si illa ui-
cium tegit, ubicunq; repertum malum est, ministrum ab inferiore par-
te exprimere moderate scrotum oportet, medicum digito, manubriolo,
uel scalpello diductam inferiorem partem tunice extra collocare: de-
inde eam ferramento quo ad similitudinem curuum uocant, incide-
re sic, ut in eandem intrare duo digiti index & medius possint. his
deinde coniectis excipienda reliqua pars tunice, & inter digitos scal-
pellus immittendus est: eximendumq; aut effundendum quicquid est
noxium: quancunq; autem tunicam quis uolauit, illam quoq; debet
excidere, ac mediam quidem, ut supra dixi, quàm altissime ab ingui-
ne, imam autem paulo infra. cæterum anteq; excidantur, hæ quoque
uincari lino summe debent, & eius lini capita extra plagam relin-
quenda sunt, sicut in alijs quoq; uenis, quæ id requisierint. eo facto te-
sticulus intus reponendus est, oræq; scroti futuris inter se committen-
dæ, neq; paucis, ne parum glutinentur, & longior fiat curatio, neque
multis, ne inflammationem augeant. atq; hic quoq; uidendum est, ne
quid in scroto sanguinis maneat. tum imponenda glutinantia sunt.
si quando autem in scrotum sanguis defluxit, aliquidue concretum ex
eo decidit, incidi subter id debet, purgatoq; eo spongia acris aceto ma-
dens circumdari. deligatur autem uulnus omne, quod ex his causis fa-
ctum est. si dolor nullus est, quinque primis diebus non est resoluen-
dum, sed bis die tantum aceto irroranda lana uel spongia. si dolor
est: tertia die resoluendum, et ubi fibulæ sunt, hæ incidende, ubi lina-
mentum id mutandum est, rosasq; & uino madefaciendum id, quod
imponitur. si inflammatio increseat, adijciendum prioribus catapla-
sma ex lenticula & melle, uel ex malicorio, quod in austero uino co-
ctum sit, uel ex his mixtis. si sub his inflammatio non coquirit post
diem quintum multa calida aqua uulnus fouendum, donec scrotum
psum & extenuetur & rugosius fiat. tum imponendum catapla-
sma ex triticea farina, cui resina pinea adiecta sit. quæ ipsa si robu-

Aurelij Cor.

q ii

LIBER

stus curatur, ex aceto: si tener, ex melle coquenda sunt. neq; dubium est quodcunq; initium fuit, si magna inflammatio est, quin ea, quæ pus mouent, imponenda sint. quod si pus in ipso scroto ortum est, paulum id incidi debet, ut exitus detur. linamentumq; eatenus imponendum est, ut foramen tegat. inflammatione finita propter nervos priore cataplasmate, dein cerato utendum est. Hæc proprie ad eiusmodi vulnere pertinent. cætera & in curatione, & in victu similia his esse debent, quæ in alio quoq; vulnerum genere præcepimus.

De intestini curatione.

Cap. XX.

Is propositis ad singulas species ueniendum est: ac si cui par
h nulo puero intestinum descendit, ante scalpellum experien-
da iunctura est. fasciæ eius rei causa fit: cui imo loco pila
assuta est ex panniculis facta, quæ ad repellendum intestinum ipsi il-
li subijciatur: deinde reliqua fasciæ pars arcu circumdatur. sub quo
sæpe & intus compellitur intestinum: & inter se tunice glutinatur.
rursus si ætas processit, multumq; intestini descendisse ex tumore ma-
gno patet, adiungunturq; dolor, & uomitus quæ ex stercore, & ex cru-
ditate eo delapso ferè accidunt, scalpellum adhiberi sine pernitie non
posse manifestum est. leuandum tantummodo malum, & per alias
curationes extrahendum est. sanguis mitti ex brachio debet: deinde
si vires patiuntur, imperanda tridui abstinentia est: si minus certe
pro ui corporis quamlongissime. eodem uero tempore super haben-
dum cataplasma ex lini semine, quod ante aliquis ex mulso decoxe-
rit. Post hæc & farina hordeacea cum resina iniicienda, & his de-
mittendus in solium aquæ calidæ, cui oleum quoq; adiectum sit: dan-
dumq; aliquid cibi lenis calidi. quidam etiam aluum ducunt. id du-
cere aliquid in scrotum potest: educere ex eo non potest. per ea uero
quæ supra scripta sunt, leuato malo si quando aliàs dolor reuerterit,
eadem erunt facienda. sine dolore quoq; si multa intestina prolapsa
sunt, secari superuacuum est: non quo excludi à scroto non possint, nisi
tamen id inflammatio prohibuit: sed quo repulsa inguinibus im-
morentur: ibiq; tumorem excitent: atq; ita fiat mali non finis, sed mu-
tatio. at in eo, quem scalpello curari oportebit, simul atq; ad mediam
tuniciam vulnus in inguine factum peruenerit, duobus hamulis ea iux-
ta ipsas oras apprehendi debebit, dum eductis omnibus membranis
medicus eam liberat. neq; enim cum periculo læditur, quæ exci-
denda est, cum intestinum esse nisi sub ea non possit. ubi deducta autē
erit ab inguine, usq; ad testiculum incidi debebit sic, ne his ipse læda-

tur: tum excidi. ferè tamen hanc curationem puerilis ætas & modica cum malum recipit. sic uir robustus est, maiusq; id uicium est, extra hi testiculum non debet: sed in sua sede permanere. id hoc modo fit. inguen eadem ratione usq; ad mediã tunicam scalpello aperitur: eaq; tunica eodem modo duobus hamis excipitur sic, ut à ministro testiculus eatenus contineatur, ne per uulnus exeat: tum ea tunica deorsum uersus scalpello inciditur: sub eaq; index digitus sinistræ manus ad innum testiculum demittitur, eumq; ad plagam compellit: deinde dextre manus duo digiti pollex, atq; index uenam, & arteriam, & nervum, tunicamq; eorum à superiore tunica diducunt. quod si aliqua membranulæ prohibent, scalpello resoluuntur, donec ante oculos tota iam tunica sit. excisis quæ excidenda sunt, repositiq; testiculo ab ora quoq; eius uulneris, quod in inguine est, demenda habenula paulo latior est, quo maior plaga sit, & plus creare carnis possit.

De omenti curatione.

Cap. XXI.

Si omentum descendit, eodẽ quidem modo, quo supra scriptum est, aperiendum inguen, diducendæq; tunicae sunt. considerandum autem est, maior ne is modus, an exiguus sit. nam quod paruulum est, super inguen in alium uel digito, uel aureso specillo repellendum est. si plus est, sinere oportet dependere quantum ex utero prolapsum est: idq; adurentibus medicamentis illinere, donec emoriatur, & excidat. quidam hic quoq; duo lina acutis trahunt, binisq; singulorum capitibus diuersas partes astringunt. sub quo æque, sed tardius emoriatur. adiicitur tamen hic quoq; celeritati, si omentum super uinculum illinitur medicamentis, quæ sic exedunt ne erodant, omnia græci uocant. Fuerunt etiam qui omentum forfice præciderent: quod in paruulo nõ est necessarium. si maius est, potest profusionem sanguinis facere: siquidem omentum quoq; uenis quibusdam etiam maioribus illigatum est. neq; uero si disscisso uentre id prolapsum forfice præciditur, cum & emortuum sit, & aliter tutius auelli non possit: inde huc exemplum transferendum est. uulnus autem curari. si relictum omentum est, sutura debet. si id amplius fuit, & extra emortuum est, excisis oris, sicut supra propositum est. si uero humor intus est, incidendum est: in pueris quidem inguen, nisi in his quoq; liquoris eius maior modus prohibet: in uiris uero, & ubicunq; multus humor subest scrotum. deinde si inguen incisum est, eo protrectis tunicis humor effundi debet. si scrotum, & sub hoc protinus uicium est, nihil aliud quam humor est effundendus: at scidẽdæq; mē-

LIBER

branae sunt, si quae cum continuerunt, deinde eluendū id ex aqua, quae uel salē adiectum, uel nitrum habeat. si sub media, ima uel tunica: totae hae extra scrotum collocandae, excidendaeque sunt.

De ramicis curatione.

Cap. XXII.

1 *Amex* autem, si super ipsum scrotum est, adurendus est tenuibus & acutis ferramentis: quae ipsis uenis infigantur: cum eo, ne amplius quam has urant, maximèque ubi inter se implicatae glomerantur, eò ferrum id admonendum est: tum super farina ex aqua frigida subacta iniicienda est: utendumque eo uinculo, quod idoneum esse ani curationibus posui. tertio die lenticula cum melle imponenda est. post eiectionis crustis ulcera melle purganda: rosa implenda, ad cicatricem aridis linamentis perducenda sunt. quibus uero super mediam tunicam uenae tumunt incidendum inguen est, atque tunica promouenda, ab eaque uenae digito uel manubriolo scalpelli separanda. qua parte uero inhaerebunt: & ab superiore, et ab inferiore parte lino uinciendae: tum sub ipsis uinculis praecidendae, reponendusque testiculus est. at ubi supra tertiam tunicam ramex insedit, mediā excidi necesse est: deinde si duae, tres uel uenae tumunt, & ita pars aliqua obsidetur, ut maiore uicio uacet, idem faciendum, quod supra scriptum est, ut ab inguine & à testiculo deligatae uenae praecidantur: haeque condantur. sin totum id ramex obsederit: per plagam demittendus digitus index erit: subiiciendusque uenis sic, ut paulatim protrahat aequ adducendo, donec is testiculus par alteri fiat. tum fibulae oris sic uinciendae, ut simul eas quoque uenas comprehendant. id hoc modo fit. acus ab exteriori parte oram uulneris perforat. tum non per ipsam uenam, sed per membranam eius immittitur: per eamque in alterā orā compellitur. uenae uulnerari non debent, ne sanguinem fundant. membrana semper inter has uenas est, ac neque periculum affert, & filo comprehensas illas abunde tenet. itaque etiam satis est duas fibulas esse. tum uenae quaecumque protractae sunt in ipsum inguen aduerso specillo comprehendi debent. soluendi fibulas tempus inflammatione finita, & purgato uulnere est, & una simul, & oras, & uenas cicatrix deuinciat. ubi uero inter imam tunicam et ipsum testiculum, nervumque eius ramex ortus est, una curatio est, quae totum testiculū abscidit. nam neque ad generationem quicquam is confert et omnibus indecore, quibusdam etiam cum dolore dependet. sed totum quoque inguen incidendum media tunica promouenda: atque excidenda est: idem in ima faciendum, nervusque ex quo testiculus dependet praecidendus. post id uenae

et arteriæ ad inguen lino deligendæ et infra uinculum abscedendæ sunt.

De carne, quæ inter tunicas testiculorum concreuit,
et de neruo indurato. Cap. XXIII.

Aro quoq; si quando inter tunicas concreuit: nihil dubij est,
quin eximenda sit: sed id ipso scroto inciso fieri commodius
est. at si neruus induruit, curari res neq; manu, neq; medi-
camento potest. Urgent enim febres ardentes, et aut uirides, aut nigri
uomitibus, præter hæc ingens sitis et lingue aspritudo, ferèq; à die ter-
tio spumans bilis aluo cum rostone redditur. atq; neq; assumi facile ci-
bus, neq; contineri potest, neq; multo post extremæ partes frigescent:
tremor oritur: manus sine ratione extenduntur. deinde in fronte fri-
gidus sudor, eumq; mors sequitur.

De ramice inguinis. Cap. XXIII.

Si uero in ipso inguine ramex est, si tumor modicus est, se-
mel incidi, si maior, duabus lineis debet, ut medium exci-
datur: deinde non extracto testiculo: sicut intestinis quoque
prolapsis interdum fieri docui: colligendæ uenæ uinciendæq; ubi tuni-
cis inhærebunt, et sub his modis præcidendæ sunt. neq; quicquam
nouæ curationis uulneris eius requirit.

Ad tegendam glandem colis si nuda est. Cap. XXV.

B his ad ea transeundum est, quæ in cole ipso fiunt: in quo
si glans nuda est, nullq; aliquis eam decoris causa tegere,
fieri potest, sed expeditius in puero quàm in uiro: in eo, cui
id naturale est, quàm in eo, cui quarundam gentium more circunci-
sus est, in eo cui glans parua iuxtaq; eam cutis, spatiosior uero ipse
coles est, quàm in quo contraria his sunt. Curatio autem eorum, qui-
bus id naturale est, eiusmodi est. cutis circa glandem apprehenditur,
et extenditur, donec illam ipsam condat, ibiq; deligatur. deinde iuxta
pubem in orbem tergus inciditur: donec coles nudetur, magnaq; cura
cauetur ne uel urinae iter, uel uenæ, quæ ibi sunt, incidantur. eo facto
cutis ad uinculum inclinatur, nudaturq; circa pubem uelut circulus:
eoq; linamenta dantur, ut caro increseat et id impleat, satisq; uela-
menti supra latitudo plagæ præstat: sed donec cicatrix sit, uinctum
esse id debet, in medio tantum relicto exiguo urinae itinere. at in eo

LIBER

qui circumcissus est sub circulo glandis scalpello diducenda cutis ab inferiore cole est. non ita dolet, quia summo soluto deduci deorsum usque ad pubem manu potest: neque ideo sanguis profluit. Resoluta autem cutis rursus extenditur ultra glandem. tum multa frigida aqua foveatur: emplastrumque circa datur, quod valentem inflammationem reprimat. proximisque diebus ut propè à fame victus est, ne forte eam partem sacietas excitet: ubi iam sine inflammatione est, deligari debet à pube usque circum. super glandem autem aduerso emplastro imposito induci sic enim fit, ut inferior pars glutinetur: superior ita sanescat, ne inhæreat.

Quomodo glans penis contracta aperiri possit.

Contra si glans ita contracta est, ut nudari non possit: quod uicium græci φίμωσις appellant, aperienda est. quod hoc modo fit. Subter à summa ora cutis inciditur, recta linea usque ad frenum: atque ita superius tergus relaxatum cedere retro potest. quod si parum sic profectum est, aut propter angustias, aut propter duritiem tergoris, protinus triangula forma cutis ab inferiore parte excidenda est sic, ut uertex eius ad frenum basis in tergo extremo sit. tum super danda linamenta sunt: aliaque medicamenta, quæ ad sanitatem producant. necessarium autem est, donec cicatrix sit, conquiscere. nam ambulatio atterendo, ulcus sordidum reddit.

Infibulandi ratio.

Infibulare quoque adolescentulos, interdum uocis, interdum uoletudinis causa quidam consueverunt: eiusque hæc ratio est. cutis quæ super glandem est, extenditur: notaturque utrinque lateribus atramento qua perforatur: deinde remittitur. si super glandem notæ reuertuntur, nimis apprehensum est, et ultra notari debet. si glans ab his libera est, is locus idoneus fibulæ est: tum qua notæ sunt. cutis acu filum ducente transiit: eiusque filii capita inter se deligantur: quotidieque id mouetur, donec circa foramina cicatriculæ fiant. ubi hæ confirmatæ sunt, exempto filo fibula additur: quæ quomelior, eò lenior est: sed hoc quidem sæpius inter supernuacia, quam inter necessaria est.

De urinae reddendæ difficultate, et de calculo, curationibusque eorum. Cap. XXVI.

Es uero interdum cogit emoliri manu urinam, cum illa non redditur, aut quia senectute iter eius collapsum est: aut quia calculus, uel concretum aliquid ex sanguine intus se opposuit. ac me-

diocri quoq; inflammatio sepe eam reddi naturaliter prohibet: idq; non in uiris tantummodo, sed in foeminis quoq; interdum necessarium est. ergo aeneae fistulae fiunt, quae ut omni corpori ampliori, minoriq; sufficiant. ad mares tres, ad foeminas duae medico habendae sunt. ex uirilibus maxima decem et quinque est digitorum, media duodecim, minima nouem. ex mulieribus, maior nouem, minor sex. incuruas uero esse eas paulum, sed magis uiriles oportet, leuesq; admodum ac neq; nimis plenas, neq; nimis tenues. homo tum resupinus eo modo quo in curatione anis figuratur, super subsellum, aut lectum collocandus est. Medicus autem à dextro latere sinistra quidem manu colem masculi continere, dextra uero fistulam demittere in iter urinae debet. atq; ubi ad ceruicem uesicae uentum est, simul cum cole fistulam inclinatam in ipsam uesicam compellere, eamq; urina reddita recipere. Foemina breuius urinae similiter, & rectius iter habet. quod mammae simile inter imas oras super naturale positum non minus saepe auxilio eget. aliquanto minus difficultatis exigit. nonnunquam etiam prolapsus in ipsam fistulam calculus, qui subinde ea extenuatur, non longe ab exitu inhaerescit. eum si fieri potest, oportet uellere, uel oriculario specillo, uel eo ferramento, quo in sectione calculus protrahitur. si id fieri non potuit, cutis extrema quam plurimum attrahenda, & condita glande lino uincienda est: deinde à latere recta plaga coles incidendus, & calculus eximendus est. tum cutis remittenda. sic enim fit, ut incisum colem integra pars cutis contegat: & urina naturaliter profluat.

Quae curatio calculosis adhibeatur.

Ubi uesicae uero, calculiq; facta mentio sit, locus ipse exigere uidetur ut subiiciam, quae curatio calculosis, cum aliter succurri non potest, adhibeatur. ad quam festinare cum praecipue sit, nullo modo conuenit. ac neq; omni tempore, neq; in omni aetate, neq; in omni uicio id experiendum est: sed solo uere, in eo corpore quod iam nouem annos, nondum quatuordecim excessit: & si tantum mali subest, ut neq; medicamentis uinci possit, neq; etiam trahi posse uideatur, quo minus interposito aliquo spacio interimat. non quo non interdum etiam temeraria medicina proficiat: sed quo saepius utiq; in hoc fallat, in quo plura & genera, & tempora periculi sunt, quae simul cum ipsa curatione proponantur. Igitur ubi ultima experiri statutum est, ante aliquot diebus uictu corpus praeparandum est, ut modicos, ut salubres cibos, ut minime glutinosos assumat, ut aquam bibat. ambulandi uero

LIBER

inter hæc exercitatione utatur, quo magis calculus ad uesicæ cervicē descendat. quod an inaderit, digitis quoq; sicut in curatione docebo, demissis cognoscitur. ubi eius rei fides est, pridie is puer in ieiunio continendus est, & tum loco calido curatio adhibenda, quæ hoc modo ordinatur. homo prævalens & peritus in sedili alto confidit, supinumq; eum & aduersum super genua sua coxis eius collocatis comprehendit, reductisq; eius cruribus ipsum quoq; iubet manibus ad suas poplites datis, eos quam maxime possit attrahere, simulq; ipse sic eos continet. quod si robustius corpus eius est qui curatur, duobus sedilibus iunctis duo ualentes insidunt: quo & sedilia & interiora crura inter se delignantur, ne diduci possint. tum is super duorum genua eodem modo collocatur, atq; alter prout consedit sinistrum crus eius, alter dextrum, simulq; ipse poplites suos attrahit. siue autem unus, siue duo continent super humeros eius suis pectoribus incumbunt. ex quibus euenit, ut inter ilia sinus super pubem sine ullis rugis sit extensus, & in angustum compulsa uesica facilius calculus capi possit. Præter hæc etiam num à lateribus duo ualentes obijciuntur, qui circumstantes leuare uel unum, uel duos qui puerum continent non sinunt. Medicus deinde diligenter unguibus circumsis atq; sinistra manu duos eius digitos indicem & medium: leniter prius unum, deinde alterum in anum eius demittit, dextræq; digitos super inum abdomen leniter imponit: ne si utrinq; digiti circa calculum uehementer concurrerint, uesicam lædant. neq; uero festinanter in hac re, ut in plerisque agendum est, sed ita ut quam maxime id tuto fiat. nam læsa uesica neruorum distentiones cum periculo mortis excitat. ac primum circa cervicem queritur calculus. ibi repertus minore negotio expellitur. & ideo dixi ne curandum quidem: nisi cum in hoc inditijs suis cognitum est. si uero aut ibi non fuit, aut recessit retro, digiti ad ultimam uesicam dantur, paulatimq; dextra quoque manus eius ultra translata subsequitur. atque ubi repertus est calculus, qui necesse est in manus incidat, eò curiosius deducitur. quo minor, leuiorq; est, ne effugiat, id est ne sæpius agitata uesica sit. ergo ultra calculum dextra semper manus eius opponitur, sinistræ digiti deorsum eum compellit donec ad cervicem peruenitur. in quâ si oblongus est, sic compellendus est, ut pronus exeat. si planus sic, ut transuersus sit. si quadratus, ut duobus angulis sedeat. si altera parte plenior sic, ut prius ea, qua tenuior sit, euadat. in rotundo nihil interesse ex ipsa figura pater, nisi si leuior altera parte est, ut ea antecadat. cum id eò uenit, ut incidi super uesicæ cervicem iuxta anū cutis, plaga lunata usq; ad cervicē uesicæ debeat cornibus ad coxas spectantibus

paulum: deinde ea parte, qua strictior in ea plaga est etiam num sub-
 cute altera transversa plaga facienda est, qua ceruix aperiatur: donec
 urinae iter pateat sic, ut plaga paulo maior quam calculus sit. nam
 qui metu fistulae, quam illo loco *χορδα* graeci uocant, parum patefa-
 ciunt: cum maiore eodem periculo reuoluntur: quia calculus iter, cum
 ui promitur, facit: nisi accipit: idque etiam perniciosius est, si figura quoque
 calculi, uel asperitudo aliquid eo contulit: ex quo et sanguinis profu-
 sio, et distentio neruorum fieri potest. quae si quis euasit, multo tamen
 patientiorem fistulam habiturus est rupta ceruice, quam habuisset in-
 cisa: cum uero patefacta est, in conspectum calculus uenit, in cuius cor-
 pore nullum discrimen est. ipse si exiguus est, digitis ab altera parte
 propelli, ab altera protrahi potest. si maior: iniiciendus a superiore
 ei parte unius est eius rei causa factus. is est ad extremum tenuis, in
 semicirculi specie reclusae latitudinis, ab exteriori parte laevis, qua cor-
 pori iungitur, ab interiori asper, qua calculum attingit. isque longior
 potius esse debet. nam breuis extrahendi uim habet. ubi iniectus est,
 in utrumque latus inclinandus est, ut appareat calculus, et teneatur,
 quia si apprehensus est, ille simul inclinatur: ideoque eo minimo opus
 est. ne cum adduci unius coeperit, calculus intus effugiat, hic in oram
 uulneris incidat, eamque conuulneret. in qua re quod periculum esset.
 iam supra proposui. ubi satis teneri calculum patet, eodem penè mo-
 mento triplex motus adhibendus est in utrumque latus, deinde extra,
 sic tamen ut leniter id fiat, paulumque primo calculus attrahatur. quo
 facto attollendus unius extremus est, uti intus magis maneat, facili-
 usque illum producat. quod si aliquando a superiore parte calculus pa-
 rum commode comprehendetur, a latere erit apprehendendus. haec
 est simplicissima curatio. sed uarietas rerum quasdam etiam num
 animaduersiones desiderat. sunt enim quidam non asperi tantum-
 modo, sed spinosi quoque calculi, qui per se quidem delapsi in ceruicem
 sine ullo periculo eximuntur. in uescia uero non tuto uel hi conquirun-
 tur, uel attrahuntur. quoniam ubi illam conuulnerarunt, ex disten-
 tione neruorum mortem maturant, multoque magis si spina aliqua ue-
 siciae inhaeret: eamque, cum duceretur, duplicauit. colligitur autem eo quod
 difficilius urina redditur, in ceruice calculum esse: eo quod cruenta de-
 stillat, illum esse spinosum: maximeque id sub digitis quoque experiri-
 dum est, neque adhibenda manus, nisi id constitit. ac tum quoque leniter
 intus digiti obijciendi, ne uolenter promouendo conuulnerent. tum
 inadèdum. multi hic quoque scalpello usi sunt. meges, quoniam is infir-
 mior est: potestque in aliqua prominentia incidere, incisoque super illam
 corpore: qua cum subest non secare, sed relinquere, quod iterum

LIBER

incidi necesse sit. ferramentum fecit rectum in summa parte labrosum, in ima semicirculatum, acutumq; id receptum inter duos digitos indicem ac medium super pollice imposito sic deprimebat: ut simul cum carne, siquid ex calculo prominebat: incideret. quo consequeretur, ut semel quantum satis esset, aperiret. quocumq; autem modo cervice ea parte facta est, leniter extrahi quod asperum est, debet: nulla propter festinationem vi admota.

signa calculorum, uel harenosorum, uel mollium.

T calculus harenosus, & ante manifestus est: quoniam & urina quæ redditur, harenosa est, & in ipsa curatione, quoniam inter subiectos digitos neque æque leniter renititur, & insuper dilatatur. item mollis calculus, & ex pluribus minutisq; sed inter se parum astrictis compositus indicatur, in se attrahens quasdam quasi squamulas. hos omnis leniter permutatis subinde digitorum uicibus sic oportet abducere, ne uesicam lædant, ne uel intus aliqua dissipata reliquæ maneant. quæ postmodum curationi difficultatem faciant. quicquid autem ex his in conspectum uenit uel digitis, uel uno eximendum est. at si plures calculi sunt, singuli protrahi debent, sic tamen, ut si quis exiguus supererit, potius relinquatur. si quidem in uesica difficulter inuenitur. inuentusq; celeriter effugit. ita longa inquisitione uesica læditur: excitatq; inflammationes mortiferas, adeo ut quidam secti cum diu frustra q; per digitos uesica esset agitata, decesserint. quibus accedit etiam quod exiguus calculus ad plagam urina peste promouente excidit. si quando autem is maior non uidetur nisi rupta cervice extrahi posse, findendus est. cuius repertor Ammonius ob id laboriosus cognominatus est: id hoc modo fit. unguis inicitur calculo sic, ut facile eum concussum quoq; teneat, ne is retro reuoluetur. tum ferramentum adhibetur crassitudinis modicæ prima parte tenui, sed retusa, quod admodum calculum ex altera parte ictum findit: magna cura habita, ne aut ad ipsam uesicam per ferramentum perueniat, aut calculi fractura ne quid incidat.

De calculis foeminarum.

Hæ uero curationes in foeminis quoque similes sunt, de quibus tamen parum proprie quædam dicenda sunt. siquidem in his ubi paruulus calculus est, scalpellus supernaculus est, quia is urinam in cervicem non compellit: quæ & breuior q̃ in ma

ribus, & laxior est. ergo et per se saepe excidit, & si in primo quod est angustius inhaeret, eodem tamen uno sine ulla noxa educitur. at in maioribus calculis necessaria eadem curatio est. sed uirgini subijci digiti tanquam masculo mulieri per naturalia eius debent. tum uirgini quidem sub ima sinistiore ora. Mulieri uero inter urinae iter, & os pubis inadendum est sic, ut utroque loco plaga transversa sit, neque terri communit si plus ex muliebri corpore sanguinis profluit.

Quae curatio calculo euulso habenda sit.

Alculo euulso, si ualens corpus est, neque magnopere uexatum, sinere oportet sanguinem fluere, quo minor inflammatio oriatur: atque ingredi quoque eum paulum non alienum est, ut excidat, si quid intus concreti sanguinis mansit. quod si per se non destitit, rursus ne uis omnis intereat, suppressi debet. idque protinus in imbecillioribus ab ipsa curatione faciendum est. si quidem uis distentione neruorum periclitatur aliquis dum uescit eius agitur, sic alter metus excipitur remotis medicamentis, ne tantum sanguinis profluat, ut occidat. quod ne incidat, desidere his debet in acre acetum, cui aliquantum salis sit adiectum. sub quo & sanguis fere conquescit, et astringitur uescit, ideoque minus inflammatur. quod si parum proficiat, agglutinanda cucurbitula est, & inguinibus, & coxis, & super pubem. ubi iam satis uel euocatus est sanguis, uel prohibitus, resupinus collocandus est sic, ut caput humile sit, coxae paulum excitentur: ac super ulcus imponendum est duplex, aut triplex linteolum aceto madens. deinde interpositis duabus horis in solium is aquae calidae resupinus demittendus est sic, ut a genibus ad umbilicum aqua teneat, caetera uestimentis circumdata sint, manibus tantummodo, pedibusque nudatis, ut & minus digeratur, & ibi diutius maneat. ex quo sudor multus oriri solet, quo spongia subinde facile detergendum est: finisque eius fontis est donec infirmando offendat: tum multo is oleo perungendus, induendusque hapsus lanae mollis tepido oleo repletus: qui pubem & coxas & inguina & plagam ipsam contextam eodem ante se linteolo protegat, hisque subinde oleo tepido madesciendum est, ut neque frigus ad uesciam admittat, & neruos leniter molliat. quidam cataplasmatibus calefacientibus utuntur: ea plus pondere nocent, quae uesciam urgendo uulnus irritant, quod calore proficiunt. ergo ne uirgulum quidem ullum necessarium est: proximo die si spiritus diffusius redditur, si urina non excedit, si locus circa pubem mature intumuit. scire licet in uescia sanguinem concretum

LIBER

remansisse. igitur demissis eodem modo digitis leuiter pertractanda uescia est, et discutienda, si qua coierunt. quo fit ut per uulnus postea procedant. non alienum etiam est oriculario clystere acetum nitro mixtum per plagam in uesciam compellere. nam sic quoque discutiuntur, si qua cruenta coierunt. eaque facere etiam primo die conuenit. si timemus ne quid intus sit: maximaque ubi ambulando id elicere imbecillitas prohibuit, cetera eadem facienda sunt, ut demittatur in solium: ut eodem modo panniculus eadem lana super iniiciatur: sed neque sepe, neque tandiu in aqua calida puer habendus, quam adolescens est, in firmus, quam ualens: leui quam grauiore inflammatione affectus, is cuius corpus digeritur, quam his cuius astrictum est. inter haec uero si somnus est, et aequalis spiritus, et madens lingua, et sitis modica, et uenter inus, sed et mediocris est cum febre modica dolor, scire licet recte procedere curationem. atque in his inflammatio fere quinto uel septimo die finitur. qua leuata solum superuacuum est. supini tantummodo uulnus aqua calida fouendum est, ut si quid urinae rodet, abluatur. imponenda autem medicamenta sunt pus mouentia, et si purgandum ulcus uidebitur, melle linendum. id si rodet, rosa temperabitur. huic curationi aptissimum uidetur *εὐρεσσις* *μακροῦ* *εμπλάστρου*. nam et serum habet ad pus mouendum, et mel ad ulcus repurgandum: medulla etiam maximeque uitulina: quod in id ne fistula relinquantur, praecipue proficit. linamenta uero tum super ulcus non sunt necessaria, super medicamentum ad id continendum recte imponuntur. at ubi ulcus purgatum est: puro linamento ad cicatricem perducendum est. quibus temporibus tamen, si felix curatio non fuit, uaria circa pericula oriuntur. quae praesagire protinus licet: si continua uigilia est, si spiritus difficultas, si lingua arida est, si sitis uehemens, si uenter inus tumet, si uulnus hiat, si tranfluens urina id non rodit, si similiter ante tertium diem quaedam liuida excidunt, si is aut nihil, aut tarde respondet, si uehementes dolores sunt, si post die quintum magnae febres urgent, et fastidium cibi permanet, si cubare in uentrem iocundius est. nihil tamen peius est distentione neruorum, et ante nonum diem uomitus bilis. sed cum inflammationis sit metus, succurri abstinentia modicis et tempestiuis cibis, inter haec fomuntis, de quibus supra scripsimus. oportet.

De cancro qui excisa uescia nascitur, et qua curatione uti debeat.

Caput XXVII.

p Roximus cancri metus est. is cognoscitur, si et per uulnus, et per ipsum colem fluit sanies mali odoris, cumque eo quaedam à concreto

concreto sanguine non abhorrentia, tenuesq; atruncula lanulis similes: præter hæc si ora vulneris aridæ sunt: si dolent inguina: si febris non defuit, eaq; in noctem augetur: si inordinati horrores accedunt. Cōsiderandum autem est, in quam partem cancer is tendat. si ad colem indurescat his locus & rubet, & tactu dolorem exatrat, testiculiq; intumescunt. si in ipsam uesticam ani dolor sequitur, coxæ dure sciunt, non facile crura extendi possunt. at si in alterutrum latus oculis id expositum est, paresq; utrinq; easdē notas sed minores habet. primum autem ad rem pertinet corpus recte iacere, ut superior pars semper eadem sit in quam uicium fertur. ita si ad colem it, supinus his collocari debet. si ad uesticam, in uentrem, si in latus, in id quod integrius est. Deinde ubi uetum fuerit ad curationem, homo in aquā demittetur: in qua marrubium decoctum sit, aut cupressus, aut myrtus, idemq; humor clystere intus adijciatur. tum super ponetur lenticula cum malicorio mixta, quæ utraq; ex uino decocta sint, uel rubus, aut oleæ folia eodem modo decocta, aliaq; medicamenta, quæ ad cohibendos, purgandosq; caneros proposuimus. ex quibus si quæ erūt arida, per scriptorium calamum inspirabuntur. ubi stare cœperit cancer, mulso uulnus eluetur. uitabiturq; eo tempore ceratum quod ad recipiendum id malum corpus emollit, potius plumbum elotum cum uino inungetur. super quæ idem linteolo illitum imponetur: sub quibus perueniri ad sanitatem potest. cum eo tamen quod non ignoremus orto cancro sæpe affici stomachum, cui cum uestica quoddam consortium est: exq; eo fieri ut neq; retineatur cibus, neq; si quis retentus est, concoquatur: neq; corpus alatur: ideoq; ne uulnus quidem aut purgari, aut ali possit: quæ necessario mortem maturant. sed ut his succurri nullo nodo potest, sic à primo tamen diu tenenda ratio curationis est. in qua quædam observatio ad cibum quoq; potionemq; pertinet. necessaria est: nam cibus inter principia non nisi humidus dari debet. ubi uulnus purgatum est, ex media materia olera, & salsamenta semper aliena sunt. potione opus est non modica: nam si parum bibitur, accenditur uulnus, & uigilia urget, & uis corporis minuitur. si plus æquo assumitur, subinde uestica impletur, eoque irritatur. non nisi aquam autem bibendam esse manifestus est, quam ut subinde dicendum sit. solet uero sub eiusmodi uictu uenire ut alius non reddatur. Hæc aqua ducenda est, in qua uel fœnum græcum, uel malua decocta sit. idem humor rosa mixtus in ipsum uulnus oriculario clystere agendus est: ubi id rodit urina neq; purgari patitur. Ferè uero primo per uulnus exit hæc, deinde eo sanesciente diuiditur, et pars per colem descendere incipit, donec ex toto plaga claudatur: quod in-

Aurelij Cor.

r.

terdum tertio mense, interdum non ante sextum, nonnunquam ex acto
quoq; anno fit. neq; desperari debet solida glutinatio vulneris, nisi
ubi aut uehementer rupta ceruix est, aut ex cancro multæ, magnæq;
caruncule, simulq; nervosa aliqua exciderunt. sed ut uel nulla ibi
fistula, uel exigua admodum relinquatur, summa cura providendum
est. Ergo cum iam ad cicatricem uulnus intendit, extētis iacere foemina
nibus, & cruribus oportet: nisi tamen molles, harenosi uel calculi fue
runt. sub his enim tardius uesica purgatur. Ideoq; diutius plagam pa
tere necessarium est: et tum demum ubi iam nihil tale extra fertur,
ad cicatricem perducta quod si antequam uesica purgata est: oræ se glu
tinarunt: dolorq; & inflammatio redierunt, uulnus digitis uel ad
uerso specillo diducendum est, ut torquentibus exitus detur: hisq; effu
sis tum diutius pura urina descendat. tum demum quæ cicatricem in
ducant, imponenda sunt: extendiq; ut supra docui pedes quam ma
xime iuncti. quod si fistulæ metus ex his causis, quas proposui, subesse
uidebitur, quo facilius claudatur ea, uel certe coaguletur, in anum
quoq; danda plumbea fistula est: extentisq; cruribus foemina, taliq;
inter se deligandi sunt, donec qualis futura est, cicatrix sit.

Si naturalia foeminarum concubitus non admittunt, quo
modo curari conueniat. Cap. XXVIII.

T hoc quidem commune esse maribus, & foeminis potest
e proprie uero quedā ad foeminas pertinent, ut in primis:
quod earum naturalia nonnunquam inter se glutinatis oris
concubitus non admittunt. idq; interdum euenit protinus in utero
matris: interdum exulceratione in his partibus facta, & per malam
curationem his oris sanescendo iunctis. si ex utero est, membrana ori
uulue opposita est. si ex ulcere, atro id repleuit. oportet autem mem
branam duabus lineis inter se transuersis incidere ad similitudinē
litteræ X. magna cura habita ne urina iter uioletur. deinde undique
eam membranam excidere: ac si atro increuit, necessarium est recta
linea patefacere. tum ab ora, uel uulsella, uel hamo apprehensam tan
quam habenulam excidere: & intus implicatum in longitudinem li
namentum, ὀνύριον uel græci uocant, in aceto tinctum demittere: su
praq; succidam lanam aceto madentem deligare: tertio die soluere
ulcus, & si cut alia ulcera curare. cumq; iam ad sanitatem tendet,
plumbeam fistulam medicamento cicatricem inducente illinere, eamq;
intus dare. supraq; idem medicamentum inijcere, donec ad cicatricē
plaga perueniat.

Quauratione partus emortuus ex utero excutitur. Cap. XXIX.

Bi concipit autem aliqua si iam propè maturus partus in-
 tus emortuus est, neq; ex cadere per se potest, adhibenda cu-
 ratio est, quæ numerari inter difficillimas potest. nam &
 summam prudentiam, moderationemq; desiderat: & maximum pe-
 riculum affert. sed ante omnia uulvæ natura mirabilis, cum in mul-
 tis alijs, tum in hac re quoq; facile cognoscitur. oportet autem ante o-
 mnia resupinam mulierem transuerso lecto sic collocare, ut feminibus
 eius ipsius ilia comprimantur. quo fit ut & imus uenter in conspe-
 ctu medici sit: & infans ad os uulvæ compellatur: quæ emortuo par-
 tu id comprimit: ex intervallo uero paulum dehiscere. hac occasione
 usus medicus unciæ manus indicem digitum primum debet infere-
 re, atq; ibi continere, donec iterum ad os aperiatur: rursusq; alterum
 digitum demittere debebit, & per easdē occasionēs alios, donec tota
 esse intus manus possit. ad cuius rei facultatem multum confert &
 magnitudo uulvæ, & uis nervorum eius, & corporis totius habitus,
 & mentis etiam robur: cum presertim intus nonnunq; etiā duæ ma-
 nus dari debeant. pertinet etiā ad rem quācalidissimum esse imū
 uentrem, & extrema corporis, neq; dum inflammationem coepisse,
 sed recenti re protinus adhiberi medianam. nam si corpus iam in-
 tumuit, neq; demitti manus, neq; educi infans nisi ægerrime potest, se-
 quiturq; sæpe cum uomitu & cum tremore mortifera nervorum di-
 stentio. uerum intus emortuo corpori manus injecta protinus habitū
 eius sentit. nam aut in caput, aut in pedes conuersum est, aut in trās-
 uersum iacet: ferè tamen sic, ut uel manus eius, uel pes in propinquo
 sit. Medici uero propositum est, ut eum manu dirigat uel in manus,
 uel etiam in pedes. si forte aliter compositus est, ac si nihil aliud est,
 manus uel pes apprehensus, corpus rectius reddit: nam manus in ca-
 put, pes in pedes eum conuertet. tum si caput proximum est, demitti
 debet uncus undiq; levis acuminis breuis, qui uel oculo, uel auri, uel
 ori, interdum etiam fronti recte inijcitur, deinde attractus infantem
 educit: neq; tamen quolibet his tempore extrahi debet. nam si com-
 presso uulvæ ore id tentatum est, nō emittente eo infans abruptitur:
 & unci acumen in ipsum os uulvæ delabitur: sequiturq; nervorum
 distentio, & ingens periculum mortis. igitur compressa uulua, conge-
 scere. hiante, leniter trahere oportet: & per has occasionēs paulatim
 eum educere. trahere autē dextra manus uncum, sinistra intus posi-
 ta infantem ipsum: simulq; dirigere eum debet. Solet etiam euenire,
 ut is infans humore distendatur: exq; eo profuāt fœdi odoris sanies.

LIBER

quod si tale est, indice digito corpus illud forandum est, ut effuso humore extenuetur. tum id leniter per ipsas manus recipiendum est. nam unguis iniectus facile hebeti corpusculo eleuabitur. in quo quid periculi sit, supra positum. sed in pedes quoque conuersus infans non difficulter extrahitur: quibus apprehensis per ipsas manus commode educitur. si uero transuersus est, neque dirigi potuit, unguis alae iniiciendus, paulatimque attrahendus est. sub quo fere ceruix replicatur, retroque caput, ac reliquum corpus spectat. remedio est ceruix praecisa, ut separatim utraque pars auferatur, id unco fit, qui priori similis in anteriorem tantum partem per totam aciem exacuitur: tum id agendum est, ut ante caput, deinde reliqua pars auferatur: quia fere maiore parte extracta, caput in uacuum uuluum prolabitur, extrahi que sine summo periculo non potest: si tamen id incidit, super uentrem mulieris duplici panniculo iniecto, ualens homo non imperitus a sinistro latere eius debet assistere, et super imum uentrem eius duas manus imponere, alteraque alteram premere. quo fit ut illud caput ad os uulvae compellatur. idque eadem ratione quae supra posita est, unco extrahitur. at si pes alter iuxta repertus est, alter retro cum corpore est, quicquid protractum est, paulatim abscidendum est: et si clunes os uulvae urgere coeperunt, iterum retro repellendae sunt. conquiritusque pes eius adducendus. aliaeque etiam num difficultates faciunt, ut qui solidus non exit, concisus eximi debeat. quotiens autem infans protractus est, tradendus ministro est. is eum supinis manibus sustinere, medicus deinde sinistra manu leniter trahere umbilicum debet, ita ne abrumpat, dextraque eum sequi usque ad eas, quas secundas uocat. quod uelamentum infantis intus fuit. hisque ultimis apprehensis uenulas, membranulasque omnes eadem ratione manu diducere a uulua, totumque illud extrahere. et si quid intus praeterea concreti sanguinis remanet, tum compressis in unum feminibus, illa conclauis collocanda est, modicum calorem sine ullo praestatu habente. super imum uentrem eius imponenda lana succida in aceto, et rosa tincta. reliqua curatio talis esse debet, qualis in inflammationibus, et in his uulneribus, quae in neruosis locis sunt, adhibeatur.

De ani uicijs, et eorum curatione. Cap. XXX.

Ni quoque uicia ubi medicamentis non uincuntur, manus auxilium desiderant. ergo si qua scissa in eo uetustate induruerunt, iamque callum habent, commodissimum est ducere alium: tum spongiam calidam admoovere, ut relaxentur illa, et foras prodeant. ubi in conspectu sunt, scalpello singula excidere, et ulcera remouere.

remouere. deinde imponere linamentum molle, & super linteolum illitum melle, locumq; eum molli lana implere & ita uincere altero die, deincepsq; cæteris lenibus medicamentis uti: quæ ad recentia eadē uicia necessaria esse aliàs proposui: & utiq; per primos dies sorbitionibus eum sustinere paulatim: deinde cibus adijcere aliquid generis tamen eius, quod eodem loco præceptum est. si quando autem ex inflammatione pus in his oritur, ubi primum id apparuit incidendum est, ne anus ipse suppuret. neq; tamen ante properandum est. nam si cruidum incisum est, inflammationis multum accedit: & puris aliquanto amplius conatatur. his quoque uulneribus lenibus cibus, hisdemq; medicamentis opus est.

De condylomatum curatione.

Tubercula, quæ *νοδὺλῶματα* appellantur, ubi induruerunt, hac ratione curantur. alius ante omnia ducitur. tum uolsella tuberculum apprehensum iuxta radices exciditur. quod ubi factum est eadem sequuntur, quæ supra post curationem adhibenda esse proposui. tantummodo si quid increuit squama aris concredendum est. ora etiam uenarum fundentia sanguinem sic tolluntur. ubi sanguini, qui effluit, sanies adijcitur: alius acrius ducitur, quo magis ora promoueantur. eoq; fit, ut omnes uenæ, quasi capitula conspicua sint. tum si capitulum exiguum est, basimq; tenuem habet, astringendum lino paulum supra est, quam ubi cum ano committitur. imponenda spongia aqua calida est, donec id libeat. deinde aut ungue, aut scalpello supra nodum id exulcerandum est. quod nisi factum est, magni dolores subsequuntur. interdum etiam urinae difficultas. si id maius est, & basis latior, hamulo uno aut altero excipiendum est: paulumq; supra basim incidendum: neq; relinquendum quicquam ex eo capitulo: neq; quicquam ex ano demendum est. quod consequitur his, qui neq; nimium, neq; parum hamos ducit. qua incisum est, acis debet immitti: infraq; eam lino id capitulum alligari: si duo, triaue sunt, unum quodq; primum curandum est. si plura, non omnia simul, ne tempore eodem undiq; teneræ cicatrices sint. si sanguis profluit, excipiendus est spongia: deinde linamentum imponendum. ungenda foramina, & inguina, & quicquid iuxta ulcus est. ceratumq; superandum est. farina ordeacea calida implendusq; is locus est. sic deligandus est. postero die is desidere in aqua calida debet: eodemq; cataplasmate foveri. ac bis die, & ante curationem, & post eam ceruices, ac femina liquido cerato perungenda sunt: tepidoq; is loco continendus. interpositis quinque, aut sex diebus oriculario specillo linamenta edu-

Aurelij Cor.

r iij

LIBER

enda. si capitula simul non exciderunt, digito promouenda. tum leni-
bus medicamentis hisdemq; quæ alibi posui, ulcera ad sanitatem per-
ducenda. finito uicio quemadmodum agendum esset, iâ aliâs superius
exposui.

De uaricum curatione. Cap. XXXI.

His ad crura proximus transitus est. in quibus orti uarices
non difficili ratione tolluntur. huc autem et earum uenu-
larum, quæ in capite nocent, et eorum uaricum, qui in uen-
tre sunt, curationem distuli: quoniam ubiq; eadem est. igitur uena ois,
quæ noxia est, aut adusta tabescit: aut manu exciditur. si recta est,
si quamuis transversa, tamen simplex: si modica est, melius aduritur. si
curua est et uelut in orbes quosdam implicatur, pluresq; inter se
inuoluuntur, utilius eximere est: adurendi ratio hæc est. cutis super
inciditur. tum patefacta uena tenui, et retuso ferramento candente
modice præmitur: nitaturq; ne plage ipsius oræ adurantur: quas re-
ducere hamulis facile est. id interpositis ferè quaternis digitis per. to-
tum uaricem fit: et tum superimponitur medicamentum, quo adusta
sanantur: at exciditur hoc modo. cute eadem ratione super uenam in-
cisa hamulo oræ excipiuntur: scalpelloq; undiq; à corpore uena didu-
citur: caueturq; ne inter hæc ipsa lædatur: eiq; retusus hamulus subij-
citur, interpositoq; eodem ferè spacio. quod supra positum est, in eadē
uena idem fit, quæ quo tendat, facile hamulo extento cognoscitur. ubi
iâ idem, quacumq; uarices sunt, factum est, uno loco adducta per
hamulum uena præciditur: deinde qua proximus hamus est, attra-
hitur, et euellitur: ibi rursus absciditur. ac sic undiq; uariabus cru-
re liberato, tum plagarum oræ committuntur: et super emplastrum
glutinans injicitur.

Curatio digitorum coherentium. Cap. XXXII.

Si digiti uel in utero protinus, uel propter communē exul-
cerationem postea cohæserunt, scalpello diducuntur. dein se-
paratim uterq; non pingui emplastro circumdatur. atq; ita
per se uterq; sanescit. si uero sit ulcus in digito, posteaq; male indu-
cta cicatrix curuum eum reddit, primū malagma tentandum est.
dein si id nihil prodest, quod et in ueteri cicatrice, et ubi nerui læsi
sunt, euenire consuevit: uidere oportet nerui ne id uicium, an cutis sit.
si nerui est, attingi non debet, neq; enim sanabile est. si cutis, tota cica-
trix excidenda est: quæ ferè callosa efficit, ut extendi digitem non
patitur: tum rectus sic ad nouam cicatricem perducendus est.

Angrena inter ungues, alasq; aut inguina nasci: Et si quan-
do medicamenta uincuntur, membrū præcidi oportere, alio
loco mihi dictum est. sed id quoq; cū periculo summo fit:
nam sæpe in ipso opere, uel profusione sanguinis, uel animæ defectio-
ne moriuntur. uerum hic quoq; nihil interest an satis actum præsi-
dium sit: quod unicum est. igitur inter sanam, uitiatamq; partem in-
cidenda scalpello caro usq; ad os est sic, ut neq; contra ipsum articu-
lum id fiat: Et potius ex sana parte aliquid excidatur, quàm ex æ-
gra relinquatur. ubi ad os uentum est, reducenda ab eo sana caro, Et
circa os subsecanda est, ut ea quoq; parte aliquid os nudetur: dein id
ferrula præcidendum est, quàm proxime sanæ carni etiam inhaeren-
ti. ac tum frons ossis, quam seruula exasperauit, leuanda est, supraq;
inducenda cutis, quæ sub eiusmodi curatione laxa esse debet ut quā
maxime undiq; os contegat. quo cutis inducta non fuerit id linamen-
tis erit contegendum, Et super id spongia ex aceto deliganda. cætera
postea sic faciēda, ut in uulneribus, in quibus pus moueri debet, præ-
ceptum est.

LIBER OCTAVVS.

De positu, Et figura totius humani corporis. Caput primum.

Vperest ea pars, quæ ad ossa pertinet. quæ quo faci-
lius accipi possit, prius positus, figurasq; eorum indi-
cabo. Igitur caluaria incipit ex interiore parte conca-
ua, extrinsecus gibba, utrinq; leuis, Et qua cerebri
membranam contegit. Et qua cute capillum gignente
contegitur. eaq; simplex ab occipitio Et temporibus, duplex usque in
uerticem à fronte est. ossaq; eius ab exterioribus partibus dura, ab
interioribus, quibus inter se connectuntur, molliora sunt. interq; ea
uenæ discurrunt, quas his alimentum subministrare credibile est. ra-
ro autem caluaria solida sine suturis est. locis tamen æstuosis facilius
inuenitur. Et id caput firmissimum, atq; à dolore tutissimum est: ex
cæteris, quo suturæ pauciores sunt, eo capitis ualetudo commodior est.
neque enim certus earum numerus est, sicut ne locus quidem: ferè
tamen duæ super aures, tempora à superiore capitis parte discret-
unt. tertia ad aures per uerticem tendens, occipitium à summo ca-
pite diducit. quarta ab eodem uertice per medium caput ad frontem

r iiij

LIBER

procedit, eaq; modo sub imo capillo desinit: modo frontem ipsam secans inter supercilia finitur. ex his ceterae quidem suturae in unguem committuntur. haec uero quae super aures transuersae sunt, totis oris paulatim extenuantur: atq; ita inferiora ossa superioribus leniter insidunt. crassissimum uero in capite os post aurem est, quia capillus ut uerisimile est, ob id ipsum non gignitur. sub his quoq; musculis, qui tempora connectunt, os medium in exteriorem partem inclinatum positum est. at facies suturam habet maximam, quae à tempore incipiens per medios oculos, naresq; transuersa peruenit ad alterum tempus: à qua breues duae sub interioribus angulis deorsum spectant. et malae quoq; in summa parte singula transuersas suturas habent. à medijsq; naribus, aut superiorum dentium ginguis per medium palatum una procedit: aliaq; transuersa idem palatum secat. et suturae quidem in plurimis haec sunt. foramina autem intra caput maxima oculorum sunt: deinde narium, tum quae in auribus habemus: ex his quae oculorum sunt, recta, simpliciaq; ad cerebrum tendunt. narium duo foramina osse medio discernuntur. siquidem haec primum à supercilijs, angulisq; oculorum osse inchoantur ad tertiam ferè partem: deinde in cartilagine uersae quo propius ori descendunt, eo magis caruncula quoq; molliuntur. sed ea foramina quae à summis ad imas nares simplicia sunt, ibi rursus in bina itinera diuiduntur. aliaq; ex his ad fauces peruia spiritum et reddunt, et accipiunt: alia ad cerebrum tendunt. in ultima parte in multa, et tenuia foramina dissipantur, per quae sensus odoris nobis datur: in aure quoq; primo rectum, et simplex iter procedendo flexuosum fit. quod ipsum iuxta cerebrum in multa et tenuia foramina diducatur, per quae facultas audiendi est: iuxtaq; ea duo paruuli quasi sinus sunt. superq; eos finitur os: quod transuersum à genis tendens ab inferioribus ossibus sustinetur: iugale appellari potest ab eadem similitudine à qua id graeci *ζυγώδες* appellant. maxilla uero est molle os, eaq; una est, cuius eadem et media, et etiam ima pars mentum est: à quo utrinq; procedit ad tempora: solaq; ea mouetur. nam malae cum toto osse, quod superiores dentes exigit, immobiles sunt. uerum ipsius maxillae partes extremae quasi bicornes sunt. alter procerus intra latior uertice ipso tenuatur: longiusq; procedens sub osse iugali subit: et super id temporis musculus illigatur. alter breuior, et rotundior, et in eo sinus qui iuxta foramina auris est, cardinis modo fit: ibiq; huc, et illuc se inclinans, maxillae facultatem motus praestat. duriores osse dentes sunt. quorum pars maxillae, pars superiori ossi malarum haeret. ex his quaterni primi quia secant, *τεμνῖνοι* à graecis nominantur. hi deinde

quattuor caninis dentibus ex omni parte cinguntur. ultra quos utrinque
 ferè maxillares quaterni sunt, præterque in his, in quibus tres ultimi, qui
 sero gigni solent: non increuerunt. ex his priores singulis radicibus,
 maxillares utique binis, quidam etiam ternis, quaternis ueniantur.
 Fereque longior radix breuiorem dentem edit: rectique dentis recta etiam
 radix, cui flexa est: exque eadem radice in pueris nouus dens subit:
 qui multo sæpius priorem expellit: interdum tamen supra, infraue
 eum se ostendit. caput autem spina excipit. ea constat ex uertebis qua-
 tuor et uiginti. septem in ceruice sunt: duodecim ad costas. reliquæ
 quinque sunt proximæ costis. hæc teretes, breuesque ab utroque latere pro-
 cessus duos exigunt. mediæ perforatæ, quæ spinæ medulla cerebro com-
 missa descendit circa quoque per duos processus tenuibus cuius peruiæ,
 per quæ à membrana cerebri similes membranulæ deducuntur. om-
 nesque uertebæ exceptis tribus summis à superiore parte in ipsis
 processibus parum desidenti sinus habent: ab inferiore alios deorsum
 uersus processus tenuibus, cuius peruiæ per quæ à membrana ce-
 rebri similes membranulæ deducuntur. omnesque uertebæ exceptis
 tribus summis à superiore parte in ipsis processibus parum desiden-
 tis sinus habent: ab inferiore alios deorsum uersus processus exigunt.
 summa igitur protinus caput sustinet, per duos sinus receptis exiguis
 eius processibus. quo fit, ut caput sursum deorsum uersum tuberculis
 exasperetur: secunda superiori parti inferiore. quæ ad arcum perti-
 net, pars summa angustiore orbe finitur. Itaque superior summæ cir-
 cundata, in latera quoque caput moueri sinit. tertia eodem modo secun-
 dam excipit: ex quo facilis ceruicæ mobilitas est. ac ne sustinere quidem
 caput posset, nisi utrinque recti, ualentesque nerui collum continerent: quos
 ζευκταὶ græci appellant. siquidem horum inter omnes flexus alter
 semper intentus ultra prolabi superiora non patitur. iamque uerte-
 bra tertia tubercula quæ inferiori inferantur, exigit. cæteræ proces-
 sibus deorsum spectantibus in inferiores insinuantur: ac per sinus
 quos utrinque habent, superiores accipiunt: multisque neruis, et multa
 cartilagine continentur. ac sic uno flexu modico in promptum dato,
 cæteris negocijs homo, et rectus insistit: et aliquid ad necessaria ope-
 ra curuatur. infra ceruicem uero summa costa contra humeros sita
 est: inde undecim inferiores usque ad imum pectus perueniunt: hæcque
 primis partibus rotundæ, et leniter quasi capitulatæ uertebrearum
 transuersis processibus ibi quoque paulum insinuatim inhaerent. inde
 patefunt: et in exteriorem partem recuruatæ, paulatim in cartilagi-
 nem degenerant. eaque parte rursus in interiora leniter flexe commit-
 tuntur cum osse pectoris. quod ualens, et durum à faucibus incipit, ab

LIBER

utroq; latere lunatum, & à præcordijs iam ipsum quoq; cartilagine
mollitiam terminatur. sub costis uero prioribus, quinq; quas uocant græ
ci nominant, breues, tenuioresq; atq; ipsæ quoq; paulatim in cartila
ginem uersæ, extremis abdominis partibus inhaerescunt. imaq; ex
his maiore iam parte nihil nisi cartilago est. rursus à cervice duo la
ta ossa utrinq; ad scapulas tendunt. nostri scapula aperta, ὠμοπλά
ται græci nominant. ea in summis uerticibus sinuata, ab his triangu
la, paulatimq; lateſcentia ad spinam tendunt: & quo latiora quaq;
parte sunt hoc hebetiora, acq; ipsa quoq; in imo cartilaginosa poste
riore parte uelut innatant, quoniam nisi in summo nulli ossi inhae
rescunt. ibi uero ualidis musculis, nervisq; constricta sunt. at à sum
ma costa paulo interius quàm ubi ea media est, os excreſcit: ibi quidē
tenue, procedens uero quo propius lato scapularum ossi fit, eo plenius,
latiusq; & paulatim in exteriora curuatum. quod propius, altera
uerticis parte modice intumescens, sustinet ingulum. id autem ipsum
recuruum, ac neque inter durissima ossa numerandum: altero capite
in eo quod posui, altero in exiguo sinu pectoralis ossis insidit, paulūq;
motu brachij mouetur: & cum lato osse scapularum infra caput, eius
nervis, & cartilagini connectitur. hinc humerus incipit extremis
utrinq; capitibus tumidus, mollis, sine medulla cartilaginofus. medius
teres, durus, medulloſus, leniter gibbus, & in priorem & posteriorem,
interiorem & exteriorem partem. prior autem pars est quæ à pecto
re est, posterior quæ ab scapulis, interior quæ ad latus tendit: exteri
or quæ ab eo recedit. quod ad omnes articulos pertinere in ulteriori
bus patebit. superius autem humeri caput rotundius quàm cætera
ossa, de quibus adhuc dixi, uerticillatis scapularum ossibus paruo ex
cessu inseritur: ac maiore parte ex transitu nervus deligatur. at infe
rius duos processus habet: inter quos quod medium est, magis etiā ex
tremis partibus sinuatur. quæ res sedem brachio præstat: quod con
stat ex ossibus duobus. radius, quam ῥαδις græci appellant, supe
rior, breuiorq; & primo tenuior rotundo, & leniter cauo, capite exi
guum humeri tuberculum recipit: atq; ibi nervus, & cartilagine conti
nuitur. cubitus inferior, longiorq; & primo plenior in summo capite,
duobus quasi uerticibus extantibus in sinu humeri, quem inter duos
processus eius esse proposui, se inserit. primo uero duobus radijs bra
chij ossa iuncta paulatim dirimuntur: rursusq; ad manū coeunt mo
do crassitudinis mutato: siquidem ibi radius plenior, cubitus admodū
tenuis est. dein radius in caput cartilaginofum consurgens, in uerti
cem eius sinuatur. cubitus rotundus in extremo, parte altera paulū
procedit. ac ne sæpius dicendum sit, illud ignorari non oportet. plu

rima ossa in cartilagine desinere: nullum articulum non sic finiri. neque enim aut moveri posset, nisi leui inniteretur: aut cum carne, nervisque coniungi, nisi ea media quaedam materia committeret. in manus vero prima palmæ pars ex multis, minutisque ossibus constat, quorum numerus incertus est. sed oblonga omnia, & triangula structura quadam inter se connectuntur: cum inuicem superior, alterius angulus, alterius planities sit: eoque fit ex his unius ossis paulum in interiora concavi species. verum ex manu duo exigui processus in sinus radii coniunguntur. tum ex altera parte recta quinque ossa ad digitos tendentia palmam explent, à quibus ipsi digiti oriuntur: qui ex ossibus ternis constant: omniumque eadem ratio est. interius os in verticem sinuatur: recipitque exterioris exiguum tuberculum, nervique ea continent, à quibus orti ungues indurescunt. ideoque non ossi, sed carni magis radicibus suis inherens. ac superiores quidem partes sic ordinatae sunt. imma vero spina in coxarum osse discedit, quod transversum, longoque valentissimum uulvam, vesicam, rectum intestinum tuetur, idque ab exteriori parte gibbum ad spinam, resupinatum à lateribus, id est in ipsis coxis sinus rotundos habet: à quibus oritur os quod pectinem vocat. idque super intestina sub pube transversum uentrem firmat rectius in uiris: recurvatum magis in exteriora in foeminis, ne partum prohibeat. inde foemina oriuntur: quorum capita rotundiora etiam quam humerorum sunt, cum illa ex ceteris rotundissima sint. infra uero duo os processus à priore, & à posteriore parte habent. deinde dura, et medullosa, & ab exteriori parte gibba habent: rursus ab inferioribus quoque capitibus intumescunt: superiora in sinus coxae sicut humeri in ea ossa, quae scapularum sunt, coniunguntur. tum infra inrorsus leniter intendunt, quo aequalius superiora membra sustineant. atque in eo inferiora quoque capita media sinuantur, quo facilius excipi à cruribus possint: quae commissura osse paruo molli cartilagineo tegitur: patellam vocant. haec super innatans, nec ulli ossi inherens, sed carne, et nervis deligata, pauloque magis ad femoris os tendens, inter omnes crurum flexus iuncturam tuetur ipsum autem crus est ex ossibus duobus. & enim per omnia femur humero, crus uero brachio simile est. adeo ut habitus quoque, & decor alterius ex altero cognoscatur. quod ab ossibus incipiens, etiam in carne respondet. verum alterum os ab exteriori parte supra positum est, quod ipsum quoque sura recte nominatur. id breuius, supraque tenuius ad ipsos talos intumescit. alterum à priore parte positum, cui tibiae nomen est, longius, & in superiore parte plenius, solum cum femoris inferiore capite committitur: sicut cum humero cubitus. atque ea quoque ossa infra, supraque coniunguntur.

LIBER

Ita media ut in brachio dehiscunt. excipitur autē crūs infra ossa ex
transuerso talorum, idq; ipsum super os calas situm est, quod quadā
parte sinuatur: quadam excessus habet: & procedentia ex talo reci-
pit: & in sinum eius inseritur. idq; sine medulla durum, magisq; in
posteriorem partem proiectum teretem ibi figuram representat. cæ-
tera ossa pedis ad eorum quæ in manu sunt similitudinem instructa
sunt. plantæ palmæ, digiti digitis, ungues unguibus respondens.

Ossa uiciata, & corrupta quibus signis cognoscantur: & quæ ratio-
ne curentur. Cap. II.

Mne autem os ubi iniuria accessit, aut uiciatur, aut finditur,
aut frangitur, aut foratur, aut colliditur, aut loco mouetur.
id quod uiciatum est, primo ferè pingue fit: deinde uel ni-
grum, uel cariesum: quæ super natis grauibz ulceribus, aut fistulis:
hisq; uel longa uetustate, uel etiam cancro occupatis eueniunt. Opor-
tet autem ante omnia os nudare ulcere exciso: & si latius eius uicium
est, quàm ulcus fuit, carnem subsecare, donec integrum os undiq; pa-
teat: tum id quod pingue est semel, iterum uel satis est admoto ferramē-
to adurere, ut ex eo statu secedat: aut eradere donec id aliquid cruo-
ris ostendatur: quæ integrioris nota est. nam necesse est aridum sit id,
quod uiciatum est. idem in cartilagine quoq; læsa faciendum est. si-
quidem ea quoq; scalpello radenda est, donec integrum id sit, quod re-
linquatur. deinde siue os, siue cartilago rasa est, nūro bene trito re-
spargendum est. neque alia facienda sunt ubi caries, nigrities uel in
summo osse est. siquidem id uel paulo diutius eodem ferramento adu-
rendum, uel radendum est. qui radit hæc, audacter imprimere fer-
ramentum debet, ut & agat aliquid: & maturius desinat. finis est,
cum uel ad album os, uel ad solidum uentum est. albo finiri ex nigri-
tie uitium, soliditate quadam ex carie manifestum est: accedere etiam
cruoris aliquid integro supra dictum est. si quando autem altius de-
scenderit, utrunlibet dubium est: in carie quidem expedita cognitio
est. specillum tenue in foramen demittitur. quod magis, minus uel in-
trando, uel in summo cariem esse, uel altius descendisse testatur. nigri-
ties colligi quidem potest etiam ex dolore, & ex febre. quæ ubi
mediocria sunt, illa alte descendisse non potest: manifestior tamen
ad acta terebra fit. nam finis uicij est, ubi scobis nigra esse desijt.
igitur si caries alte descendit, per terebram urgenda crebris fora-
minibus est: quæ altitudine uicium æquent. tum in ea foramina de-
mittenda candētia ferramenta sunt: donec inde sicum os ex toto fiat.
simul enim post hæc & resoluetur ab infirioe osse quodcumq; uiciatū

est: & his sinus carne replebitur: & humor aut nullus postea fertur, aut mediocris. sin autem nigrities est, aut si caries ad alteram quoque partem ossis transit, oportet excidi. atque idem in carne quoque ad alteram partem ossis penetrante fieri potest. sed quod totum uiciatum, totum eximendum est. si inferior pars integra est, catenus quod corruptum est, excidi debet. item siue capitis, siue pectoris os, siue costae cariola est, inutilis uicio est: & excidendi necessitas est. neque audiendi sunt qui osse nudato diem tertium expectant, ut tunc excidant. ante inflammationem enim tutius omnia tractantur. itaque quantum fieri potest eodem momento & cutis incidenda est, & os detegendum: et omni uicio liberandum est. longeq; pernitiosissimum est, quod in osse pectoris est: quia uix etiam si recte cessit, curatio uera sanitatem reddit.

Quomodo os excidatur, & de modiolis, & terebra ferramentis ad id paratis. Cap. III.

Exciditur uero os duobus modis: si parvulum est, quod laesum est, modiolis, quem *χοιρίδιον* graeci uocant. si spaciosius, terebris. utriusque rationem proponam. Modiolus ferramentum concavum, teres est imus oris ferratum, per quod medium clauus ipse quoque interiore orbe cinctus demittitur. Terebrarum autem duo genera sunt: alterum simile ei quo fabri utuntur. alterum capituli longioris, quod ab acuto mucrone incipit, deinde subito latius fit: atque iterum ab alio principio paulo minus quam equaliter sursum procedit. si uicium in angusto est, quod comprehendere modiolus possit, ille potius aptatur. & si caries subest, medius clauus in foramen demittitur. si nigrities, angulo scalpri sinus exiguus fit, qui clauum recipiat, ut eo insistente circumactus modiolus delabi non possit. deinde u. habena quasi terebra conuertitur. estque quidam premendi modus, ut & foretur, & circumagatur. quia si leuiter imprimitur, parum proficit. si grauiter, non mouetur. neque alienum est instillare paulum rose uel lactis, quo magis lubrico circumagatur. quod ipsum tamen si copiosius est, aciem ferramenti hebetat. at ubi iam iter modiolis pressum est, medius clauus educitur: & ille per se agitur. deinde cum sanitas inferioris partis scobe cognita est, modiolus remouetur. at si latius uicium est, quam ut illo comprehendatur, terebra res agenda est. ea foramen fit in ipso sine uiciosi ossis atque integri: deinde alterum non ita longe. tertiumque donec totus is locus, qui excidendus est, his clauis cinctus sit. atque ibi quoque quatenus terebra agenda sit, scobis significat. tunc excorioris scalper ab altero foramine ad alterum malleolo ada-

LIBER

etus: id quod inter utrumque medium est, excidit: ac sic ambitus similis
 ei fit, qui in angustiore orbem modiolio imprimatur. utro modo ue-
 ro id circumductum est, idem exasorius scalper in osse corrupto pla-
 nus summam quamque testam læsit, donec integrum os relinquatur.
 Vix unquam nigrities integrum, caries per totum os perrumpit: ma-
 ximeque ubi uitiata caluaria est. Id quoque signi specillo significatur, qui
 depressus in id foramen, quod infra solidam sedem habet: et ob id
 veniens aliquid inuenit, et madens exit. si peruium inuenit, altius
 descendens inter os, et membranam nihil oppositum inuenit: edu-
 turque sicut, non quo non subsit aliqua uitiosa sanies, sed quoniam
 ibi, ut in latiore sede diffusa sit. Siue autem nigrities, quam terebra
 detexit: siue caries, quam specillum ostendit, os transit: modiolii quidem
 usus ferè superuacius est: quia latius pateat necesse est, quod iam alte
 processit. terebra uero ea, quam secundo loco posui utendum, eaque ne
 nimis incalascit, subinde in aquam frigidam demittenda est: sed tum
 maiore cura agendum est: cum iam aut simplex os dimidium perfo-
 ratum est: aut in duplici, superius illud, spatium ipsum, hoc sanguis
 significat. ergo tum lentius ducenda habena: suspendendaque magis sini-
 stra manus est, et sæpius attollenda: et foraminis altitudo conside-
 randa: ut quodcumque os perrumpitur sentiamus: neque periclitemur,
 ne mucrone cerebri membrana lædatur: ex quo graues inflammatio-
 nes cum periculo mortis oriuntur. factis foraminibus eodem modo me-
 dia sæpe, sed multo circumspectius excidenda sunt: ne forte angulus
 scalpri eandem membranam uolet: donec fiat aditus, per quam me-
 branae custos immittatur: *μνηστροπύλανα* græci uocant. lamina aenea
 est firma, paulum resina, ab exteriori parte læuis, quæ demissa est,
 ut exterior pars eius cerebro propior sit. subinde ei subiungitur quod
 scalpri discutiendum est. ac si excipit eius angulum, ultra transire
 non patitur: eoque et audacius, et tutius scalprium malleolo subinde
 medius ferit, donec exasum undique os eadem lamina leuetur: tollique
 sine ulla noxa cerebri potest. Vbi totum os eiectum est, circum raden-
 da, leuandaque sunt ora: et si quid scobis membranae infedit, colligen-
 dum. ubi superiori parte sublata, inferior relicta est, non ora tantum,
 sed os quoque totum lauandum est: ut sine noxa postea cutis increseat.
 quæ aspero osse innascens protinus non sanitatem, sed nouos dolores
 mouet. perfecto cerebro qua ratione agendum sit, dicam, cum ad fra-
 cta ossa perueniero. si basis aliqua seruata est, superimponenda sunt
 medicamenta non pingua, quæ recentibus uulneribus accommodan-
 tur: supraque imponenda lana succida oleo, atque aceto madens. ubi te-
 pus processit, ab ipso ore caro increscit, eaque factum manu sinum co-

plet. si quod etiam os adustum est, à parte sana recedit: subitq; inter integram atq; emortuam partem caruncula: quæ quod abscessit, expellat. eaq; ferè quia testa tenuis, & angusta est: squama, idest ætis à græcis nominatur. Potest etiam euenire, ut ex ictu neq; findatur os, neq; perfringatur: sed summum tamè collidatur, exaspereturq;: quod ubi incidit, radi, & lauari satis est. hæc quauis maxime sunt in capite, tamen cæteris quoq; ossibus communia sunt: ut ubicunq; idem incidet, eodem remedio sit utendum atq; cum ea fracta, fissa, forata, collisa sint: quasdam proprias in singulis generibus, quasdam communes in pluribus curationes requirunt. de quibus protinus dicam, initio ab eadem caluaria accepto.

De caluariæ curatione.

Cap. IIII.

Citur ubi ea pertusa, protinus requirendum est, num bilis homo uomuerit: num oculi eius obæcati sint: num obmutuerit: num per nares, aures uel sanguis ei effluxerit: num ceciderit: num sine sensu quasi dormiens iacuerit. hæc enim non nisi osse fracto eueniunt. atq; ubi inciderunt, scire licet necessariam, sed diffiilem curationem esse. si uero etiam torpor accessit, si mens non constat, si neruorum uel resolutio, uel distentio secuta est: uerisimile est etiam cerebri membranam esse uiolatam: eoq; in angusto magis spes est. at si nihil horum secutum est, potest etiam dubitari an os fractum sit. & protinus considerandum est, lapide, an ligno, an ferro, an alio telo percussum sit. et hoc ipso leni, an aspero, mediocri, an uastiore: uehementer, an leniter. quia quo mitior ictus fuit, eo facilius os ei restitisse credibile est. sed nihil tamen melius est, quàm certiore id nota explorare. ergo qua plaga est, demitti specillum oportet, neq; nimis tenue, neq; acutum: ne cum in quosdam sinus naturales incidet, opinionem fracti ossis frustra faciat: neq; nimis plenum, ne paruulæ rimulæ fallant. ubi specillum ad os uenit, nihil nisi lene, & lubrum occurrit: integrum id uideri potest. si quid asperi est, utique quasuture non sint, fractum os esse testatur. à futuris se deceptum esse Hippocrates memoriæ prodidit more scilicet magnorū uirorū, & si duciā magnarū rerum habentium. nam leuia ingenia, quia nihil habent: nihil sibi detrahunt. magno ingenio, multa; nihilominus habent: uero conuenit etiā simplex ueri erroris confessio, præcipueq; in eo misterio quod utilitatis causa posteris traditur. ne qui decipiatur eadē rōne, qua quis ante deceptus est. sed hæc quidem alioquin memoria magni professoris nri interponeremus effectit. potest aut futura eo no-

Hippo: à futuris
deceptum.

LIBER

mine fallere. quæ æque aspera est, ut aliquis hanc esset, etiam si rima est, existimet eo loco, quo subesse hanc uerisimile est. ergo eo nomine decipi non oportet: sed os aperire tutissimum est. nam neque utique certa sedes ut supra posui, futurarum est: et potest idem, et natura liter commissum, et ictu fissum esse: iuxta uero aliquid fissum habere. Quin aliquid etiam, ubi ictus fuerit uehementior, quamuis specillo nihil inuenitur: tamen aperire commodius est. at si ne tum quidem rima manifesta est, inducendum super os attramentum scriptorium est: deinde scalpro id detrahendum. nigritiem enim continet si quid fissum est. solet etiam euenire, ut altera parte fuerit ictus, et os altera fiderit: itaque si grauius aliquis percussus est, si mala inditia subsecuta sunt, neque ea parte quæ cutis discussa est, rima reperitur: non incommodum est parte altera considerare, nunquis locus mollior sit, et tumeat: eumque aperire. si quidem ibi fissum os reperietur. nec tamen magno negotio cutis sanescit, etiam si frustra detecta est. os fractum nisi suauissimum est, grauius inflammationibus afficit: difficiliusque postea tractatur. raro, sed aliquando tamen euenit, ut os quidem totum integrum maneat: intus uero ex ictu uena aliqua in cerebri membrana rupta, aliquid sanguinis mittat. isque ibi concretus magnos dolores moueat: oculos quibus obæcet. sed ferè contra id dolor est, et eo loco cute incisa pallidum os reperitur. ideoque id quoque os excidendum est. quacumque autem de causa curatio hæc necessaria est, si nondum satis cutis patefacta est, latius aperienda est, donec quicquid læsum est, in conspectu sit. in quo ipso uidentur, nequid ex ipsa membrana, quæ sub cute caluariam cingit, super os relinquatur. si quidem hæc scalpro, et rebris uero lacerata uehementes febres cum inflammationibus excitat. itaque eam commodius est ex toto ab osse diduci. plagam, si ex uulnere est, talem necesse est habeamus, qualem acceperimus. si manu facièda est, ea ferè commodissima est, quæ duabus transversis lineis litteræ X. figuram accipit: ut deinde à singulis procurrentibus lingulis cutis subsequatur. inter quæ si sanguis fertur, spongia subinde in aceto tincta cohibendus est: occupandusque obiectis linamentis. et caput altius excitandum. neque id uicium ullum metum, nisi inter musculos, qui temporaria continent, affert: sed ibi quoque nihil tutius fit. In omni uero fisso, fracto uero osse protinus antiquiores medici ad ferramenta ueniebant: quibus id exiderent. sed multo melius est, ante emplastra experiri, quæ caluariæ causa componuntur: eorumque aliquid oportet ex aceto mollium per se super fissum, fractum uero os imponere. deinde super id aliquanto latius quam uulnus est, eodem medicamento illitum linteolum, et præterea succidam lanam aceto tinctam. tunc uulnus deligare, et quotidie

*Atramentum
quod aptat.*

*os findi altera
parte qua os fra-
ctum est.*

*uena rupta
osse illoso.*

quotidie resolueret, similiterq; curare usq; ad diem quintum. à sexto die etiam uapore aquæ calidæ per spongiam fouere. cætera ex eadem facere. quod si caruncula increscere coeperit, & febricula, aut soluta erit, aut lenior & cupiditas abi reuerterit, satisq; somni accedet: in eodem medicamento erit perseverandum. Procedente deinde tempore emolliendum id emplastrum adiecto cerato ex rosa factò, quo si alius carnem producat. nam per se reprimendi uim habet. hac ratione sepe rimæ callo quodam implentur, estq; ea, ossis uelut ciatrix: & latius fracta ossa, si quæ inter se non cohærebant, eodem callo glutinantur: estq; aliquanto melius uelamentum cerebro, quàm caro quæ ex ossis increscit. si uero sub prima curatione febris intenditur, breuesq; somni, & idem per somnia tumultuosi sunt, ulcus madet: neq; aliter: & in ceruicibus glandulæ oriuntur: magni dolores sunt: cibiq; super hæc fastidium increscit: tum demum ad manum, scalprumq; ueniendum est. duo uero sub ictu caluariæ pericula sunt, ne uel findatur, uel medium desinat: si fissum est, possunt oræ esse compressæ: uel quia altera super alteram excessit: uel etiam quia uehementer rursus se commiserunt. ex quo euenit ut humor ad membranam quidem descendat, exin uero non habeat: ac sic eam irriter, & graues inflammationes moueat. ubi medium desedit, eandem cerebri membranam os urget. interdum etiam ex fractura quibusdā uelut aculeis pungentibus: his ita succurrendum est, ut tamen quam minimum ex osse dematur. ergo si ora alteri insedit, satis est id quod eminet plano scalp pro, excidere. quo sublato iam rima hiat quantum curationi satis est. at si oræ inter se comprimuntur, à latere eius interposito digiti spacio, terebra foramen faciendum est: ab eoq; scalp per duabus lineis ad rimam agendus ad similitudinem. C. litteræ, sicut uertex eius à foramine basis ad rimas it: quod si rima longius patet, ab altero foramine rursus similis sinus fieri debet: & ita nihil latens in eo esse concitum est: abundeq; exinus datur intus lædentibus. ne si fractum quidem os desedit, totum excidi necesse est. sed siue totum perfractum est, & ab alio ex toto recessit, siue circumpositæ caluariæ inhæret, exigua parte ab eo quod naturaliter se habet, scalp pro diuidendum est. deinde in eo quod desedit, iuxta rimam quam fecimus, foramina addenda sunt. si in angusto noxa est, duo. si latius patet, tria, septaq; eorum excidenda: & tum scalp per utrinque ad rimam agendus sic, ut lunatum sinum faciat: imaq; pars eius intus ad fracturam, cornua ad os integrum spectent. deinde si qua labent, & ex facili remoueri possunt, forfice ad id facta colligenda sunt, maximeq; ea quæ acuta membranam infestant: si id ex facili fieri non po-

Aurelij Cor.

S

LIBER

est: subicienda lamina est, quam custodem eius membranæ esse pro-
 posui: & super eam quicquid spinosum est, & intus eminet, excide-
 dum est, eadem lamina quicquid deorsum insedit, attollendum. hoc
 genus curationis efficit, ut qua parte fracto ossa tamen inhaerent, soli-
 dentur, qua parte abrupta sunt, sine ullo tormento sub medicamento
 tempore excidant, spatiumq; inter hæc satis illi magnum ad extra-
 hendam sanem relinquatur: plusq; in osse propugnaculi cerebrum
 habeat, quam habiturum fuit eo exco. his factis ea membrana acri-
 aceto respergenda est, ut siue aliquid sanguinis ex ea profuit, cohibe-
 atur: siue intus concretus cruor remanet, discutiat. tum idem me-
 dicamentum eodem modo, qui supra positus est, mollium ipsi mem-
 branæ imponendum est. cæteraq; eodem modo facienda sunt, quæ ad
 linteolum illitum, & lanam succidam pertinent. collocandusq; is loco
 in tepido: & curandum quotidie vulnus, his etiam æstate. quod si me-
 brana per inflammationem intumuerit, infundenda erit rosa tepi-
 da si usq; eo tumebit, ut super ossa quoq; emineat: coercebit eam bene
 trita lenticula, uel folia uitis contrita, & cum recenti uel butyro, uel
 adipe anserino mixta, ceruixq; molli debet liquido cerato ex iri-
 no facto. at si parum pura membrana uidebitur par modus eius em-
 plastri, & mellis miscendus erit, idq; superinfundendum, eiusq; con-
 tinendi causa unum, aut alterum linamentum injiciendum, & super
 linteolo, cui emplastrum illitum sit, contegendum. ubi plus pura mem-
 brana est, eadem ratione adijciendum emplastro ceratum, ut carnem
 producat. quod ad abstinentiam uero & primos, ultioresq; cibos, po-
 tionesq; pertinet. eadem quæ in uulneribus præcepti, seruanda sunt:
 eo magis, quo periculosius hæc pars afficitur. quin etiam cum iā nō
 solum sustineri, sed aliis his quoq; apparebunt: tamen erunt uitanda
 quæcunq; mandenda sunt. item fumus, & quicquid exatit sternuta-
 mentum spem uero certam faciunt membrana mobilis ac sui coloris,
 caro increscens rubicunda, facilis motus maxillæ, atq; cervicis. mala
 signa sunt. membrana immobilis nigra, uel liuida, uel aliter coloris
 corrupti, dementia, acris uomitus, neruorum uel resolutio, uel disten-
 tio: caro liuida, maxillarum rigor, atq; cervicis. cæteraq; quæ ad so-
 mnium, cibi desiderium, febrem, puris colorem attinent: eadem quæ
 in cæteris uulneribus, uel salutaria, uel mortifera sunt: ubi bene res-
 cedit, incipit ab ipsa membrana, uel si os eo loco duplex est, inde
 quoq; caro increscere: eaq; id, quod inter ossa uacuum est, replet. non-
 nunquam etiam super caluariam excrescit. quod si incidit, insper-
 genda squama aeris est, ut id reprimat, cohibeatq; ea carni superdā-
 do quæ ad cicatricem perducant. omnibusq; ea locis commode inducā-

Signa uitæ &
 mortis. P

ur, excepta frontis ea parte, quæ paulum super id est, quod inter supercilia est. ibi enim vix fieri potest, ut non per omnem ætatem sit exulceratio, quæ linteolo medicamentum habente contigenda sit: illa utiq; capite fracto seruanda sunt: ut donec iam ualida cicatrix erit soluenda, uidentur frequens balneum, maior uini modus.

De narium fracturum curatione. Cap. V.

N nariibus uero et os, et cartilago frangi solet, et quidem modo aduersa, modo à latere: si aduersa fracta sunt, alterum uel ex his, nares desidunt, difficulter spiritus trahitur. si à latere os fractum est. is locus cauus est. si cartilago, in altera partem nares declinantur. quicquid in cartilagine inadit, excitandū leniter est, aut subiecto specillo, aut duobus digitis utrinq; compressis. deinde in longitudinem implicata linamenta et molli pellicula circumfutaq; intus adicienda sunt. aut eodem modo compositum aliquid ex arido penicillo. aut grandis pinna gummi, uel fabrili glutine illita, et molli pellicula circumdata, quæ desidere cartilagine non sinat. sed si aduersa ea fracta est, æqualiter utraq; naris implenda est. si à latere, crassius esse debet ab ea parte in qua natus iacet, ab altera tenuius in id quod inseritur. extrinsecus autem circumdanda habena est mollis media illita mixtis inter se similia, et turis fuligine. eaq; ultra aures ducenda, et fronti duobus capitibus agglutinanda est. id enim corpori quasi gluten inherescit: et cum induruit nares commodè continet sin quod intus inditum est, lædit: sicut maxime fit, ubi interior cartilago perfracta est, excitatæ nares eadem tantummodo habena continendæ sunt. deinde post quatuordecim dies id ipsum demendum est. resoluitur autem aqua calida: eaq; tum is locus quotidie fouendus est. sin os fractum est, id quoq; digitis in suam sedem reponendum est. atq; ubi aduersum, ut dictum est, utraq; naris implenda est. ubi à latere, ea inquam os impulsum est. imponendūq; ceratum, et paulo uehementius deligandum est: quia callus eo loco non ad sanitatem tantummodo, sed etiam ad tumorem increscit. à tertio die fouendum id aqua calida est: tantoq; magis, quanto propius esse sanitati debet. quod si plura erunt fragmenta, nihilominus extrinsecus singula in suas sedes digitis erunt compellenda: imponendaq; extrinsecus eadem habena, et super eam ceratum, neq; ultra fascia adhibenda est. at si quod fragmentum undique resolutum cum cæteris non glutinabitur, intelligitur quidem ex huiusmore, qui multus ex vulnere feretur: uolSELLA uero extrahetur. finis

f ij

LIBER

hisq; inflammationibus imponetur aliquod medicamentum ex ijs, quae leniter reprimunt. peius est ubi aut ossi, aut cartilagini fractae cutis quoq; vulnus accessit. id admodum raro fit: si incidit, illa quidem nihilominus eadem ratione in suas sedes excitanda sunt. cuti vero super imponendum emplastrum aliquod ex his, quae recentibus vulneribus accommodata sunt: sed insuper nullo vinculo deligendum est.

De aurium fracturarum curatione. Cap. VI.

IN aure quoq; interdum rumpitur cartilago. quod si incidit, antequam pus oriatur, imponendum glutinans medicamentum est. Saepem enim suppurationem prohibet, & aurem confirmat. illud & in hac, & in naribus ignorari non oportet: non quidem cartilaginem ipsam glutinari, circa tamen carnem incrementum solidariq; eum locum. itaq; si cum cute cartilago rupta est, cutis utrinque sinitur. nunc autem de ea dico, quae cute ita frangitur. in ea vero si iam pus natum est, aperienda altera parte cutis: & ipsa cartilago contra lunata plaga excidenda est. deinde utendum est medicamento leniter supprimente, quale lycium est aqua dilutum, donec sanguis fluere desinat. tum imponendum linteolum cum emplastro sic, ut pingue omne vitetur: & a parte posteriore lana mollis auri subijcienda est: quae, quod est inter hanc & caput, compleat. tum ea leniter deliganda est: & a tertio die vapore, ut in naribus posui, fouenda. atq; in his quoq; generibus abstinentia primi temporis necessaria est, donec inflammatio finiatur.

De maxillae fractae curatione, deq; quibusdam ad omnia ossa pertinentibus. Cap. VII.

AB his ad maxillam venturus indicanda quaedam puto communiter ad omnia ossa pertinentia, ne saepius eadem dicenda sint. Omne igitur os modo rectum ut lignum in longitudinem finditur: modo fragitur transversum: interdum obliquum, atq; id ipsum nonnunquam retusa habet capita: nonnunquam acuta. quod genus pessimum est: quia neq; facile committuntur, quae nulli retuso inmittuntur, & carnem vulnerant: interdum nervum quoque, aut musculum: quin etiam aliquando plura fragmenta à fragmento fiunt. sed in alijs quidem ossibus ex toto saepe fragmentum à fragmento recedit. Maxillae vero semper aliqua parte, etiam uexata ossa inter se coherent. igitur in primis digitis duobus utrinq; prementibus, & ab ore, & ab cute omnino ossa in suam sedem compellenda sunt. deinde

inde

inde si trasuersa maxilla fracta est, sub qua casu ferè dēs super proximū dentem excedit: ubi ea in suam sedem collocata est: duo proximi dentes, aut si hi labant, posteriores inter se seia deligandi sunt. id in alio genere fracturæ supernacuum est. cætera eadem faciendæ sunt. nam linteolum duplex madens uino, & oleo super iniiciendum cum eadem simila, & eadem turis fuligine est. deinde aut fascia, aut mollis habena media in longitudinem inasa, ut utrinq; mentum complectatur, & inde capita eius supra caput adducta ibi deligantur. illud quoq; ad omnia ossa pertinens dictum erit: fenum primum esse necessariam: deinde à die tertio humidum cibum, sublata inflammatione paulo plenior: cumq; qui carnem alat, per omne tempus uinum esse alienum. deinde tertio die resolui debere: foueriq; per spongram uapore aquæ calidæ: eademq; quæ primo fuerunt super dari. item die quinto fieri, & donec inflammatio finiatur: quæ uel octauo die, uel septimo ferè resoluitur. ea sublata, rursus ossa esse tractanda, ut si quod fragmentum loco suo non est, reponatur. neq; id esse soluendum, nisi duæ partes eius temporis, intra quod quæq; ossa conferuntur, transferunt. ferè uero intra quartumdecimum & unum et uigesimalium diem sanescunt maxilla, malæ, iugulum, pectus, latus, os scapularum, costæ, spina coxarum, os tali, calx, manus, planta. inter uigesimalium & trigesimalium diem crura, brachiaq; inter septimū & uigesimalium & quadragesimum humeri, & foemina. sed in maxilla illud quoq; adiiciendum est, quod humidus cibus diu assumendus est. atq; etiam cum tempus processit, in lagano, similibusq; alijs perseuerandum, donec ex toto maxillam callus firmarit. item utique primis diebus habendum silentium.

De iuguli fracti curatione. Cap. VIII.

iugulum uero si transuersum fractum est, nonnunquam p
se rursus recte coit: & nisi mouetur, sanari sine iunctura potest. nonnunquam uero, maximeq; ubi motum est, elabitur. ferèq; id quod à pectore, sub id quod ab humero est, in posteriorem partem inclinatur. cuius ea ratio est, quod per se non mouetur: sed cum humeri motu consentit. itaq; eo subsistente sub id humerus agitur. raro uero admodum in priorem partem iugulum inclinatur: adeo ut magni professores nunquam se uidisse memorie mandarent. sed locuples tamen eius rei auctor Hippocrates est. uerū ut dissimiliterq; casus est, sic quædam dissimilia requirit. ubi ad scapulas iugulum tendit, simul dextra manu planè propellendus in posteriorem partem humerus est, & illud in priorem attrahendum. ubi ad

Aurelij Cor.

f ij

LIBER

pectus conuersum est: ipsum quidem retro dandum: humerus autem in priorem partem adducendus est. ac si is inferior est, non id quod à pectore est, deprimendum est, quia immobile est: sed humerus ipse attollendus. si casu superior est, id quod à pectore est: implendum lana: & humerus ad pectus deligandus est. si acuta fragmenta sunt, incidi contra cutis debet: ex ossibus ea, quæ carnem uulnerant, præcidenda sunt. tunc reueta ossa cōmittenda sunt. si quod ab aliqua parte eminet, opponendum ei triplex linteolum est in uino, & oleo tinctum si plura fragmenta sunt, excipienda sunt ex ferula facto canaliculo, eodemq; intus incerato, ne fasciæ diducatur. quæ iugulo composito circumdanda est sæpius, potius quàm ualentius. quod ipsum quoq; in omnibus ossibus fractis perpetuum est. à dextro uero iugulo, si id fractum est, ad alam sinistram: à sinistro ad dextram: rursusq; sub ala sua fasciari debet. post hæc si iugulum ad scapulas inclinatum est, brachium ad latus. si in partem priorem, ad ceruicem deligandum est. supinusq; homo collocandus: cæteraq; eadem facienda, quæ supra comprehensa sunt. sunt uero plura ossa ferè immobilia uel dura, uel cartilaginosa, quæ uel franguntur: uel forantur: uel colliduntur: uel finduntur. ut malæ, pectus, latus, os scapularum, costæ, spina costarum, os tali, calx, manus, planta. horum omnium eadem curatio est, si supra uulnus est, id suis medicamentis nutriendum est. quo sanescente rimas quoq; ossis, aut si quod ferrumen est, callus implet. si cutis integra est, & os læsum esse ex dolore colligimus: nihil aliud, quàm quiescendum: imponendumq; ceratum est, & leniter deligandum, donec sanitate ossis dolor finiatur.

De costarum fractarum curatione. Cap. IX.

Proprie tamen quædam de costa dicenda sunt: quia iuxta uisæra est: grauioribusq; periculis is locus expositus est. hæc quoq; igitur interdum sic finditur, ut ne summum quidem os, sed interior pars eius, quæ rara est, lædatur: interdum fit, ut eā totum is casus periruperit. si tota fracta nō est, nec sanguis expuitur: nec febricula sequitur: nec quicquam suppurat, nisi admodum rare, nec dolor magnus est: tactu tamen is locus leniter indolescit: abunde est eadem, quæ supra scripta sunt, facere: & à media fasciæ incipere deligare, ne in alterutram partem hæc cutem inclinet. ab uno uero & uigesimo die quo utiq; os esse debet glutinatum, id agendum. cibus uberioribus est utendum, ut corpus quampleniissimū fiat: quo melius os uesuat. quod illo loco teneri, adhuc iniuriæ sub tenui cute ex-

positum est. per omne autem tempus curationis uitandus clamor, sermo quoque, tumultus, ira, motus uehementior corporis, fumus, puluis: et quicquid uel tussim, uel sternutamentum mouet. ne spiritum quidem magno pere continere expedit. at si tota costa perfracta est, casus asperior est. nam & graues inflammationes, & febris, & suppuratio, & saepe uita periculum sequitur: & sanguis spuitur. ergo si uires patiuntur ab eo brachio, quod super eam costam est, sanguis mittendus est. si non patiuntur, alius tamen sine ullo acri ducenda est: diutiusque inedia pugnandum. panis uero ante septimum diem non assumendus: sed una sorbitione uiuendum: imponendumque ei loco ceratum ex lino factum: cui cocta quoque resina adiecta sit: aut Polyarchi malagma, aut panacis ex uino, & rosa, & oleo: superque imponenda lana succida, mollis, & duae fasciae à medijs orsa, minimeque astrictae. Multo uero magis omnia uitanda, quae supra posui, adeo ut ne spiritus quidem saepius mouendus sit. quod si tussis infestabit, ad id potio sumenda erit, uel ex tryxagine, uel ex ruta, uel ex herba stychna de, uel ex cumino, & pipere. Grauioribus uero doloribus urgentibus cataplasma imponi quoque conueniet, uel ex lolio, uel ex hordeo, cui pinguis fici tertia pars sit adiecta. & id quidem interdum superiacebit noctu uero idem aut ceratum, aut malagma, aut pannus: quia potest cataplasma decedere. ergo quotidie quaeque resoluatur, donec iam cerato, aut malagmate possimus esse contenti. & decem quidem diebus extenuabitur fame corpus. ab undecimo uero alii incipit ideoque etiam laxior quamprimum fasciae circumligabitur: fereque ea curatio ad quadragesimum diem perueniet: quae si modus erit suppuracionis, plus malagma quam ceratum ad digerendum proficiet. si suppuratio uicerit neque per quae suprascripta sunt discuti potuerit, omnis mora uitanda erit, ne os infra uicietur. sed qua parte maxime tumebit, demittendum erit candens ferramentum, donec ad pus perueniat: idque effundendum. si nusquam caput se ostendit: ubi maxime pus subit, sic intellegimus: creta amolia totum locum illinimus, & sicari patiemur. quo loco maxime humor in ea persuerauit, ibi pus proximum erit: eaque uti debet. si latius aliquid abscedet, duobus aut tribus locis erit perforandum: demittendum erit linamentum, aut aliquid ex penicillo. quod summum lino sit deuinctum ut facile educatur. reliqua eadem, quae in ceteris aduhsis facienda sunt. ubi purum erit ulcus, alii corpus debet, ne tabes perniciosa futura id malum subsequatur. nonnunquam etiam leuius ipso osse affecto & inter initia neglecto, non pus, sed humor quidam mucosus similis intus coit: mollescitque contra citis, in qua simili uisione utendum est.

LIBER

De spinæ curatione.

N spina quoq; est quod proprie notemus. nam si id quod ex uerebra excedit, aliquo modo fractum est: locus quidē concavus fit: punctiones autem in eo sentiuntur, quia necesse est ea fragmenta spinosa esse. quo fit ut homo in interiorem partem subinde nitatur. hæc noscendæ rei causa sunt. medicamentis uero hisdem opus est: quæ plurima parte huius capitis exposita sunt.

*De humeris
et h. l. h. p. p.
et h. l. h. p. p.
et h. l. h. p. p.*

De humerorum, brachiorum, femorum, crurum, digitorum fracturâ, uel exulforum, communibus curationibus. Cap. X.

Imiles rursus ex magna parte casus curationes quæ sunt humeris, et femoribus: communia etiam quædam humeris, brachijs, femoribus, cruribus, digitis. siquidem ea minime periculose media franguntur. quò propior fractura capiti uel superiori uel inferiori est: eò prior est. nam et maiores dolores affert: et difficilius curatur. ea maxime tolerabilis est simplex, transversa. peior ubi fragmenta, atq; ubi obliqua. pessimum ubi eadem acuta. nonnunquã autem fracta in his ossa in suis sedibus remanent: multo sæpius excidunt: aliudq; super aliud effertur. idq; ante omnia cõsiderari debet.

3 Et sunt notæ certæ. si suis sedibus mota, resima, punctioisq; sensum representant, tactu inæqualia sunt. si uero non aduersa, sed obliqua iunguntur, quod fit, ubi loco suo non sunt: membrum id altero latere breuius est: et musculi eius tument. ergo si hoc depressum est, protinus id membrum oportet extendere. nam nervi, musculiq; intenti per ossa contrahuntur: neq; in suum locum ueniunt: nisi illos per uim aliquis intendit. rursus si primis diebus id obmissum est, inflammatio oritur: sub qua et difficile, et periculose uis nervis adhibetur. nam distentio neruorum uel cæcer sequitur: uel certum, ut mitissime alatur, pus. itaq; si ante reposita ossa non sunt, postea reponenda sunt. intendere autem digitum, uel aliud quoq; membrum: si adhuc tenerum est, etiam unus homo potest, cum alteram partem dextra, alteram sinistra prendit. ualentius membrum duobus eget: qui in diuersa contendant. si firmiores nervi sunt, ut in uiris robustis, maximeq; eorum feminibus, et cruribus euenit: habenis quoq; uel linteis fascijs utrinq; capita articularum deliganda, et per plures in diuersa ducenda sunt. ubi paulo longius quàm naturaliter esse debet membrum uis fecit. tunc demum ossa manibus in suam sedem compellenda sunt: inditumq; ossi repositi est dolor sublatus. et membrum alteri parti æquatum inuoluendum duplicibus triplicis panni, et in uino, et oleo tinctis:

quos linteos esse commodius est. ferè uero his sex opus est. prima bre-
uissima adhibenda, quæ circa fracturam ter uoluta sursum uersum
feratur, & quasi in coclea serpat: satisq; est eam ter hoc quoq; modo
circuire. altera dimidio longiore, eaq; qua parte os eminet, ab ea si to-
tum æquale est, undelibet super fracturam debet incipere priori
aduersa: deorsumq; tendere, atq; iterû de fractura reuersa in superio-
re parte ultra priorem fasciam desinere. super has iniiciendum latio-
re linto ceratum est, quod eas contineat. ac si qua parte os eminet,
triplex ea pannus obijciendus eodem uino & oleo madens. hæc ter-
tia fascia comprehendenda sunt: quartaq; sic, ut semper insequens
priori aduersa sit: & tertia tantum inferiore parte tres in superio-
re faciant: quia satius est sæpius circuire, quàm adstringi. siquidem
id quod adstrictum est, alienatur: & cancro opportunè est: articulum
autem quamminime uincire opus est. sed si iuxta hunc os fractum est,
necesse est. deligatum uero membrum in diem tertium continendum
est. eaq; iunctura talis esse debet, ut primo die nihil offenderit: non
tamen laxa uisa sit: secundo laxior: tertio iam penè resoluta. ergo tñ
rursum id membrum deligandum: adijciendaq; prioribus quinta fa-
scia est: iterumq; quinto resoluendum est: & sexta fasciis inuoluen-
dum sic, ut tertia & quinta infra ceteræ supra finiantur. quotiens-
cunq; autem soluitur membrum, calida aqua fouendum est. sed si iux-
ta articulum fractura est: diu instillandum uinum est, exigua par-
te olei adiecta, eademq; omnia facienda donec adeo inflammatio sol-
uatur: uel lenius quoq; quàm ex consuetudine id membrum fiat: quod
si septimus dies non dedit, certe nonus exhibet. tum facillime ossa tra-
stantur. rursum ergo si parum commissa sunt, committi debent. si qua
fragmenta eminent, in suas sedes reponenda sunt. deinde eodem mo-
do membrum deligandum, ferulaq; super acomodandæ sunt: quæ fi-
scæ, circumpositæq; ossa in sua sede contineant: & in quam partem
fractura inclinat, ab ea latior, ualentiorq; ferula imponenda est.
easq; omnes citra articulum esse oportet resimas, ne hunc lædant: nec
ultra astringi, quàm ut ossa contineant, & cum spatio laxentur: tertio
quoq; die paulum habenis suis coartari: ac si nulla prurigo, nullus do-
lor est, sic manere donec duæ partes eius temporis quod quoq; os cõ-
seruet, compleantur: postea lenius aqua calida fouere: quia primo di-
geri materiam opus est: tum euocari. ergo cerato quoq; liquido id ple-
niter est unguendum: perfricandaq; summa cutis est: laxiusq; id deli-
gandum est. tertio quoq; die soluendum sic, ut remoti calida aqua ce-
tera eadem fiant. tantummodo singulæ fasciæ quotiens resolutæ fue-
rint subtrahantur.

Pallor

Cancer

Rohgans

Lino

Pannus

LIBER

De fracti humeri curatione.

Nec communia sunt illa propria. siquidem humerus fractus non sic, ut membrum aliud intenditur. sed homo collo-
catur alto sedili: medicus autem humiliore aduersus: una fasci-
a brachium amplexa ex ceruice ipsius, qui laesus est, id sustineat. altera ab altera parte super caput data, ibi accipit nodum. Tertia iuncto inno humero deorsum demittitur, ibi quoque capitibus eius inter se iunctis: deinde ab occipito ipsius minister sub ea fasciā, quam secundo loco posui: correpto si dexter humerus ducendus est dextro: si sinister, sinistro brachio demissum inter femina eius, qui curatur, baculum tenet. medicus super eam fasciam de qua tertio loco dixi, planā inijciat dextram: si sinister, sinistram, si dexter humerus sumatur. simulque alteram fasciam minister attollit: alteram premit medicus. quo fit ut leniter humerus extendatur. fasciis uero, si medium aut imum os fractum est, breuioribus opus est: si summum, longioribus. ut ab eo sub altera quoque ala perfectus, et scapulas porrigantur. protinus uero brachium cum deligatur, sic inclinandum est, id quod afficit, ut ante fascias quoque sic figurandum sit, ne postea suspensum aliter aliter cum deligabatur, humerum inclinet. brachioque suspensio ipse quoque humerus ad latus leniter deligandus est. perque fit, ut minime moueatur: ideoque ossa sic se habent, ut aliquis composuit. cum ad ferulas uentum est, extrinsecus esse earum longissimae debent, à lacerto breuior-
res: sed sub ala breuissimae. saepiusque eae resoluendae sunt, ubi in uicinia cubiti humerus fractus est: ne ibi nerui rigescant: et inutile brachium efficiant. quotiens solutae sunt, fractura manu continenda: cubitus aqua calida fouendus, et molli cerato perfricandus: ferulaeque uel omnino non imponendae contra eminentia cubiti: uel aliquāto breuior-
res sunt.

De brachij fracti curatione.

T si brachium fractum est, in primis considerandum est alterum os, an utrumque comminutum sit: non quo alia in eiusmodi casu curatio admouenda: sed primum ut ualenti-
us extendatur, si utrumque os fractum est: quia necesse est minus neruos contrahi altero osse integro, eosque intendente. deinde ut curiosius omnia in continendis ossibus fiant: si neutrum alteri auxilio est. nam ubi alterum integrum est, plus opis in eo, quam in fasciis, ferulisque est. deligari autem brachium debet paulum pollice ad pectus inclinato: siquidem is maxime brachij naturalis habitus sit: idque inuolutum entella commodissime excipitur: quae latitudine ipsi brachio perangu-

his capitibus collo inijciuntur: atq; ita commode brachium ex cervice suspendum est. idq; paulum supra cubiti alterius regione pendere oportet. quod si ex summo cubito id factum sit, glutinare id uinciendo alienum est. fit enim brachium immobile. ac si nihil aliud quam dolor occurrsum est, idem qui fuit eius usus est.

De crurum femorumq; fractorum curatione.

i N crure æque ad rem pertinet alterum saltem os integrum manere: commune uero ei femoriq; est. quod ubi deligatum est, in canalem conijciendum est. is canalis & inferiori parte foramina habet: per quæ si quis humor excesserit, descendat: & à planta moram, quæ simul & sustineat eam: et delabi non patiatur: & à lateribus cana, perq; loris datis mora quidem, crus, femurq; ut collocatum est, detineat. esse etiam is debet à planta si crus fractum est, circa poplitem. si femur, usq; ad coxam. si iuxta superius caput femoris sic, ut ipsa quoq; ei coxa sit. neq; tamen ignorari oportet si femur fractum est, fieri breuius: quia nunquam in antiquum statum reuertitur: summusq; digitis postea cruris eius insisti. sed multa tamen femori debilitas est: ubi fortunæ negligentia quoq; accessit.

De fracti digiti curatione.

Digittum satis est ad unum firculum post inflammationem deligari.

Communes curationes ad humeros, brachia, crura, femina, digitosq; confractos pertinentia.

h Is proprie ad singula membra pertinentibus, rursus illa communia sunt, primis diebus fames: deinde tum cū iā increcere callū oportet, liberalius alimentum. longa à uino abstinentia: fomentum aquæ calidæ. dū inflāmatio est, liberale. cum ea desit, modicum. tum etiam longior ulteriores et liquido cerato membris, et mollis tamen unctio. neq; protinus exercendū id membrum: sed ad antiquos usus reducendum est. grauius aliquanto est, cum ossis fractura carnis quoq; uelnus accessit: maximeq; si id musculi femoris, aut humeri senserunt. nam & inflammationes multo grauiiores, & propiores caneros habent. ac femur qdem si ossa inter se cesserunt, ferè præcidi necesse est. humerus uero quoq; in periculum uenit: sed facilius conseruatur. quibus periculis etiam magis id expositum: quod iuxta ipsos articulos ictum est. curiosius igitur agendum est: et musculus qdem per mediam plagam transuersus præcidendus. sanguis uero, si parū fluxit, mittendus. corpus inedia extendendum: ac reliqua qdem

LIBER

membra lentius intendenda: & lenius in his ossa in suam sedem re-
 ponenda sunt. his uero neq; intendi nervos, neq; ossa tractari satis ex-
 pedit. ipsiq; homini permittendum est, ut sic ea collocata habeat: quæ-
 admodum minime lædunt. Omnibus autem his uulneribus imponen-
 dum primo linamentum est uino madens: cui rosæ paulum admodum
 adiectum sit. cætera eadem deliganda fasciis sunt, aliquanto quàm
 uulnus latioribus, laxius scilicet, quàm si ea plaga non esset. quanto
 facilius & alienari, & occupari cancro uulnus potest numero potius
 fasciarum id agendum est: ut laxè quoq; æque contineant. quod in fe-
 more, humerog; sic fiet, si ossa forte recte concurrerint. sin aliter se
 habebunt, eatenus circumdari fascia debet, ut impositum medicamē-
 tum contineat. cætera eadem quæ supra scripsi: facienda sunt: præ-
 terquam quod neq; ferulis, neq; canalibus, inter quæ uulnus sanescere
 non potest. sed pluribus tantummodo, & latioribus fasciis opus est:
 ingerendumq; subinde in eas est calidum oleum, & uinum: magisq;
 in primo, fame utendo uulnus calida aqua fouendum: frigiq; omni
 ratione uitandum: & transendum ad medicamenta, quæ puri mo-
 uendo sunt: maiorq; uulneri quàm ossi cura agenda. ergo quotidie
 soluendum, nutriendumq; est. inter quæ si quod paruulum fragmen-
 tum ossis eminet, id si retusum est, in suam sedem dandum: si acutū,
 ante acumen eius longius est præcidendum: si breuius limandum: et
 utrinq; scalpro limandum. tum ipsum recondendum est. ac si id ma-
 nus facere non potest, uolsella, quali fabri utuntur, iniicienda est. recte
 se habenti capiti ab ea parte, qua sima est: ut ea parte quæ abra est,
 eminens os in suam sedem compellat. si id maius est, membranulisq;
 anguntur, sinere oportet ea sub medicamentis resolui: idq; os, ubi iam
 nudatum est, abscondere: quod maturius scilicet faciendum est: potestq;
 ea ratione & os coire: & uulnus sanescere. illud suo tempore: hoc pro
 ut se habet. nonnunquam etiam in magno uulnere euenit ut frag-
 menta quædam uelut emoriantur: neq; cum cæteris coeant. quod hic
 quoq; ex modo fluentis humoris colligitur. quò magis necessarium est,
 sæpius ulcus resolvere, atq; nutrire. sequitur uero ut id os per se
 post aliquot dies excidat: cum tam misera antea conditio uulneris
 sit. tamen id interdum maius, diutiusq; facies. sæpe enim integra cu-
 tis, osse abruptitur: protinusq; prurigo, & dolor oritur. quæ solue-
 re, si accidit, maturius oportet: & fouere aqua per æstatem frigida:
 per hyemem egelida: deinde ceratum myrteum imponere. inter-
 dum fractura quibusdam uelut aculeis carnem uexat: quo à prurigo-
 ne, & punctionibus cognito, aperire id melius, eosq; aculeos præcide-
 re necesse habet. Reliqua uero curatio in utroque hoc casu eadem

est: quæ ubi ictus protinus intulit puro iam ulcere. cibus hic quoque utendum est carnem producentibus: si brevius adhuc membrum est, & ossa loco suo non sunt, paxillus tenuis quam leuissimi generis inter ea demitti debet sic, ut capite paulum supra ulcus emineat: usque quotidie plenior adigendus est, donec par id membrum alteri fiat. tum paxillus remouendus, vulnus sanandum est: cicatrix inducta fouenda frigida aqua est, in qua myrtus, hederâ, alieue similes uerbenæ sint: illinendumque medicamentum, quod siccet: & magis etiam hic quiescendum, donec id membrum confirmetur. si quando uero ossa non coferbuerunt, quæ sæpe soluta, sæpe mota sunt: in aperto deinde curatio est: possunt enim coire. si uetus occupauit, membrum extendendum est, ut aliquid lædatur. ossa inter se manu diuidenda, ut concurrere exasperentur, ut siquid pingue est, eradatur: totumque id quasi recens fiat. magna tamen cura habita, ne nervi, musculiue lædantur. tum uiuo fouendum est, in quo malicorium decoctum sit: imponendumque id ipsum oui albo mixtum. tertio die resolendum, fouendumque aqua, in qua uerbenæ, de quibus supra dixi, decoctæ sint. quinto die idem faciendum, ferulæque circumdandæ. cætera & ante, & post eadē faciendâ, quæ suprascripsi. Solent tamen interdum diuersa inter se ossa conferuere: eoque & brevius membrum, & indecorum fit: & si capita acutiora sunt, assidue punctiones sentiuntur. ob quam causam frangi rursus ossa, & dirigi debent. id hoc modo fit. calida aqua multa membrum id fouetur: & ex cerato liquido perfricatur: intenditurque & inter hæc medicus pertractans ossa, ut adhuc tenero callo manibus ea diducat: compellitque id quod eminet in suam sedem. & si parum ualuit, ab ea parte in qua os se inclinât, inuolutam lanâ regulâ obijcit. atque ita deligando assuescere iterum uetustæ sedi cogit. nonnumquam autem recte quidem ossa coeperunt. superincreuit uero nimius callus: ideoque locus intumuit. quod ubi incidit, diu, leuiterque id membrum perfricandum est ex oleo, & sale, & nitro: multumque aqua calida salsa fouendum: & imponendum malagma quod digerat: astringensque alligandum: oleribusque, et prætere auomitu utendum. per quæ cum carne callus quoque extenuatur. confertque aliqd de sinapi quod citò fici in alterum par membrum impositum, donec id paulum erodat, eoque euocet materiam. ubi his tumor extenuatus est, rursus ad ordinem uitæ reuertendum est.

De luxatis ossibus. Cap. XI.

¶ C de fractis quidem ossibus hætenus dictum sit. mouetur autem ea sedibus suis duobus modis. nā modo quæ iuncta sunt

LIBER

Inter se dehiscunt: ut cum latum scapularum os ab humero recedit: & in brachio radius à cubito. & in crure tibia à sura: interdum à saltu: calcis os à talo: quod raro tamen fit. modo articuli suis sedibus excidunt. ante de prioribus dicam. quorum ubi aliquid inacidit, protinus is locus cauus est: depressusq; digitus sinum inuenit. deinde grauis inflammatio oritur: atq; in talis præcipua. siquidē febres quoq; & caneros, & nervorum uel distentiones uel rigores, qui caput scapulis annectunt: mouere consuevit. quorum uitandorum causa facienda eadem sunt, quæ in ossibus mollibus læsis aliquid ubi inacidit protinus his locis proposita sunt: ut dolor, tumorq; per ea tollantur. nam diducta ossa nunquam rursus inter se iunguntur. & ut aliquid decoris eo loco sit, nihil usus admittitur. maxilla uero & uertebra, oēsque articuli cum ualidis nervis comprehendantur: excidunt aut uel expulsi, aut aliquo casu nervis, uel ruptis uel infirmatis: faciliusq; in pueris & adolescentulis quàm in robustioribus: hiq; elabuntur in priorem, & in exteriorem partem, quidam omnibus modis, quidam certis: suntq; quædam communia omnium signa: quædam propria sunt cuiusq; siquidem semper ea parte tumor est, in qua os prorumpit. ea sinus, à qua recessit. & hæc quidem in omnibus deprehenduntur, alia uero si in singulis. quæ simulatq; de quoq; dicam, proponenda erunt. sed ut excidere omnes articuli non possunt, sic non omnes reponuntur. caput enim nonnunquam compellitur: neq; in spina uertebra, neq; ea maxilla, quæ utraq; parte prolapsa anteq̃ reponeretur, inflammationem mouit. rursus qui nervorum uicio prolapsi sunt, compulsi quoq; in suas sedes iterum excidunt. at quibus in pueritia exciderunt, neq; reposita sunt: minusq; cæteri crescunt. omniūq; quæ loco suo nō sunt: caro ea increscit: magisq; in proximo membro, q̃ in ulteriore. ut puta si humerus loco suo nō est, maior in eo ipso fit, quàm in brachio: maior in hoc quàm in manus arte. tum pro sedibus & pro casibus qui inciderunt, aut maior, aut minor usus eius mēbrī relinquitur: quoq; in eo plus usus superest, eo minus id extenuatur. quicquid autem loco suo motum est, ante inflammationem reponendū est. si illa occupauit, dum conquiescat. tunc lacescendum est. ubi finita est, tentandum est in his membris quæ id patiuntur. multum autem eò cōfert & corporis, et nervorum habitus. nam si corpus tenue, si humidum est, si nervi infirmi, expeditius os reponitur. sed & primo facilius excidit: & postea minus fideliter continetur. quæ contraria his sunt, melius continēt. sed id quod expulsū est, difficulter admittunt. oportet autem ipsam inflammationem leuare, super succida lana ex aceto imposita. à cibo si ualentioris articuli casus est, triduo: interdum

etiam quinq; diebus abstinere debet. bibere aquā calidā dū sitim finiat. curiosusq; hæc facere his ossibus motis, quæ ualidis, plenisq; musculis continentur. si uero etiam febris accessit, multo magis deinde ex die quinto fouere aqua calida: remotaq; lana ceratum imponere ex cyprino factum, nitro quoq; adiecto, donec omnis inflammatio finiat. tunc in frictionem ei membro adhibere: cibis uti bonis: uti uino modice: iamq; ad usus quoq; suos id membrum promouere: quia motus ut in dolore pestifer, sic aliàs saluberrimus corpori est. hæc cōmunia sunt, nunc de singulis dicam.

De maxillæ luxatæ curatione. Cap. XII.

m Axilla in priorem partem propellitur: sed modo altera parte, modo utraq; si alteram in contrariam partem, modo utraq; ipsa mentumq; inclinatur: dentes paribus non respondent: sed sub his qui secant canini sunt. At si utraq; totum mentum in exteriorem partem promouetur: inferioresq; dentes longius quàm superiores excedunt: intentiq; super muscoli apparent: primo quoq; tempore homo in sedili collocandus est sic, ut minister à posteriore parte caput eius contineat uel sic, ut iuxta parietem is sedeat, subiecto inter parietem, & caput eius scorteo puluino duro, eoq; caput per ministrum urgeatur, quo sit immobilius. tum medici digiti pollices lintolis, uel fasciis ne dilabantur inuoluti in os eius coniungendi: cæteri extrinsecus admouendi sunt. ubi uehementer maxilla apprehensa est, si una parte procidit: concutiendum mentum, & ad guttur adducendum est. tunc simul & caput apprehendendum, & excitato mento maxilla in suam sedem compellenda, & os eius comprimendum est sic, ut omnia penè uro momento fiant. si in utraq; parte prolapsa est, eodem omnia facienda, sed æqualiter retro maxilla agenda est. reposito osse si cum dolore oculorum, & cervicis iste casus incidit, ex brachio sanguis mittendus est. cum omnibus uero quorum ossa mota sunt, primo liquidior abus conueniat, tum his præcipue, adeo ut sermo quoq; frequenti motu oris per nervos lædat.

De capite luxato. Cap. XIII.

c Aput duobus processibus in duos sinus summæ uertebrae demissis super cervicem contineri in prima parte proposui. hi processus interdū in posteriorem partem excidūt: quo fit ut nervus sub occipito extēdatur: metū poctori agglutinatur, neq; bibere is,

LIBER

neq[ue] loqui possit: interdum sine uoluntate semen emittat, quibus cele-
rime mors superuenit. ponendum autem hoc esse credidi, non quo cu-
ratio eius rei ulla sit, sed ut res inditijs cognosceretur: & non puta-
rens sibi medicum defuisse si qui sic aliquem perdidissent.

De spina luxata. Cap. XIII.

Dem casus manet eos, quorum in spina uertebra exciderit.
id enim non potest fieri, nisi ex medulla quæ per medium,
& duabus membranulis, quæ per duos à lateribus procef-
sus feruntur: & nervis, qui continent ruptis. Excidunt autem & in po-
steriorem partem, & in priorem, & supra septum transversum, et
infra. si in utranq[ue] partem exciderit, à posteriore parte uel tumor,
uel sinus oritur. si super septum id incidit, manus resolvuntur: uomæ-
tus, aut distentio neruorum insequitur: spiritus difficulter mouetur:
dolor urget: & aures obtusæ sunt. si sub septo, foemina resolvuntur:
urina supprimitur: interdum etiam sine uoluntate prorupit. ex eius-
modi casibus ut tardius quam ex capitis, sic tamen intra triduum ho-
mo moritur. nam quod Hippocrates dixit uertebra in exteriorem
partem prolapsa, prouum hominem collocandum esse, & extenden-
dum: tum calce aliquem super ipsum debere consistere: id intus im-
pellere: in his accipiendum est, quæ paulum exæsserunt: non in his,
quæ toto loco motæ sunt. nonnunquam enim neruorum imbecillitas
efficit, ut quanuis non exciderit uertebra, paulum tamen in priorem
partem promineat: id non iugulat. sed ab interiore parte non contin-
git quidem posse: ab exteriori, si propulsum est, plerunq[ue] iterum re-
dit: nisi quod admodum rarum est: uis neruis restituta est.

De humero luxato. Cap. XV.

Umerus autem modo in alam excidit. modo in partem prio-
rem. si in alam delapsus est, et uictus cubitus recedit ab
latere, rursus iuxta eiusdem partis aurē cum humero por-
rigi non potest: longiusq[ue] altero id brachium est. si in priorem partē
summum quidem brachium extenditur, minus tamen quam natura-
liter, diffialiusq[ue] in priorem partem q[uam] in posteriorem cubitus porrigi-
tur. Igitur si in alam humerus excidit, & uel puerile adhuc est cor-
pus, uel molle certe, & imbecillibus neruis intentum est, satis est collo-
care id in sedili: & ex duobus ministris alteri imperare, ut caput
late scapularum ossibus leniter reducat alteri ut brachium exten-
dat, ipsum

dat, ipsum posteriore parte residentem renum sub ala eius coire: si-
mulq; & ille os & altera manus brachium eius ad latus impellere.
At si uastus corpus, nerviue robustiores sunt, necessaria est spatula li-
gnea: & quæ crassitudinem duorum digitorum habet, longitudine ab
ala ad digitos pervenit. in qua summa capitulum est rotundum &
leniter cavum, ut recipere particulam aliquam ex capite humeri pos-
sit. in ea bina foramina tribus locis sunt inter se spacio distantibus,
inq; ea lora mollia coniunguntur. eaq; spatha fascia involuta quo mi-
nus tactu lædat ad alam à brachio dirigatur sic, ut caput eius sum-
mæ alæ subijciatur. deinde loris suis ad brachium deligatur: uno lo-
co paulum infra humeri caput, altero paulum supra cubitum, tertio
supra manum. cui rei protinus inter ualla tunc quoq; foraminum
aptata sunt. sic brachium deligatum super scalæ gallinariæ gradum
trahitur, ita alte ut consistere homo ipse non possit. simulq; in alteram
partem corpus demittitur: in alteram brachium intenditur. eoq; fit
ut capite ligni caput humeri impulsus in suam sedem modo cum so-
no, modo sine hoc compellatur. multas alias esse rationes scire facile
est uno Hippocrate lecto, sed non alia magis usu comprobata est. at
si in priorem partem humerus excidit, supinus homo collocandus est:
fasciaq; aut habena media ala circumdanda est: capitumq; eius post ca-
put hominis ministro tradenda, brachium alteri: præcipiendumq; ut
ille habenam, hic brachium extendat. deinde medicus caput quidem
hominis sinistra debet repellere: dextra uero cubitum cum humero
attollere: & os in suam sedem compellere. faciliusq; id in hoc casu,
quàm in priore reuertitur. reposito humero lana alæ subijcienda est.
si in interiore parte os fuit, ut ei opponatur. si in priore parte, ut tamen
commodius deligatur: tum fascia primò sub ala obvoluta, caput eius
debet comprehendere: deinde profectus ad alteram alam: ab eaq;
ad scapulas: rursusq; ad eiusdem humeri caput tendere. sæpiusq; ad
eandem rationem circumagi, donec bene id teneat. uinctus hac ratio-
ne humerus commodius continetur: si adductus ad latus sit, ad id
quoq; fascia deligatur.

De cubiti luxati curatione. Cap. XVI.

i N cubito autem tria coire: ossa humeri, & radij, & cubiti
ipsius ex his, quæ prima parte huius uoluminis posita sunt,
intelligi potuit. sed cubitus qui innexus humero est, ab hoc
excidit. radius qui adiunctus est, interdum trahitur: interdum subsi-
stet. in omnes uero quatuor partes excidere cubitus potest. sed si in

Aurelij Cor:

LIBER

priorem prolapsus est, extentum brachium est: neq; recurvatur. si in posteriorem, brachium curvum est, neq; extenditur: breuiusq; altero est. interdum febrem, vomitumq; bilis mouet. si in exteriorem, interioremue brachium porrectum est, sed paulum in eam partem à qua os recessit recurvatum, quicquid incidit, reponendi ratio una est. neq; in cubito tantum est: sed in omnibus quoq; membris longis, quæ per articulum longa testa iunguntur. utrumq; membrum in diuersas partes extendere donec spacium inter ossa liberum sit. Tum id os quod excidit ab ea parte in quam prolapsum est, in contrariam impellere. Extendēdi tamē alia atq; alia genera sunt, prout nervi ualēt: aut ossa huc, illucue sederunt. ac modo manibus solis utendum est: modo quædam alia adhibenda. ergo si in priorem partem cubitus prolapsus est, extendi per duas manus: interdum etiā habenis iniectis satis est. deinde rotundum aliquid à lacerti parte ponendum est. & super id repente cubitus ad humerum impellendus est. at in alijs casibus cōmodissimum est eadem ratione brachium extendere: quæ fracto cubito supraposita est, & tum ossa reponere. reliqua curatio eadem est, quæ in omnibus. celerius tantum & sæpius id resoluendum est: multoq; magis aqua calida fouendum: diutius ex oleo, & nitro ac sale perfricandum. in cubito enim celerius quàm in ullo alio articulo, siue extra remansit, siue intus reuertit, callus circumdatur: usq; si per quietem increuit, flexus illius postea prohibet.

De manu luxata. Cap. XVII.

Manus quoq; in omnis quatuor partes prolabitur: si in posteriorem partem excidit, porrigi digiti nō possunt: si in priorem, non inclinantur: si in alterutrum latus, manus in contrarium: id est aut ad pollicem, aut ad minimum digitum conuertitur. reponi non difficillime potest super durum locum & renitentem ex altera parte intendi manus, ex altera brachium debet sic, ut prona sit. si in posteriorem partem os excidit, supina: si in priorē, si in interiorem, exterioremue, in latus. ubi satis nervi diducti sunt, si in alterutrum latus procidit manus, brachium in contrarium repellendum est. at his, quæ in priorem, posterioremue partem prolapsa sunt, superimponendum durum aliquid: idq; supra prominens os manu urgendum est: per quod uis adiecta facilius in suam sedem compellit.

De palma. Cap. XVIII.

In palma quoq; ossa interdum suis sedibus promouentur, modo in priorem partem, modo in posteriorem. in latus enim

inoueri paribus offibus oppositis non possunt: signum id solum est, quod omnium commune est. tumor ab ea parte, in quam os uenit: sinus ab ea à qua recessit. sed sine intento digito, tantummodo bene pressum os in suam sedem reuertitur.

De digitis.

Cap. XIX.

T in digitis totidem ferè casus, eademq; signa sunt: quæ in manibus. sed in his extendendis non æque ui opus est, cum et articuli breuiiores, et nerui minus ualidi sint. super mensam tantummodo intendi debent, qui uel in priorem uel in posteriorem partem exciderunt. tum iam palma compelli: atq; id quod in la- tus elapsum est, digitis restitui.

De femore.

Cap. XX.

Vm de his dixerim: de his quoq; quæ in cruribus sunt, uideri possum dixisse. siquidem etiam in hoc casu quædam similitudo est femori, et humero, et tibiæ, et cubito, pædi et manui: quædam tamen separatim quoq; de his dicenda sunt. femur in omnes quatuor partes promouetur, sæpius in interiorem, deinde in exteriorem, raro admodum in priorem, aut posteriorem. si in interiorem partem prolapsum est crus, longius altero, et uastius est. extra enim pes ultimus spectat. si in exteriorem, breuius, rariusq; fit, et intus inclinatur. Calx ingressu terræ non contingit, sed plâta mia. meliusq; id crus superius corpus quàm in priore casu fert, minusq; baculo eget. si in priore crus extensum est, implicariq; non potest, alteri cruri ad calcem par est. sed ima planta minus in priorem partem inclinatur: dolorq; in hoc casu præcipuus est: et maxime urina supprimitur. ubi cum dolore inflammatio quieuit, commode ingrediuntur: totusq; eorum pes est. sed et si in posteriorem extendi non potest crus, breuiusq; est, ubi consistit: calx quoque terram non contingit. Magnum autem femori periculum est, ne uel difficulter reponatur: uel repositum rursus excidat. quidam iterum semper excidere contendunt. sed Hippocrates, et Diocles, et Philotimus, et Nileus, et Heracledes Tarentinus, clari admodum authores, ex toto se restituisse memoriæ prodiderunt. neque tot genera machinamentorum quoque ad extendendum in hoc casu femur Hippocrates, Andreas, Nileus, Nymphodorus, Protarchus, Heracledes, Faber quoque quidam repperissent, si id frustra esset. sed ut hæc falsa opinio est: sic illud uerum est. cum ibi ualentissimi nerui, musculiq; sint, si suum robur habent, nix admittere: si non habent, postea

LIBER

non contineri. Tentandum igitur est, & si tenerius membrum est, satis est habenam alteram ab inguine, alteram à genu intendi. si validius, melius adducunt, qui easdem habenas ad valida bacula deligunt: tumq; eorum fustum in eas partes oppositæ mire obiecerint: superioresq; ad se utraq; manus traxerint: etiamnum valentius intenditur membrum super scannū, cui ab utraq; parte axes sunt: ad quos habenæ illæ deligantur. qui ut in torcularibus conuersi, rūpere quoq; si quis perseverauerit: non solum extendere nervos, & musculos possunt. collocandus autem homo super id scannum est, aut pronus, aut supinus, aut in latus sic, ut semp ea pars superior sit, in quam os prolapsus est: ea etiam inferior, à qua recessit. nervis extantibus si in priorem os uenit, rotundum aliquid super inguen ponendum: subitoq; super id genu adducendum est eodem modo, eademq; de causa, qua idē in brachio fit: protinusq; si complicari femur potest, intus est. In cæteris uero casibus, ubi ossa per uim paulum inter se recesserunt, medicus debet id quod eminet retro cogere: minister contra inde coxā propellere. posito osse nihil aliud noui curatio requirit, quàm ut diutius his in lecto detineatur: ne si motum adhuc nervis laxioribus femur fuerit, rursus erumpat.

De genu. Cap. XXI.

Enu uero & in exteriorem, & in interiorem, & in posteriorem partem excidere notissimum est: in priorē nō prolabi pleriq; scripserunt. potestq; id uero proximum esse, cū inde opposita patella, ipsa quoq; caput tibiæ contineat. Megethen tamen eum cui in priorem partem excidisset, à se curatum esse memoriæ prodidit. in his casibus intendi nervi rationibus hisdem, quas in femore retuli possunt. & id quidem quod in posteriorem partem excidit, eodem modo rotundo aliquo sup poplitem imposito, adductoq; eo crure, reconditur. cætera uero manibus simul tum ossa in diuersas partes compelluntur.

De talo. Cap. XXII.

Alus in omnes partes prolabitur. ubi in interiorem partem excidit, ima pars pedis in exteriorem partem conuertitur. ubi huic contrarius talus contrarium etiam signum extat. si in priorem partem erumpit à posteriore, latus nervus durus, & insanus est: minusq; is opus est. si in posteriorem lanx penē conditur, plaga maior fit. Reponitur autem his quoq; per manus, prius in diuersa pede & crure diductis. & in hoc quoq; casu diutius in lectulo perseverandum


perseuerandum est: ne his talus qui totum corpus sustinet, parum confirmatis nervis ferendo oneri cedat: rursusq; prorumpat. calciamen-
tis quoq; humilioribus primo tempore utendum, ne iunctura talum
ipsum lædat.


De planta. Cap. XXIII.


Plantæ ossa hisdē modis quibus in manu prodeunt, his, his-
demq; conduntur. fascia tantūmodo calcem quoq; debet com-
prehendere: ne cum mediam plantam, immūq; eius uinciri
necesse est, liber talus in medio relictus, materiam pleniorē recipiat:
ideoq; suppuret.

De digitis. Cap. XXIII.

In digitis nihil ultra fieri debet: q̄ quod in his, qui sunt in
manu, positum est. Potest tamen conditus articulus medius,
aut summus canaliculo aliquo contineri. hæc faciendæ sunt
in his casibus ubi sine ulnere ossa exciderunt. hic quoq; & ingens
periculum est: & cogruius quo maius membrum est: quo ne ualidio-
ribus nervis, aut musculis continetur. ideoq; humeris, femoribusq; ma-
tus mortis est: ac si reposita ossa sunt, spes nulla est. Non repositis ta-
men, nonnullum periculum est. eoq; maior in utroq; timor est, quo
propius ulnus articulo est. Hippocrates nihil tuto reponi posse: præ-
ter digitos, & plantas, et manus dixit. atq; in his quoq; diligenter es-
se agendum, ne præcipitarent. Quidā brachia quoq; & crura repo-
suerunt: & ne cancri, distentionesq; neruorum orirentur, sub quibus
in eiusmodi casu fieret mors matura: sanguinem ex brachio mise-
runt. uerum ne digitus quidem, in quo minimum ut malum, sic etiā
periculum est, reponi debet ante inflammationem: aut postea cum iā
uetus res est. si quoq; reposito osse nerui distenduntur, rursus id protū-
nus expellendum est. Omne autem membrum, quod cum ulnere loco
motum, neq; repositum est: sic iacere conuenit, ut maxime cubantem
innuat, tantum ne moueatur: ne ue depēdeat. in omniq; tali morbo ma-
gnū ex longa fame præsidium est. deinde ex curatione eadem quæ
proposita est ubi ossibus fractis ulnus accessit: si nudum os eminet,
impedimento semper futurum est. id quod excedit, abscidendum est:
imponendaq; super arida linamenta sunt, & medicamenta non pin-
guia, donec quæ sola esse in eiusmodi re sanitas potest, ueniat. nam &
debilitas sequitur: & tenuis cicatrix inducitur: quæ necesse est, facile
noxe postea pateat.







QVINTI SERENI MEDICINA.

Hæbe salutiferum quod pangimus affere carmen:
 Inuentumq; tuum prompto comitare fauore.
 Tuq; potens artis, reduces qui tradere uitæ
 Nost: atq; in cælum manes reuocare sepultos.
 Qui colis ægæū, qui pergamæ, quiq; epidaurum:
 Qui quondam placida tectus sub pelle draconis

Tarpeias arces, atq; inclita templa petisti
 Depellens tetros præsentî numine morbos
 Huc ades: & quicquid cupido mihi sæpe rogatus
 Firmasti, cunctum teneris expone papyris.
 Membrorum series certo deducta tenore
 Ut stet, & assimilis medicinae defluat ordo:
 Principio celsa de corporis arce loquamur.
 Capiti medendo.

BALSAMA si geminis instillans auribus addas,
 Tum poteris alacrem capitis reparare uigorem.
 Vel quæ septenis censentur gramina nodis
 Utiliter necites: uel corno ex arbore fertum,
 Pulegiumue potens una super aure locabis.
 Aut illud mixto coctum clementer aceto
 Cautè nare trahes: seu uisco lintea nexo
 Induces fronti: seu trita gramina mentæ.
 Spongia cum tepidis annexa liquoribus imbris
 Profuit: aut hedera ex oleo decocta uetusto.
 Profuit: aut cochleis frontem tractare minutis.
 Si nocuit cerebro uiolentia solis aperto
 Sæpe chelidonia ex acido perducta liquore
 Sanauit: profunt & amica papauera somno.
 Si prius in lento madefacta terantur oliuo.

Hemicraneo medendo.

PORPIO si capitis morbo tentetur acuto
 Allia diuersam lana contexta per aurem
 Inducta profunt: & eodem balsama pacto.
 Allia uel ternis piperis terna addita granis
 Trita lines: certam dabit hæc tibi cura salutem.

Porrigini depellendæ.

EST insensibilis morbus, sed noxius formæ
 Cum caput immensa pexum porrigine ningit,

Q. Serenus.

Q. SERENI

Copia farris uti frendentibus edita saxis:
Hanc poterit malæ radix decocta leuare.
Aut tu fœniculum, nitrumq; et sulphura uiua
Contere. deinde caput permixtis ablue cunctis:
Furfuribusue nouis durum miscebis acetum,
Ut uarios crines tali des unguine puros.
Prodest et tarda demptus testudine sanguis:
Et prodest ædro demissus ab arbore succus.
Desinet interea glomerari farrea nubes:
Cessabitq; grauis crebræ porriginis imber.
Capillo tingendo.

QVOS pudet ætatis longæ, quos sancta senectus
Offendit: cupiunt properos abscondere canos:
Et nigrum crinem suæ simulare dolo.
His prodest acri contrita compressus aceto,
Vel frons lentis, uel tristia poma sabuci:
Lumbrici quoq; terrestres miscentur oliuo:
Et iuuenem præstant rediuiuo flore capillum.
Præterea niueum poterit depellere crinem
Rhesina ex facili cæra, uiscoq; coacta:
Ad rutilam speciem nigros flauescere crines
Vngento cineris prædixit Tullius auctor.
Si prægnans artus captiui sororis edit,
Dicuntur foetus nigrantia lumina fingi.

Phthiriasi arcendæ.

NOXIA corporibus quædam de corpore nostro
Progeniuit natura uolens abrumpere somnos
Sensibus: et monitis uigiles intendere curas.
Sed quis non paueat pherecidis fata tragædi,
Qui nimio sudore fluens animalia tetra
Eduxit: turpi miserum quæ morte tulerunt.
Sylla quoq; infelix tali languore peresus
Corruit: et fœdo se uidit ab agmine uinci.
Sæpius ergo decet mordax haurire sinapi:
Vel nitro, ac sale permixtis, acidoq; liquore
Laxatis, ut sint simul allia tangere corpus:
Aut lachrymis hederæ, aut succo perducere ædri.
Quin etiam furfur mixto medicatur aceto.
Vnda maris lendes capiti deducat iniquas:
Et quicquid crebri defendit silua capilli.

Prurigni,

Prurigni, papulis, & scabiei arcendis.

ILLOTVS sudor, uel copia nobilis escæ
Sæpe graui scabie correptos asperat artus.
Ergo lutum prodest membris adhibere frictis:
Quod facit ex asino siccatus corporis humor.
Nec pudeat tractare finum quem bucula sudit.
Stercoris ex porco cinerem confundito lymphis:
Sic pauidum corpus dextra parcente foueto.
Proderit ex oleo pulvis, quem congerit alte
Dulcibus ex latebris patiens formicat laborum.
Conuenit hinc tepido lita tradere corpora soli.
Feruantes papulas oleo curato liquenti:
Aut acido baccho miscbis farra lupini:
Atq; hinc in calido percurres membra lauacro.
Pruritus autem salfos leuat humor aceti:
Sine mari lauidus sudor, cochleæq; minutæ:
Quarum contactu perimetur acerbæ libido.

Frenesi, ac capiti purgando.

EX uitio cerebri frenesis furiosa mouetur,
Amisissq; refert frendens amentia uires:
Sine calens febris iactatos exedit artus:
Sine ueri gustus, seu frigoris efficit aura.
Conuenit hic calidis pecudum pulmonibus apte
Tempora languentis medicæ redimere corona.
Illotis etiam lanis suffire memento:
Certum sæpe horrendi medicantur odores:
Atq; ideo insanos etiam curarier est par.
Purgatur cerebrum mansa radice pyretri.
Vngitur & sucis, dederit quos parua sabucus,
Expressusq; hederæ mandatur naribus humor.
Aut mixtum rutæ crebro instillatur acetum.
Non semper præsens dolor est sanabilis: ergo
Cura magis prodest uenturis obuia morbis.

Fluori capillorum, & maculis capitis tollendis.

DEFLVIT expulsus morbo latitante capillus
Si raro lauitur: seu uis epotæ ueneni est:
Seu salamandra potens, nullisq; obnoxia flammis
Eximium capitis tactu deiecit honorem.
Nonnunq; variant maculæ: parusq; parumper
Orbibus aspersum ducit noua uulnera tempus.

u ij

Q. SERENI
Viperæ pellis cineres his addito rebus,
Roboreasue pilas, ursino'ue ungito seuo:
Vel testudineo mage permulceto cruore.
Frigori sedando.

SAEPE ita peruadit uis frigoris, ac tenet artus,
Vt uix quæsito medicamine pulsa recedat.
Si ranam ex oleo decoxeris, abijce carnem:
Vngue membra foue: parili ratione ualebit.
Vrtica semen: percepta q; frigora uincet:
Et ceruina potest mulcere medulla rigorem.
Decoctum raphani semen cum melle uorabis:
Siue fel ursinum tepefacta dilue lympa
Proderit hoc potu: seu cassis ostrea testis
Vstu dabit cinerem: qui pro sale sumptus in escis,
Decutiet gelidum tepefacto uertice uirus.
Nonnullus liquidum summit, mulsuq; sinapiq;
Atq; palato agitat pariter, retinensq; mouensq;
Allia nonnulli mandunt: olei'ue liquore
Perfundunt calido cerebrum, nasiq; latebras.
Quidam lactucæ credunt prodesse sapes.
Curandi modus hic & suauis, & utilis idem est.

Elephantiasis propellendæ.

EST Elephas morbus tristi quoq; nomine dirus,
Non solum turpans infandis ora papillis,
Sed cita præcipitans funesto fata ueneno.
Huic erit aduersus cedri de cortice suus,
Mustellæq; cinis: uel fusus sanguis ab illa.
Nonnulli dixere serum, prodesse bibendo.
Mentastri folium potu, apposituq; salubre est.
Nec frustra bulbos, & sulphura iungis aceto,
Qui cupis horribiles ad pristina reddere uultus.
Prætere a nitrum debes cum melle iugatum
Spargere lacte bonis: uarias sic ungere frontes.
Cerusam, & chartam, quam gens ægyptia mittit
Thure simul misce atq; oleo, quod flore rosarum
Conditum est: line sic faciem, sic redde salutem.

Cutis, & faciei uitij propellendis.

INUIDA si maculet faciem lentigo decoram,
Nec prodesse ualent naturæ dona benignæ,
Erucam, atq; acidum laticem simul illine malis.

Proderis

Proderit ϵ bulbis mellis dulcedine uictus,
 Crudae dulcedo miscetur cepa liquori:
 Sanguine uel leporis morbus delebitur oris.
 Frons salicis cum flore suo contrita medetur.
 Sæpiolæ cineres ex ossibus omnia tollunt.
 Cygneos adipēs hilari misceto lyæo:
 Omne malum propere maculoso ex ore fugabis.
 Horrebit si liuor atrox, aut nigra cicatrix,
 Attrito sapone genas purgare memento.
 Rugarum sulcos lentiscæ mastice tendes.
 Si uero uitium est, quod ducat ab impete nomen
 Hoc matutina poteris cohibere salina:
 Seu folio platani, quod mansum mane domabis.
 Fæda fluunt curui quæ purgantia cameli
 Vrentur, cineremq; dabunt: iungentur aceto
 Mascula thura simul: diuinaq; cura ualebit.

Aurium uitijis succurrendis.

CVM sæuus teneras dolor alte sauciat aures,
 Fraxinea in flammis fundit, quem talea suum
 Infilles: siue obscænos ex uirgine rores:
 Aut suum ex folio dederit, quem populus alba.
 Sæpe chelidoniæ rabidum sociatur acetum,
 Adiunctoq; nitro procedit cura salubris.
 Mentastri liquor expressus conducere fertur.
 Infectum uiolis oleum bene consulit auri.
 Annosa rubros si legeris arbore uermes
 Ex oleo tere: sic tepidos infunde dolenti.
 Si uero obstrusa sensus morietur in aure,
 Lumbricos terræ, sæuumq; ex anseris rauco
 Excoque: sic ueterem poteris depellere morbum.
 Felq; bonis surdis etiam prodesse loquuntur:
 Si iungas olidæ graue quod minxere capellæ.
 Si uero inuolutus animal penetraverit aures
 Proderit admixto pauidi fel muris aceto.
 At si lymphæ nocens peruaferit: anseris aptus
 Immittetur adeps ceparum non sine succo.
 Qui grauis est oculis sensum tamen auribus auget.
 Vis ϵ phœbigenæ diuinam discere curam:
 Sitq; uel annosis confectæ doloribus auris:
 Allia tum septem numero, septemq; lupinos

Q. Serenus.

iiij

111 Q^{ue} SERENT
Creticæam dabis in testam: tum delphicæ frondis
Addatur: mixto totum feruescat aceto:
Doctus eris tepidos illinc immittere rores.

Oculorum dolori mitigando.

SVMMA boni est, alacres homini contingere uisus.
Quos quasi custodes, defensoresq; pericli
Prospiciens summa natura locauit in arce:
Sic tamen ut nullos paterentur desuper ictus:
Atq; supercilio pauidi tegerentur opaco.
Sed dolor immeritum lumen si forte laessit,
Lana madens oleo noctu connectitur apte,
Viuentis'ue nepæ lumen gestatur amicum:
Ex folio catulis cineres, confractaq; thura,
Et laticem bacchi factæ cum lacte capellæ
Desuper induces: atq; una nocte probabis.
Hyblæi mellis succi cum felle asprino
Subueniunt oculis dira caligine pressis.
Vettonicæ mansus si cabit lumina succus.
Si tenebras oculis obducit pigra senectus
Expressæ marathro guttæ cum melle liquenti
Detergere malum poterunt: uel uulturis atri
Fella, chelidoniæ fuerint quis gramina mixta:
Hæc etiam annosis poterunt succurrere morbis.
Fel quoq; de gallo mollitum simplice lymphæ
Exacuet pueros dempta caligine uisus.
Sive columbarum finus admiscetur aceto:
Sive fel perdicis parili cum pondere mellis:
Vina chelidoniæ simili ratione iugantur,
Efficiuntq; suo præclaros unguine uisus.
Aspera quinetiam mulcent, et rupta reducunt.
Si genus est morbi miserum quod lumen adurit,
Hic calor infuso mitescit lacte canino:
Anguilis creptos adipēs ærugine misce:
Hi poterunt ruptas oculorum iungere partes.
Si uero horrendum ducent glaucomata peplum:
Spiritus alterius prodest: qui grana cumini
Pallentis madens uisus exalat in ipsos.
Si tumor infestat, rufos et gliscit in orbes,
Turgentes oculos uili circumline coeno.

Dentium

Dentium vitio, & oris fautori medendo.

HAVD facile est acrem dentis tolerare dolorem;
 Quo magis est æquum medicam pernoscere curam:
 Cum baccho violas decoxeris, ore teneto.
 Mansus item prodest succis oleaster acerbis.
 Hinc obscedo fugit: linguae quoq; vulnera cedunt.
 Cum uino piper, & nitrum tepido inde dolenti.
 Sæpe chelidonie succo, uel lacte capellæ
 Sanescunt dentes: aut tauri felle iuuantur.
 Aut acidi latices clauso uoluntur in ore
 Manditur apta rubus ginguius, & bona labris
 Lentiscus, myrtusq; emendant oris odorem.
 Quod uero assumpsit nomen de dente fricando
 Ceruino ex cornu cinis est: aut ungula porcæ
 Torrida: uel cinis ex ouis, sed non sine uiro:
 Muricis aut tostis: uel bulbi extincta fauilla:
 Ambitiosa putas: sunt ista salubria cunctis.
 Exesos autem dentes si forte quæreris,
 Vre finum muris, patulisq; & hiantibus adde.
 Vel anerem dentis ceruini extinguere aceto
 Conuenit: atq; canis immittere partibus apte.
 Prodest & puluis lumbrici corpore tosto.
 Ora ambusta cibo sanabis lacte canino.
 Sæpe etiam gelida ginguas collue lymphæ:
 Dentibus ut firmum possis seruare uigorem.
 Si uero infandum proserpit ad intima uulnus,
 Permisato salem parili cum pondere thuris:
 Hinc tractato locum: miram experiere medellam.
 Aut tu sume pilam, quæ caudis hæret ouinis:
 Hæc sacata dabit molles, & fracta farinas.
 Huius & attritu tetrum mulcebitur ulcus.

Væ faucibus, & quæ mollienda sunt medendis.

EGRESCVNT teneræ fauces, cum frigoris atri
 Vis subijt: uel cum uentis agatilis ær
 Vertitur: atq; ipsas flatus grauis inficit undas:
 Vel rabidus clamor fracto cum forte sonore
 Planum radit iter: sic est Hortensius olim
 Absumptus: causis etenim confectus agendis
 Obtinuit: cum uox domino uiuente periret:
 Et nondum extincti moreretur lingua disertæ.

iiij

Q. SERENI

Ergo omni studio quæres inhibere dolorem:
 Simplicibus lymphis confunditur aerium mel:
 Additur excussus niuea simila gine furfur:
 Decocta hæc clauso simul exercentur in ore.
 Præterea fauces extrinsecus ungere prodest
 Ursino et tauri seuo, cærisq; remissis:
 Omnia quæ geminis æquabis lancibus ante.
 Discæ etiam miram ex humili medicamine curam:
 Astiaco melli iungas agreste papauer,
 Decoctumq; simul mandes, mansumq; uorabis.
 Crinitæ porri radices quinq; coquantur:
 Hinc aqua non feruens uoluitur fauce sonora:
 Nec tamen in stomachum descendat gutta patentem.
 Si uero afflictam langor deiecerit unam,
 Tunc horas aliquot pronus recubare memento:
 Aut illam pulvis tostus releuabit aneti,
 Aut cinis ex cochlea: uel torrida brassica flammis.
 Verum angina sibi mistum sale poscit acetum.
 Quod prodest clauso uersatum agitare palato.

De rigore ceruicis.

AT SI ceruices, duratq; colla rigebunt,
 Mira loquar: geminus mulcebitur unguine poples:
 Hinc longos pariter nervos nudiciana sequetur:
 Anseris aut pingui torpentia colla fouebis:
 Illitur et ualido multum lens cocta in aceto
 Aut capræ finus et bubuli, aut ceruina medula
 Hoc etiam immotos flectes medicamine nervos.
 Quos autem uocitant colles attingere dextra
 Debebis, qua Gallus erit pressante peremptus.

Tussi, et coleribus medendis.

NOXIA si penitus colerum sentire uenena
 Perspicias, cocta lactucæ fronde leuabis.
 Proderit et caules assumere sæpe madentes.
 Interdum fauces tussi quatiuntur atroci:
 Allia tum sumus et cocta, et melle peruncta:
 Semina uel raphani permixto dulcia melle:
 Aut si fraxinea semen de fronde renellis:
 Interiora uora, uetitus contingere dente.
 Ouum melle teres, domitum feruentibus undis,
 Marrubium uel potens: hæc faucibus optima sumos,

Frenabisq;

Frenabisq; grauem facili medicamine tussim.

Digestioni, & stomacho.

QVI stomachum regem totius corporis esse
 Contendunt, uera niti ratione uidentur.
 Huius enim ualidus firmat tenor omnia membra:
 At contra eiusdem franguntur cuncta dolore.
 Quin etiam nisi cura iuuat, uitare cerebrum
 Fertur, & integros illinc auertere sensus.
 Lactucæ semen nigræ, quod lignea pila
 Triuerit: admixto ieiunus sumito melle.
 Sed cochlear trinum gustu tibi sufficit uno:
 Aut tritum semen raphani, mulsūq; iuuabit:
 Sine duæ partes absinthii, ac tertia rutæ
 Decoctis potantur aquis, siliquæq; madentes:
 Semina uel marathri foetæ cum lacte capellæ:
 Puleium quoq; decoctum curabit amice:
 Et potu, & fots stomacho conducit anetum:
 seu cochleas undis calefactas, ac propè iunctas
 Suppositis torrens prunis: uinoq; geroq;
 Perfusas cape: sed prodest magis esse marinas.
 At male digestis si crapula seniet escis,
 Ex pipere, & calida florem de rore marino
 Ebibe: seu salibus piper adde, & tenue cuminum:
 Quæ coctis tanges epulis, ac rapta uorabis:
 Aut cubitum pergens suatum cape tristis aneti.
 Ventriculum Mergz sale iacto contere nalde
 Tosto pane super piperis quæ puluere multo
 Miscentur: capies diuinum munus in istis.
 Grana peregrini piperis diffundito quinq;
 Niliaco melli: quæ mane inserta capeffes.
 Proderit hoc stomacho, uictas & conquoquet escas:
 Felli uomitu, uel phthisi arcendis.

LVTEA si crescant, præcunctis noxia fella:
 Allia parua nouem, piperis tot permole grana:
 Quæ cyatho diluta gari mandesq; bibesq;
 Hæc iterum septena capis post deniq; quina.
 Præterea caulem, frondet si parua sabucus,
 Decocto sale permiscet: ac iungis oliuo:
 Tunc capis, ac tali auxilio fella horrida purgas.
 Profunt & pelagi latices, quos pondere iusto

Q. SERENI

Dulcibus associas lymphis, nulliq; liquenti:
Et niueus prodest ex ubere succus asellæ:
Si tepido uino infundas, ac mella, piperq;
At uomitum radix narossi pota mouebit.
Si uero phthisis annoso sedet improba morbo,
Inritas uino cochleas hausisse iuuabit.
Proderit & ueteris seni pila sumpta suilli:
Quæ capulas quoq; producit medicina salubris.
Mammis sanandis, uel stringendis.

VBERA fecundo multum lactantia succo
Sæpe sibi noxæ nimium manando fuerunt.
Fecit igitur ualida duri reprimuntur aceti.
Post partum tumidas iniuste assurgere mammas
Interdum aspicias: harum mala commemoratur
Murinus finus ex pluuio sedare liquore.
Sin autem clausas penitus dolor angit acerbus,
Lumbricis terræ turgentes unge corymbos.
Si castigatas studium est præstare papillas,
Ex hederæ fertis ambas redimire memento:
Protinus, & raptas flammis mandare coronas:
Anseris aut seuum pariter cum lacte tepente:
Aut ouum illinito tulerit quod garrula perdix.
Præterea pluuio decocta papauera rore
Hærescant multis post absoluenda diebus.
Vis & phæbigenæ cœlestia sumere dona,
Vbera cum tetris laniata doloribus horrent:
Nanis ramentum, & quæ nomine præssion herba est:
Et quæ uulgari sermone insana uocatur:
Græcus ὀκυνία, propria scit dicere lingua:
Necnon & calami radix, lapathiq; legumen
Mixa dabunt miras experto crede medelas.

Reiectioni cibi, aut sanguinis abstinendæ.

SI stomachus nondum conactas expuit escas,
Sed magis atq; magis uitium reuomendo ualescit:
Allia cedemus, crebrumq; trahemus odorem.
Sin etiam rutilus fertur de pectore sanguis,
Sorbitum mentæ, raphanus uel æcti iuuabit.
Sæpe lapis teritur: specularum nomine dicunt:
Et mixtis hauritur aquis: sistitq; cruorem.
Vritur interdum raptus de subere cortex:

Et cinis ex calido prodest epota lyæo.
Quorum cinis, aut coclearum, aut deniq; pellis.
Aut cinis è salicam ramis prodesse putatur:
Aut platani pilulas acri infundemus aceto:
Nullus erit sanguis, quem non abus iste moretur.

Iecoris, & lateris utriusq; medendis.

SI mollis iecoris fibras dolor hauriet acer,
Protinus ex mulsâ potanda eleliphacos herba est:
Sumitur & semen: quod fraxinus alta profudit:
Vulturis atq; iecur: uel ius perdis apricæ.
Præterea simili dragma pix dura, piperq;
Franguntur: sic in mollito puluere iuncta
Egelidis miscentur aquis: recreantq; bibentem.
Absinthi quoq; decocti potabitur humor.
Si latus immeritum morbo tentatur acuto,
Acensum extingues lapidem stridentibus undis:
Hinc bibis: aut aceris radicem tundis, & unâ
Cum uiro capis: hoc præsens medicamen habetur.
Quid referam multis composita philonia rebus:
Quid loquar antidotum? uanus quis ista requirat?
At nos pauperibus præcepta feramus amica.
Necnon & iecoris queretur fibra lupini:
Iungenturq; simul costum, poliumq;, piperq;
Quæ diluta mero dantur potanda lyæo.
Est & uis morbi, quod telum commemoratur:
Cum subito dolor insanus furit incitus ictu:
Persicus huic potum è nucleo dabit interiore:
Quæ mihi cura satis casu monstrante probata est.
spleni curando.

QUANDO lyen tumido circumligat ilia uinclo,
Et plenum splenis demonstrant membra rigorem,
Mollibus ex hedera tornantur pocula lignis:
Hinc trahet assuetos æger quoscunq; liquores:
Aut uiridis costorum olerum potabitur unda.
Proderit exucto stimalis hirudo cruore:
Sine miricæ potens seu ros cum pane marinus:
Aut hederae succus potu, appositusq; inuabit.
Necnon intactam ferro, quam uideris aluum,
Huic liber eripitur, ferro sine decoquiturq;
Donec uictarum pars tertia subsit aquarum.

Q. SERENI

Hinc medico potu pulsus dolor omnis abibit.
 Nonnulli memorant consumi posse lienem,
 Erum si semper ieiuno sumpserit ore.
 Arida ficus item feruente domatur aceto.
 Et trita illinitur: uel splen apponitur hædi.
 Marrubium in uino potum prodesse loquuntur.
 Præterea piper, ac nepete cum flore, & anetum,
 Capparis, atq; Apium, buglossaq; iungitur una:
 Horum decoctos latices potare salubre est.
 Puleium, abrotanum nitida cum mastice coctum,
 Ac thymbræ speciem, quam commemorant cephaloten:
 Prædixit spleni deus idem posse mederi.
 Dulcia Plautus ait grandi minus apta lieni:
 Splen tumidus nocet: & risum tamen addit ineptum:
 Ut mihi sardois uideatur proximus herbis:
 Irrita quæ miseris permiscet gaudia fatis.
 Dicitur exectus faciles auferre cachinos,
 Perpetuoq; æuo frontem præstare seueram.

Præcordijs sanandis.

LANGVIDA si duro turgent præcordia morbo,
 Miscetur mulse farris sextarius unus:
 Necnon & lini tunsum, siliquæq; legumen:
 Hæc decocta simul, nondumq; tepentia nectis:
 Aut quæ poma cydon creteis misit ab oris
 Cocta lines: durum ut possis mollire tumorem.
 Omnia præterea, bulbiue linuntur amari.
 Proderit & lymphis corpus mersare marinis.
 Quin etiam catulum lactantem apponere membris
 Conuenit: atq; malum transcurrere fertur in illum:
 Cui tamen extincto munus debetur humandi.
 Ne iunctus uitium ducit de coniuge coniunx.
 Quod superest styraei iunges ramenta carinæ.
 Quodq; decem ex rebus decattartyma rite uocatur.
 Mastice addentur cum puluere mollia ferra:
 Talibus auxilijs præcordia tutæ resident.

Lumbis, & renibus sanandis.

CVM seuit penitus hærens iniuria lumbis,
 Igne lapis candens datur exultantibus undis:
 Hoc poteris potu tristem superare dolorem.
 Aut pice cum molli nitrum, sulphurq; & acetum

Hinc medico potu pulsus dolor omnis abibit.
 Proderit hanc aëris erebro perducere membris.
 Aut caput asparagi cum uino sume uetusto:
 Seu manus appone: modus conducit uterque.
 Aut adipi mixtum lumbis inducito sulphur.
 Sæpe chelidoniam cum suco palladis addes,
 Farrâq: quæ tremulis profunde sudantia flammis:
 Fertur amigdalinae succus nucis esse bibendus:
 Pinstitur, & tepidis sorbebitur addita lymphis.
 Aut tres ex uino cochleas feruescere coges:
 Cumq: suis domibus franges, piperis quoq: grana
 Ter quinq: adicies: potiûq: inuaberis illo.
 Furfur item parat fuerit cum feruidus unda,
 Post oleo madidus succis immittitur aptis:
 Quæ uix passuris urentia iungito membris.
 Prodest ceruinæ medicans natura medullæ.
 Nec nocuit ciceris cocti potasse liquorem:
 Aut mistam teneris mandisse lilis facta maluis:
 Coneritumq: simul cum mastice confer anetum.
 Quodq: decem rebus componi ex nomine clarum est:
 His continge locum. deus hæc mihi certa probauit.
 Ventris dolori mitigando.

SI DOLOR insanus tota desceit in aluo,
 Heministibus in lymphæ ualidam quoque rutam,
 Aut apium: donec pars duplex desit aquarum.
 Potus erit medicus non detrectante palato.
 Præterea niuei sterilis testa uritur oui,
 Quæ postquam in tetram fuerit conuersa farinam,
 Ex calidis potatur aquis: & pota medetur.
 Nec non iungenda est utero noua uirga miricæ
 Illæsa hæc ferro, terrâq: intacta geratur:
 Aut medio uentris prodest aspergere terram:
 Quam signauerunt uestigia pressa rotarum.
 Proderit & puluis facili sub ardine raptus.
 Quin etiam & lymphis coctum potare cuminum
 Conueniet, quod iam nobis documenta probarunt.
 Mentis quoque hoc pacto medicos dabit hausta sapes.
 Cœliacos autem recreabis pane salubri,
 Quem madido farre efficies, ac mollibus ouis:
 Quorum testa fero prius euanesceat aceto.

Q. SERENI

Refert & teretes bulbos mollire terendo:
Cumq; his leni clarum potare fluentum.

Hydropisi depellendæ.

CORRUPTI iecoris uitio, uel splenis acervo
Crescit hydrops: aut cum siatæ febre medullæ,
Atq; auidæ fauces gelidum traxere liquorem.
Tum lymphæ intercus uitio gliscente tumescit,
Secernens miseram proprio de uiscere pellem.
Conueniet teneræ radix decocta sabua
In geminis calidi cyathis potanda lyæi.
Traxineum semen cum bacchi rore bibendum est.
Aut calido filicis radicem mollit iaccho,
Qui subito raptos uentos, sucosq; reuellit.
Nec non apposito curantur dropacæ membra:
Vnguinè quo frangit uirus langoris aquosi.
Nec non in tepidis conuolues corpus arenis.
Apposituq; leues Nepetæ, gustiq; innabunt.
Sæpe & scyllino pelluntur noxia baccho.
Helleboro bene purgatur lymphaticus error.
Aut huius uice quod fert semen lenta genista
Miscetur: mulsis coctusq; educatur undis.
Est qui præualidum nitro sale miscet acetum:
Atq; olei succo refriat turgentia membra.

Ventri molliendo.

SAEPE cibi specie, uitio uel corporis ipso
Potibus, aut duris restricta morabitur aluus.
Vincetur talis mora gramine mercuriali,
Cuius aquam cocti minimo cum melle bibemus.
Prunæq; conueniunt quæ mittit clara Damascus.
Multos præterea medici componere succos
Assuerunt: preciosa tamen cum ueneris emptum
Falleris: frustra q; immensa nomismata fundes.
Quin age, & in tenui certam cognosce salutem.
Aut igitur tectum lana supponis alumen:
Aut edis in patinis teneræ decocta sabuci:
Vel salsum mulsam capræ cum lacte capeffis.
Crede tamen potum meliorem lactis equini:
Dicitur & ualidos asinæ lac uincere succos.
Syluestris fici lachrymam prodesse loquuntur:
Quodq; satis melius uerbis dicemus Horati.

» Mitulus & uiles pellent obstantia conchæ:
 » Sed choceas prius urtica, aut fursure pasci
 » Purior hinc gustus noxa sine mouerit alium.
 Sæpe thalassomeli iunctum cumulauius hymbri.
 Hæc purgant parili fuerint si pondere mixta.
 Solutioni uentris, & dysenteriae compeſcendæ.

T A M uarij casus mortalia sæcla fatigant
 Ut sint diuersis obnoxia corpora morbis.
 Sæpe etenim nimio cursu fuit impetus alui:
 Frenat commixto cum feruet brassica uino:
 Aut cerasi uictum longo iam tempore pomum.
 Sucus amineæ uitæ cum pane medetur:
 Mel bene permixtum calido potatur aceto.
 Vile quidem facili factum, tamen utile opinor,
 Si lentent medici data purgatori dextra,
 Adiecto piperis medicatur puluere calda.
 Sin autem longo decurrant intima fluxu,
 Atq; immane malum multo iam tempore gliscit,
 Torridus ex uino cortex potabitur oli.
 Ramentum niuei credunt prodesse Elephant.
 Arbore pyramæa cortex direpta medetur
 Axe sub atrito pix nigro mixta lyæo,
 Immensum poterit potu retinere fluorem:
 Numinis aut iussu cedrum cum mastice mîscet:
 Mollitumq; picem, & rasum de nauibus unguen
 Languida quo fidens medicamine membra fouebis.
 Proderit & pueris quos dentis origo fatigat
 Castaneas coxisse nuce, & sorba uetusta,
 Atq; apium, caulesq; rubus quos fundit acuta:
 Potio quæ fluidam consumpta morabitur aluum.

Lumbricis, & tineis purgandis.

Q V I D non aduersum miseris mortalibus addis
 Natura? interno cum miscere tinea serpens,
 Et lumbricus edax uiuant inimica creentq;
 Quod genus assiduo laniat præcordia morsu.
 Sæpe etiam scandens oppletis faucibus hæret:
 Obsessasq; uias uitæ concludit hanelæ.
 Ergo cinis cornu ceruini proderit haustus:
 Vel nepetæ tritum ex uino, uel lacte capellæ:
 Necnon & succus medici potatus aceti.

Q. SERENI

Prodest prætereacum baccho persica frondis:
Democritus memorat mentæ conducere potum.
Sumitur abrotanum, necnon et uile melanthum:
Allia per sese sanant: aut ius coriandri.
Quin et marrubium decoctum, haustumq; iuuabit,
Puleium ue potens, et agreste iugatur anetum.
Synthesis hæc prodest unda mollita calenti.
Colo sedando.

CVM COLVS inuisum morbi genus intima carpit
Mande galeritam uolucrem, quam nomine dicunt:
Aut pauidi leporis madefacta coagula pota:
Sive apio tritas nepetas cum mastice iunges.
Necnon et species ambas redolentis aneti,
Quarum decoctos patiens haurito liquores.

Vesica, et calculo purgando: et urinae prouocanda.

SI CUI uesicae tardus cunctabitur humor
Hæc mora rumpetur uino peruncta uetusto.
Prodest et paruos acidos potare sabuci.
Aut hederæ suauis: aut lachrymosi trita synapi.
Necnon resinas ex oricia terebintho
In speciem eruiiæ paruos glomerabis in orbes:
Quos ternos tepida mixtos hausisse medella est.
Quondam etiam nimio præceps urina fluente
Irrigat exuias, obscenoq; inficit hymbri.
Ergo cinis nepetæ suauis uel proderit haustus:
Et uino tritus datur, aut cum lacte capellæ
Tum leporis cerebrum ex uino potare decebit.
Si dolor internam uesicæ concoquit aluum
Subueniet radix et frons epota cupressi:
Puleium ue potens domitum feruentibus undis.
Si uero in lapides densus conuertitur humor
Qui retinet cursus, gemitumq; dolore frequentat,
Saxifragam, seu sarxeiphagon: suaturrare credunt.
Præterea semen myrti syluestris iaccho,
Atq; oleo mixtum bibitur: nec desit acetum:
Vinaq; sumantur fricto condita cumino.
Sive palumborum capitur fimus aëriorum
Dulcicidis sparsus suauis, trituq; solutus.
Necnon obscenus capræ potabitur humor:
Obruit hic morbum, labefactus saxa remittit.

De conceptione,

De conceptione, & partu.

IRRITA coniugij sterilis si munera languent,
Nec sobolis spes, multos iam uana per annos
Fœmineo fiat uitio res: nec ne silebo.

Hoc poterit magni quartus monstrare Lucreti.
Sed natura tamen medicamine uicta potenti
Sæpe dedit foetus studio curante paratos.
Aut igitur leporis consumit fœmina uulnam:
Aut ouis in stabulis fractas cum ruminat herbas
Pendentes spumam molli deducit ab ore,
Atq; illam meminit iuxta potare falerno:
Mercurialis item capitur communiter herba:
Sic cubitum noctu coniunx festinat uterq;
Ast ubi iam certum spondet prægnatio foetum,
Ut facili uigeat seruata puerpera partu,
Dictamnium bibit: & cochleæ manduntur edules.
At si per menses minus octo moratus in aluo
Irrumpit thalamos: & nexus soluit inertes,
Pulei bene purgati tunc conuenit humber,
Cuius opem ueram casus mihi sæpe probarunt.
Quin etiam stercus supponunt uulturis atrij:
Sentiat ut minime partus qui proximus urget.
Oua etiam rutæ, & fragili miscentur anetho:
Quæ diluta simul uino, atq; exhausta medentur.

Profluvio cuiusq; sanguinis, & matrici.

SI modicus pleno manat de corpore sanguis
Subuenit: at nimius cum uita funditur ipsa.
Quapropter multo naris completa cruore
Cum fluit, attritus cimex conducit odore:
Lana oleo madefit, sed nondum lota rosato:
Hæc datur in naves, uel claudit densius aures.
Contritis prodest cochleis obducere frontem:
Aut galli cerebro, uel sanguine mitte columbæ.
Quod nisi supprimitur, sanguis potandus & ipse est.
Præterea pharys caput emetire papyris:
Detrahe quod superest, aliò genitalia nocte.
Fæmineas prodest illinc uincire mamillas.
Menstruus immenso si profluit impete sanguis,
Succida lana malos remoratur subdita cursus.
Mortua quin etiam producit corpora partu.

Q. Serenus.

2

Q. SERENI

Sed quæcunq; fluit uis immoderata cruoris,
 Subernus cortex calidis potatur in undis,
 Ante minutatim studio uincente terendus.
 Sed si forte cruor clausa cunctabitur aluo,
 Puleij calido purgatur foemina potu.
 Aut molles nepetæ, aut rutæ quæcunq; bibentur.
 At si puniceos fundit uesica liquores,
 Marrubium ex passo tritum perfunditur undis:
 Hi poterunt haustus rutilum purgare liquorem.
 Reliquias partus dictæ detrahit herba.
 Quod si foeminei properabit sanguinis hymber,
 Est qui frustra molæ percussu decutit uno:
 Quorum aliquod lanis tectum ad præcordia neçtit
 Hæc simul inætantans sibi debere cruorem,
 Ut lapis ille uicæ solitos iam destitit orbes.

Pilis qbuscunq; interneçadis, quæ oculos impediunt.

NOBILIS hirsutas horret lasciuia setas,
 Et gaudet raptò nudari flore pilorum:
 Sed bona nonnunquam uellendi causa uidetur,
 Corpora cum releuat ratio manifesta salutis.
 Nanq; oculos infesta pilorum tela laceßunt:
 Quodq; illis dederat nullum natura tuendis
 Inde inimica seges proprios deçauit in orbes.
 Ergo locum erinis uulsi continget cruore,
 Quem dat auis tremulis simulat quæ pellibus alas:
 Sanguine uel Ricini, quem nigro de cane uelles.
 Præterea quasunq; uoles auertere setas,
 Atq; in perpetuum rediuiua obcludere tela,
 Corporibus uulsiß saniem perducito ranæ.
 Sed quæ parua sita est, et rauco garrula questu,
 Necnon quæ stagnis cessantibus hæsit hirudo
 Sumitur, et uiuens samia torretur in olla:
 Hæc acidis ungit permixta liquoribus artus,
 A uulsa q; uetat rursus percreßcere syluam.
 Omnibus obscænis mcdendis.

DICENDVM et quæ sit membris medicina pudendis.
 Languidus antiquo purgatur penis iaccho:
 Ac super illinitur foecundæ felle capellæ:
 Mane nouo myrti frondes commandere prædest.

Qui

Qui dolet, atq; illas in vulnus despuat ipsum.
 Fece etiam vini genitalia lauta leuantur:
 Et tumidos testes nereia lymphæ cohercet.
 Vel bulbi ex mulso, uel cera immista cupresso:
 Aut faba cum tepidis baccho decocta fluentis
 Ramis immensum fertur cohibere tumorem.
 Far madidum lymphis: medicat cum fronde cupressi:
 Vnde etiam potu frons hæc memoratur amica.
 Sin autem existit durum tibi glandibus inguen,
 Proderit induci cocleas cum melle minutas.
 Obscenos si ponè locos noua vulnera carpent,
 Horrentum mansa curantur fronde ruborum.
 Aut si iam ueteri succedit fistula morbo,
 Mustellæ anere immisso purgabitur ulcus.
 Sanguine tum riani, quem bos gestauerit ante
 Herba chelidonia fertur cum melle mederi:
 Herbaq; cum seuo folijs de mille uocata.

Scies, & articulari morbo.

S A E P I V S oculus uicta coxendice morbus
 Perfurit, & gressus diro languore moratur:
 Populus alba dabit medicos de cortice potus:
 Necnon & teneræ gracili de fronde genistæ.
 Arreptos caules, acidoq; liquore madentes
 Sumere conueniet, rubiæ quoq; ducere potum:
 Aut ex irino cochleas haurire lyæo.
 Si uero articulos tabes inimica per omnes
 Hæserit: ex figu betas ac melle ligabis
 Vel pelagialices, simul & baccheia dona
 Sumere curabis: nimio sed parato uino.
 Ennius ipse pater dum pocula siccant iniqua,
 Hoc uitio tales fertur meruisse dolores.

Furunculo medendo.

C V M sanguis nimius puri commistus atroci
 Aestuat: & papulas alte sustollit acutas,
 Resinam misces, & saxis ordea fracta
 Conspersa hæc tepidis apponere conuenit undis:
 Vis & hyoscyami cæcæ, seuoq; ingitum
 Nectere: non minus hæc poterit medicina inuare,
 Prætereaq; finum ex gallo, quem legeris albo,
 Imbribus ex acidis fidens appone dolenti.

x ij

Q. SERENI

Auribus aut pecudum molles expromito sordes:
Vnguine quo fotis dabitur medicina papillis.

Carboni medendo.

HORRENDVS magis est, perimit qui corpora carbo
Vrit hic inclusus, vitalia rumpit acerbis.

Hunc ueteres quondam uarijs pepulere medelis

Tertia namq; titi, simul & centesima liui

Charta docet ferro talem candente dolorem

Exectum: aut potora parum semine pulsum.

Ni fieret dicens uix septem posse diebus

Vitam produci, tanta est uiolentia morbi.

Dulcicidum, laticemq; cumini semine iunges:

Atq; finum pariter paphiae compone columbae:

Hinc line duratas partes: & clausa uenena.

Præterea triti referant adoperta lupini.

Nonnullus calcem uiuam dissoluit aceto:

Fumantemq; niuem papulis apponit acerbis.

Est qui gallinae perducit stercore corpus:

Allia uel piperi parce commixta linuntur

Pythagoræ cognata leui condita cumino

Proderit, & madida fermentum polline turgens.

Pani, uomicae, & strumæ depellendis.

SVNT alij, quos dura mouet natura tumores

Non minus horrendi, sed non ita pernitiosi:

Vomica qualis erit: uel eidem proxima quædam.

Simplice resina miscentur hordea tinsa:

Et mulsos amnes: & purgamenta columbae:

His bene decoctis languentia membra fouentur.

Mollis odorato saba iungatur coriandro

Proderit appositum: molliq; aperitq; tumorem.

Aut de phasgano radix decocta palustri:

Quæ salis admixto tondetur condimento.

Proderit & mansum, quod traxeris arbore uiscum.

Gramen Hyoscyami ceræ, seuq; uetusto

Concilia: mixtisq; locos perduce dolentes.

Exercere etiam corpus medicina potens est.

Ouum defundis in fictile, deinde putamen

Marrubij succo implebis, post melle liquenti:

Omnia consociata tepenti prospera potu

Sumuntur, referantq; malum, purgantq; leuantq;.

Igni

Igni sacro medendo.

EST etiam morbi species, quæ dicitur ignis:
Languida quo multo torrentur membra calore.
Vel tu uicino serum bouis igne remittis,
Mollitumq; lines: dederis uel fotibus oua:
Sed non cocta dabis: sic torrida membra fouebis.
Lumbricus terræ mixto inducetur aceto:
Aut parili noua Ruta modo: sed iungis oliuum:
Ouaq; cum betis profunt super illita tritis.
Allia dant anerem sociandum oleoq; garoq;
Vnguine quo gliscens deponet flamma furorem.
Sæpe chelidonie pars candida iungitur oui,
Quæ medico potu, sed uili trita capeffer:
Admiscere humor lymphas, amnemq; falerni.
Podagræ depellendæ.

QUAEDAM sunt rabidæ medicamina summa podagræ
Cui ter tricenæ species epidaurius ipse
Dixit inesse deus: requiem tamen huic dare morbo
Fas erit: Et tristem saltem mulcere dolorem.
Ergo age, Et arreptam salicis frondemq; librumq;
Cum uino tere: sic contractos perline neruos:
At cum prima mali sese ostentabit origo,
Fervida non timidus tolera cauteria plantis:
Seminecis uel hira reserato pectore calces
Infere: sic dira reprimes primordia pestis:
Aut si corruptus perfederit altius humor:
Trita cupressus ibi baccho iungetur acerbo,
Panibus Et teneris cohibebunt addita questus.
Parna sabucus item est hircino collita seuo:
Triticæq; acido manantes amne farinæ:
Aut nitidum rana decoctum uiscus oliuo:
Siue chelidonie suauis sale mixtus aceto.
Sunt quibus apposita siatur hirudine sanguis:
Non audita mihi sit fas, sed lecta referre.
Hoc quidam rabidus morbo per tempora missis
Vicino plantas frumenti pressit acervo:
Euasitq; grauem casu medicante dolorem.

Vulneribus ferro, aut uerberibus factis.

NATURAE uitis medicas obiecinus artes:
Nunc Et fortunæ iaculis obsistere par est.

Q. Serenus.

x in

Q. SERENI

Si cui forte lapis teneros uiolauerit artus,
Necte adipēs uituli, simul & tritam chamaecisson.
Nec pudeat lutæ stercoſ producere porce.
Sim autem ſeno eſt laceratum uerbere corpus,
Tum lexiua cinis ceras diſſoluit, & oua:
Admixtoq; oleo uibices comprimit atras.
Si uero inſrenus manat de uulnere ſanguis,
Purpura torretur conchili perlita ſucto:
Huius & atra cinis currentem detinet undam
Verrucæ quoq; deſectæ frenare cruorem
Dicitur ambuſtus tyrio de uellere puluis.
Præterea nimios reſerati uulneris amnes
Feniculi cinis astringit, uel ſimbria porri:
Siue ſimus manni cum teſtis uritur oui,
Et reprimat ſtuidos miro medicamine curſus.
Vulneribus quibuſcunq; caſibus actis.

CV M magna humanæ ſint pondera conditionis:
Tam multæ innumeri ſpecies mihi uulneris adſunt.
Vt nequeam proprijs cunctis adſcribere curas.
Iſdem igitur monitis caſus ſanabimus omnes
Sic tamen, ut nullus medicinam eluſerit error.
Ergo modus quicuq; obtingit uulneris atri,
Contritus cum melle dabit medicamina bulbus:
Herbaq; quæ folijs nomen de mille recepit.
Appoſita prodeſt adipi permixta uetuiſto
Succida cum tepido neceſſetur lana lyæo:
Ambuſtus uel cinis complebit uulneris ora.
Concludit uero, uel frons, uel ramus ab ulmo.
Vt ſucis hedera pulchreſcat foeda cicatrix.

Ab homine, uel ſimia morſis.

S I V E homo, ſeu ſimilis turpiſſima beſtia nobis
Vulnera dente dedit: uirus ſimul intulit atrum
Betonicam ex puro prodeſt aſſumere baccho.
Necnon & raphani cortex decocta medetur:
Si trita admorſis fuerit circumlita membris.

ſerpentū morſibus, & uenenis pellendis.

CV S P I D E non quiſquā, longē neq; cæde lariffæ
Fulmine non gladij, uolucris nec felle ſagittæ,
Quam cita uipereo potis eſt affligere ictu.
Quare aptam dicamus opem, ſuctoſq; medentes.

Cui

Cui nocuit serpens, fertur caput illius apte
 Vulneribus iungi: sanat quæ sauciat ipsa
 Vt larissæa curatus Telephus hasta.
 Proderit & caulem cum uino haurire sabua:
 Aut coctum raphani librum, tritumq; ligare:
 Sine etiam excelsa folium de mole cupressi
 Mandabit lactens æprifici suavis opellam:
 Aut tithymalus atrox vulnus contrita perungit.
 Carduus est nondum doctis fullonibus aptus,
 Ex illo radix tepido potatur in amni.
 Ceruino ex fœtu commixta coagula uino
 Sumuntur: quæ res membris agit atra uenena.
 Aut ferulæ radix potatur in hymbre lyæi
 Betonicæ uel leues, gallinæ aut iura uetustæ.
 Si uero horrendum vulnus fera iecerit aspis,
 Vrinam credunt propriam conducere potu.
 Varronis fuit ista senis sententia: necnon
 (Plinius ut memorat) sumpti iuuat humber acetii.
 Dicendum & quæ sit præcorx medicina timenti:
 Cautio namq; potest diros peruertere morsus.
 Si iecur exectum tardo de multure portes
 Erucis, uel si totos perduxeris artus,
 Quas prius attritas uehementi spargis aceto:
 Aut tu ceruina per noctem in pelle quiescis:
 Aut genere ex ipso dentem portabis amicum.
 Toxicæ præterea qua sint pellenda medela
 Expediam: sanguis poterit prodesse caninus:
 Qui facili potu antidotos imitatur honestos.
 Vis & mirificos catulus prædiscere odores:
 Aænensis quibus arcetur teterrima serpens,
 Aut styracem torres: aut duri uulturis alam:
 Vel nepetam: aut frondem rigidæ, stirpemq; miricæ.

Ictibus Scorpj, & moribus Muris cæci, uel Aranei:

SUNT minimæ species: sed diræ uulnere pestes
 Quæ magis in tenui latitantes corpore fallant:
 Scorpheus ut grauis est, & araneus hæc mala semper
 Captant securos multa iam nocte sopores,
 Et documenta dedit nobis prostratus orion,
 Magna quod exiguis perimantur membra uenenis.

x iiij

Q. SERENI

At qui vulnus atrox incussit scorpius ardens
 Continuo capitur: tunc digna cæde reuulsus,
 Vulneribusq; actus fertur reuocare uenenum:
 Aut calidis pelagi lymphis loca læsa fouentur:
 Sine meri potu dissoluitur improba pestis.
 Ad cunctos autem morsus, ictusq; minorum:
 Caseus aptus erit pauidæ de lacte capellæ:
 Cunq; hoc assumi debet origanus herba:
 Hæc duo mirificis curabunt icta medelis.
 Necnon feniculo calidum annectatur anethum
 Aut uinum sulphur siat cum fece lyæi:
 Exiguo piperis cerebrum conspergito galli:
 Quo lita sanescunt depulso membra dolore.
 Sin autem muris nocuit uolentia cæci,
 Quæ sola signauit uoluentis orbita plastris,
 Illinc mira datur uili de puluere cura.

subitaneo dolori, feбри, atq; ostocopo.

NON nunq̃ existit subiti noua causa doloris:
 Cuius origo latet, ueris reprimenda medellis.
 Nanq; chelidonium mixto sale nectere prodest:
 Velleræq; infuso recalentia sulphure sanant.
 Ostocopon lento conducit melle perungi.
 Sin autem calidæ depascent corpora febres,
 Tunc apij sucus leni sociatur oliuo:
 Membra lines: foruq; ferus mulcabitur ignis.
 Nec spernendus adeps, dederit quem bestia Melus.
 Semineis cerui lachrymam miscere liquori
 Conuenit: atq; artus illinc mulcere calentes:
 Febribus at longis galli des iura uetusti.

Ad Typum quartanæ.

NEC tu crede leuem, dilato tempore febrem:
 Quæ spacium sibi dat magis, ut cessando calescat
 Lentato quæ crassatur quartana calore:
 Ni medicis adhibere manus discamus & herbas,
 Allia non pudeat terno cum amice trita,
 Et diluta mero medijs haurire diebus.
 Aut facilem icteris murini ducere fibram.
 Quatuor & duri iungantur scrupula bacchi:
 Mira est absinthii cum simplice potio lymphæ.
 Summa tribus digitis apprehensum semen anethi,

Tantundem

Tantumdem marathri, mulsum nec desit aceto,
 In cuius cyatho prædicta salubriter hauris.
 Iliæ quinetiam spartum suppone tumentis.
 Aut leporis trepidi diluta coagula trade.
 Prodest & potus sed mulsus doridis humor.
 Quidam etiam miranda ferunt ueniente calore
 Iurantes ludum ueneris, munusq; petendum.
 Sed prius est oleo partus feruescere ranæ
 In triuijs, illoq; artus perducere suco.

Ad Typum tertianæ.

EST etiam alternis febris rediitina diebus:
 Tempora discernens quasi iustæ pondera libræ:
 Ut possis igitur talem prohibere furorem,
 Tu uolues cera sine caudis grana cumini,
 Puniceq; indes pelli, colloq; ligabis.
 Pulei ramus lanæ uelatus amictu
 Tempore suspecto medicos præbebit odores.
 Præterea amex potatur tritus in ouo,
 Horridus attractu, sed gustu commodus apte.

Ad Typum quotidianæ.

AT qui continuis non cessat adire diebus,
 Sed tantum certus morbus discriminat horas,
 Tritæum metuit granum (si credere dignum est)
 Quod latitans fracto fuerit sub pane repertum.
 Necnon ossa iuuans septicis inuenta domorum:
 Conuenit hæc tereti pendentia subdere collo.
 Multaq; præterea uerborum monstra silebo:
 Nam febrem uario de pelli atrimine posse
 Vana superstitio credit, tremulæq; parentes.
 Hemitritæo depellendo.

MORTI ferum magis est, qd̄ græcis hemitritæum
 Vulgatur uerbis: hoc nostra dicere lingua
 Non potuere ulli: puto nec uoluere parentes.
 Inscribis chartæ quod dicitur abra ca bra
 Sæpius, & subter repetis, sed detrahe summam:
 Et magis atq; magis desint elementa figuris:
 Singula quæ semper rapies, & cætera figes,
 Donec in angustum redigitur littera conum.
 His lina nexis collum redimire memento.
 Nonnulli memorant adipem prodesse leonis.

Q. SERENI

Corallum uero, si collonectere uelles:
Ne dubites illo ueros miscere smaragdos.
Talia languentis conducent uincula collo:
Letalesq; abiget miranda potentia morbos.

Fracturis, et luxis sanandis.

INFANDVM dictu cunctis procul absit amidas:

Sed fortuna potens omen conuertat in hostes:
Vis indigna nouo si sparserit ossa fragore,
Conueniet cerebrum blandi canis addere fractis:
Linthea deinde, superq; inductasnectere lanas:
Sæpius et suetos conspargere pinguis oliui:
Bis septem credunt ualescere cuncta diebus:
Aut ueteri baccho capræ finis inde petulcæ:
Hoc aperit clausum, trahit hærens, sanat apertum.
Sic uero caput infestus colli ferit ictus,
Ex oleo necti uestis debeat arachnes:
Nesciet hæc illinc, nisi cum sanauit, abire.

Quod si luxa suo decedent membra tenore,
Vrere foemineos crines, ac iungere seuum
Congruet, ac tali medicamine mota ligare.

Aut maluam ex pingui tritam apposuisse inuabit:
Aut si conclusum seruauit tibia uulnus:

Stercus ouis placide iunges, adipisque uetustos:
Pandere quæ poterunt ulcus, patuloq; mederi.

Neruis incisis, et dolentibus, atq; contractis.

HAVD quisquam credet dissectos uulnere nervos

Ad solitum rursus reuocari posse uigorem:
Sed prodest tetræ lumbricos indere tritos:

Quis uetus, et rancens sociari axungia debet.
Si uero oculus nervos dolor urit inertes,

Vulturis excisos adipem, rutamq; remitte:
Aut ceram, et tali recreabis languida fotu.

Conuenit et pelagi calidis perfudier undis.
Carica cum betis lento uel melle iugatur:

Aut baccho madescentia ceres cum fronde cupressi:
Quo poteris potu recreare rigentia membra:

Sic autem subito replicantur corpora morbo,
Contractos reuocat nervos citro sumpta columbæ.

Aegris somno asciscendo.

NON solum miseros teterrima febris adurit:

Sed super optato pergit uiduare sopore:
 Ne prosit placidi coelestia munera somni.
 Charta igitur, uarijs quam pinxit littera uerbis
 Vritur, inde cinis calido potatur in amni.
 Prodest puleium capiti substernere saepe.
 Proderit et mixtam lymphis potare cupressum
 Palladijs itidem succis, quos flore rosarum
 Iungis, et immisces madidum, tritumq; papauer:
 Quo lita frons facilem præbebit nocte quietem.
 Necnon mandragoræ gustu sopor additur altus.
 Dilue prætere a glomeratam quam gerit intus
 Lanam aries inter geminae coxendicis umbras:
 Inde soporati ducentur gutture potus.

Lethargiae expellendae.

DIXI mus hanc sortem miseris mortalibus esse,
 Ut sint saepe mala inter se contraria morbi,
 Deniq; nonnunq; somno sic membra grauantur,
 Ut coniungantur letho sopor altus acerbo.
 Ergo leui flamma torrentur cornua caprae:
 Quo nidore grauem depellent lumina somnum.
 Aut ueneris labrum, quæ dicitur herba bibetur:
 Quæ teritur prius: et uino confusa liquefat.
 Conueniunt acidis euphorbia mixta fluentis:
 Gramina uel rutæ, gemina si nare trahuntur.
 Quidam dira inbent septeno amice trito
 Ut utiantur aquæ, cyathusq; bibatur earum:
 Hæc potiora putant, quam dulci morte perire.

Comitiali morbo medendo.

EST subiti species morbi, cui nomen ab illo est,
 Quod fieri nobis suffragia iusta recusant.
 Sæpe etenim membris atro languore caducis:
 Consilium populi labes horrenda diremit.
 Ipse deus memorat dubiæ per tempora lunæ
 Conceptum, talis quem sæpe ruina profundit.
 Prodest cum ueteri baccho fel uulturis attri,
 Sed cochlear plenum gustu tibi sufficit uno:
 Aut cruor ex prognæ mixtus cum polline thuris:
 Aut apium elixum: aut conditum melle fel agni:
 Marrubium'ne pari confusum pondere mellis:

Q. SERENI

Cui tu terna dabis gustu cochlearia in uno.
 Aptus mustelæ cinis est, & hirundinis undæ.
 Præterea pluvias hominis quas calva supina
 Excepit projecta sinu, consumere prodest:
 Aut lapis ex nido uagi quem congeffit hirundo
 Vellitur: ex nexu fonet, attollitq; iacentem.
 Pellitur (ut fama est) gustu quoq; langor anethi.
 Regio morbo pellendo.

REGIVS est uero signatus nomine morbus:
 Molliter hic quoniam celsa curatur in aula:
 Huic rubia ex mulsâ fertur conducere lymphæ.
 Allia trita dabis uino madefacta calenti.
 Vellera cum uino suffiri sulphure prodest.

Detibus, uel strigis inquietatis infantibus.

NVDVM hoïem primû mundi natura profudit:
 Insuper excruciat, niueis cum dentibus armat.
 Collo igitur molli dentes nectentur equini,
 Qui primi fuerint pullo crescente aduati.
 Aut teneris cerebrum ginguis illine porci:
 Aut leporis niueo bibitur cum lacte caprino.
 Præterea si forte premit stryx atra puellor,
 Virosa immulgens exertis ubera labris,
 Allia præcepit Titini sententia necti:
 Qui ueteri claras expressit more rogatus.
 Combusturis igne, uel frigore factis.

SVNT diuersa quidem mala frigoris, atq; caloris:
 Sed tamen amborum simili nocet ulcere uirus.
 Illa quoq; uisita putas, quæ sunt niue laesa rigente.
 Conuersa in cinerem platani pila curat uirumq;
 At uero ambustum flammis qui candidus oui
 Sucus inest: penna inductus sanare ualebit.
 Aut tu sacrosæ cinerem perducto lanæ:
 Aut uinam ex oleo ueteri composito calæm:
 Ordea uel franges, atq; cui candida iunges:
 Adsit adeps porcæ: mira est hæc forma medelæ.
 Iunge chelidonij, ac sic line uulnera sucis:
 Quodq; recens uestit glacies, axungia simplex
 Mulcet: & ex facili grata est medicamine cura.
 Venenis prohibendis.

VT tutus fias infestæ fraude noueræ,

Vel quicumq; tuo carpetur liuidus auctu,
 Non expectatis eat obuia cura uenenis.
 Ante cibos igitur iuglandis foetus edatur.
 Profunt electri uariantia pocula uirus.
 Præterea coctæ querno cum cortice lymphæ
 Conueniunt potu: demersa'ne ficiis oliu.
 Sæpe etiam raphanum prædixit numen edendum.
 Antidotus uero multis mihridatia fertur
 Consociata modis: sed Magnus scrinia regis
 Cum raperet uictor, uilem deprehendit in illis
 Synthesin, & uulgata satis medicamina risit.
 Bis denum rutæ folium, salis & breue granum,
 Iuglandesq; duas, terno cum corpore ficiis
 Hæc oriente die parco conspersa lyæo
 Sumebat, metuens, dederat quod pocula matri.
 Venenis datis.

SI nequit infandum præuerrere cautio uirus,
 Proximus ille gradus data pocula pellere cura.
 Lac asinæ, placidæq; bouis prodesse loquuntur.
 Betoniam ex paruo sumunt pleriq; lyæo
 Quod si hederæ succos, quæ truncos implicat altos
 In stilles paruis, poterunt haud ulla nocere
 Pocula, quæ quisquam seuis uitiauerit herbis.
 Si quis Hyoscyamum gustarit lacte capellæ
 Exhausto rabidos poterit mulcere furores.
 Vulneribus, & rei dubiæ curandis.

VULNERA tubescunt spacio uitata dierum:
 Curaq; nil prodest, nec ducitur ulla cicatrix:
 Sed tamen herbarum tam mira potentia pollet,
 Vlcus annosi sinus ut coalescere possit:
 Marrubium si tu recoquas, illoq; liquore
 Vultus atrox foueas, cineres uel hirundinis alte
 Inducas: leporis'ue aspersa coagula uino:
 Aut hederam baccho decoctam, & semen anethi:
 Aut cineres alni tardo cum melle ligentur.
 Lumbrici terræ poterunt conducere uultus:
 Aut facilis lapathi coma latior ulcera purgat:
 Et comixtus adeps, sed non nullo sale tactus.
 Pineæ præterea uino cum sulphure cortex:
 Et picæ cum spissa iam perdita membra reponit.

Q. SERENI

Et pice cum spissa iam perdita membra reponit.
Verrucis tollendis.

INTERDUM exisistit turpi verruca papilla
Hinc quondam fabio uerum cognomen adhæsit:
Qui solus patræ cunctando restituit rem.
Id poterit uinum sanguis curare laceriæ:
Aut urina canis cum terra inducta madenti:
Aut herbe succus, quæ fertur nomine lichen.
Est tithymalus item tali satis apta medellæ,
Si rupta immensos fundit uerruca cruores,
Purpureo triti cinere de uellere profunt,
Quod fuerit uero conchyli sanguine tinctum.
Hæmorrhoidis medendis.

EXCRV ciant turpes anum si forte papillæ,
Agrestis prodest radix super addita porri:
Ne uiolet, sana, in iuglandis fragmine clausum.
Sal niueum sumes, bethicum quem nomine dicunt,
Dulcia cumq; nigra iunges fuligine mella,
Apponesq; super: pellit medicina dolorem.

Sequuntur. XXVI. uersus, qui in alijs impressis
codicibus desiderantur.

Paralysi depellendæ. primo die ita agendum.

HVNC quicumq; cupis citius depellere murbum,
Protinus antidotum studio tu perface mirum:
Salcet ut ualeas languenti ferre medelam.
Castoreas siliquas bis sex perquirere cura:
Triflis item digitis lympham metire duobus.
Deniq; tunc capies phyalam, quæ iustior extat:
Aut equidem flammæ. sed prunas subijce sollers.
Proderit interea tepidum potantibus illud:
Ieiunis sed enim potius præbere memento.
Secunda ita medendum est.

CVNQVE secunda dies orbi peruenierit omni
Haud alijs rebus prudens adiungere cures.
Castoris, atq; nouem siliquas appendito statim:
Atq; duos semis digitos metire memento.
In calice atq; probo lympham miscere duobus
Qui patitur tepidum languens hinc sorbeat ipse.

Tertia die ita curandum est.

GRATIOR atq; dies ternus cum uenerit imo,
Rursus in egroto constanter ser medicamen,
Castoreas siliquas iterum quæ pondere sint sex;
Hinc etenim binos digitos metire memento
De lymphâ liquida sed enim subiungere cura
Et simili debes tepidum præbere modo tunc.

Ita peragendum est à quarta die usq; ad sextam,
Et à septima usq; ad nonam, à decima usq; ad
duodecimam, Et mirifice prodest.


Quid quarta die, Et reliquis peragendum sit.


QUARTVS Et ille dies consentit. nec ne priori
Quintus Et est similis percellens namq; secundo.
Sextus itemq; simul concordat deniq; terno:
Septimus usq; nonum percurritur ordine primo:
Sic decimas currens consenditur ad duodenum.


* a b c d e f g h i k l m n o
p q r s t u x.

Omnes sunt quaterniones, præter t. duernionem:

VENETIIS IN AEDIBVS ALDI, ET AN-
DREAE ASVLANI SOCERI MENSE
MARTIO. M. D. XXVIII.







20th Aug